


COLLECTION  
IN THE  
LIBRARY



11625











## Table

- 1.) Hollerius (Jac.). Ad libros Gal. de compositione  
medicamentorum ~~et~~  $\tau\omicron\pi\omicron\upsilon\varsigma$  - Parisius, 1577, 68p.
- 20/ Hollerius (Jac.). De materia chirurgica  
libri tres (Parisius, 1577), 132p.



Res 11625<sup>1</sup>

IACOBI

HOLLERII

STEMPANI, MEDICI

PARISIENSIS CE-

LEBERRIMI,

Ad libros Gal. de Compositione medica-  
mentorum  $\chi\tau^1$  τόπος.

PERIOCHÆ VIII.



PARISIIS,

Apud Carolum Macæum.

1577.

## ANTO. VALETIVS LECTORI.

**M**ECUM forsā mirabere, Lēctor, his in Hollerij commentationibus multa passim occurrere, quæ libr. de internorum curatione affectuum inserta liceat comperire. Sed intelligas velim istam sibi ἐπὶ ἀνάληψιν primoribus cum medicis communem esse, quæ ad optimam medendi rationem viam parat longè fideliozem. Quod enim loco uno aut altero breviter, & haud satis explanatè traditur, id subinde repetitum magis innotescere consuevit. Adde quod (quantum ex laceris, & veluti Sibyllæ foliis, huc atque illuc dispersis auctoris chartulis deprehendi) nunquam mens fuerat hæc euulgare: quæ si fuisset, & auctiora multò dedisset, & reliquisset elimatiora. Quali acūque verò sint, si aliquando tibi placuerunt, nunc facta meliora non minùs probaturum speramus. Periochas autem libuit appellare, quòd compendiarium ad Galeni libros χτ' τόπ' 85 doctrinam complectantur. Vale.



IACOBI HOLLERII  
STEMPANI, MEDICI PA-  
RISIENSIS CELEBERRIMI,

*Ad libros Galeni de Compositione medica-  
mentorum κτ' τούτοις.*

PERIOCHE I.



Reagenus est Alopeciae, & Ophia- Alopecia  
sis. Vtriusque causa vitiosum ali- & ophiaseos  
mentum capillorum. Ophiaseos fa- causa.

familiaris pueris, ab occipitio incipit  
duorum digitorum latitudinem nō  
excedens : serpit ad aures & fron-

tem, donec vtriusque fines, quasi caput & cauda,  
committantur, vt serpentem repræsentet: vnde no-  
men. Sponte sua aut leuioribus remediis curatur.  
Alopecia magis accidit adultis, difficilius curatur.  
In vtrâque, quod omni modo marcescit & emori-  
tur extrema pellicula capitis, vnde cōspersa, glabrea-  
ta, pili primū extenuantur, deinde excidunt. Lo-  
cus expers cruoris apparet, qui si configitur, sangui-  
nem liquidum & malè olentem reddit. Alopecia  
sub qualibet figura serpit. In capillo & barba vter-  
que affectus differentias habet, quia vel incipiunt,  
vel facti sunt, vel iam inueterati. Inueteratorum si-

Alopecia &  
ophiasios in-  
ueterata si-  
gna.

# AD LIB. I. DE COMPO. MEDIC.

gna, cutis densa, subpinguis, in totum glabra, & quæ fotu, frictione, exasperatione non rubescit, aut ægerrimè curatur.

## Curatio.

**I**N ratione vitæ, purgatione totius corporis, deinde de capitis cura quadam per frictiones, & similia circa caput, topicis remediis, tota consistit curatio. Rationem vitæ præscripsit Asclepiades abstinentiã vini, leguminũ, lacticiniorum, casei, carniũ & eorum, quæ vel plurimũ nutriunt, vel flatus & vapores gignunt. Exercitium sit moderatum, rarum balneum, rarus sudor, alimenta, quæ parũ nutriunt, tenuem succum & bonum gignunt, atq; omninò repugnant vitio. Purgatio corporis, vt est vitium humorũ in pituita, pilulæ cocciæ, assaieret, turbith, agaricus, pulvis hieræ diacolocynthidos, diaphœnicũ, diacarthamũ, qualis erit hæc dosis. ℞. pilularũ cocciarũ ʒ. ʒ. pulueris hieræ diacolocynthidos, agarici

*Purgatio.*

ana ʒ. i. cum expressione ʒ. i. turbith gummosi infusi in oxymelite, fiant pilulæ. Poterit loco agarici aliquid misceri diacarthami. Diaphœnicum autem dabitur ad ʒ. ʒ. Vigētibus ætate poterit tamen acui addita ʒ. i. diacarthami, aut expressione ʒ. i. pulueris hieræ diacolocynthidos, aut ʒ. 2. agarici. Infusiones fiant in oxymelite. Vbi verò bilis vitium gignit, vtemur pilulis aureis, elect. de succo rosarũ, diapruno laxatiuo, rhabarbaro, myrobalanis citrinis. Augebitur vis eorum medicamētorum duobus, tribus vel quatuor granis dacridij. In Melācholico succo pilulæ de fumo terræ, de lapide lazuli, diasenna, cōfectio hamech, electariũ Indum. Horum vis augetur adiecta infusione ʒ. ʒ. ellebori nigri, aut ʒ. i. iam verò

vitium humorum ex colore cutis, temperamento totius tum corporis, tū capitis, & antea cta vita depræhendes. Caput seorsum purgabitur, errhinis, & apophlegmatismis. Cura circa caput eiusmodi est. Primū caput rade, idq; sæpius quotidie, vt malum est contumax: rariū verò, vt est leuius: deinde perfricabis linteo aspero, foliis ficus, osse sepia, vrticæ foliis, pumicæ. Perfricabis autē molliū, aut duriū, vt est malū contumax: atque in contumaci ita perfricabis, vt inde cruor moueatur. Vtemur quoque sinapismis, punctiōibus ex articulis, scarificationibus & cucurbitulis, quæ omnia pro magnitudine mali temperanda sunt. Herbis manè & vesperi, vel eò sæpius in graui affectu. Atque hæc ante cibū faciēda sunt. Sequitur vt topica adhibeas, in quorū vsu hoc videtur, vt non solū illinantur, sed diutiū affricando imbibantur, vt altius in profundum subeant: quod in omni affectu faciendū est, vbi cūque vnguentis vtimur. Medicamenta è pinguibus, & medicamentis aridis in puluerem tritis, natura acris, tenuium partiū, quæ humorem vitiosum discutiāt, & alimentum regenerādis capillis attrahant, atque ita calefaciāt, vt neque vrant, neque prætermodum resiccēt cutem. Pinguia sunt oleū cariynum, anethinum, sinapinū, terebinthinum, & alia, quæ scripta inuenies cap. 2. de attrahentibus libro I de materia Chirurgica, adeps viperæ, ranarum, axungia vetus, sed præcipuè derafa axibus rotarū, & alia quæ eodē capite scripta inuenies. Viscū quernum, gummi ellen. terebinthina Veneta, vel vulgaris, sæx ampullæ lucernariæ, pix liquida aut sicca, sed oleo liquefacta, ceratum picatum, resinarū, galbanum, mel enu-

*Quæ cura  
capiti adhi-  
benda.*



# AD LIB. I. DE COMPOS. MEDIC.

latum, diachylum, Ireatum, ceratum de Vigo, & similia oleo soluta. In pinguibus puluisculi excipiuntur è materia prædita ea facultate, quæ dicta est. Medicamenta hæc sunt, euphorbium, thapsia, arrhenicum rubrum, pulvis angelicus, aut mercurialis, thymalorum cinis, nasturtij semē, sinapi, erucæ, sulphur, borax, nitrum, arundinis cortex & radix, veratrum, radix ari & aristolochiæ, cinis muscarum, mutium, ranarū, scarabeorum, ostreorum, salforū, piscium, amygdalarum amaranū, atq; hæc vruntur, quòd vstura adstrictionem relinquant, & tenuitatem partium acquirāt. Eodem modo erinaceorum cinis, stercora volatiliū, mutium, fæx cremata, thus aceto tritum, cortex auellanarū, ficus cremata, cantharides vstæ, vsti scarabei. Sit autem proportio horum medicamentorum tritorū ad pingua subquadupla, subsextupla, suboctupla, subdecupla, subduodecupla, quale sit. ℞. euphorbij ʒ. 1. olei laurini ʒ. 1. β. Hic subduodecupla ratio est. Quòd si tantū ʒ. 1. olei miscueris, suboctupla: si solā semūciam, subquadupla. Bis in die hæc medicamenta illinuntur, vel eò sæpius ea ratione, quæ prædicta est, cū rasura, frictione & ceteris. Medicamentū fortius dolorem & ardorem excitabit: imbecillum nihil immutabit: cutem moderatam moderanter calefaciet, & veluti pruriginem quandā commouebit. In malignis affectibus & cōtumacibus, fortioribus vtendū erit ac sæpius repetitis. Leuioribus, leuiora: mediocribus, mediocria miscenda sunt. Hoc erit forte. ℞. gummi elenij ʒ. β. axungiae veteris lotæ ex aqua vitæ in sole ʒ. 2. olei è terebinthina & laurinian. ʒ. 6. Liquefiāt simul omnia, & probè misceātur in calidis cineribus.

Deinde insperge euphorbij subtilissimè triti, thapsiæ ana ʒ. j. sulphuris viui, seminis sinapi ana ʒ. ʒ. c. cineris tithymali, & cantharidum ana ʒ. j. Hic ferè est suboctupla proportio. Fortius erit, si imminueris modum pinguium, vel auxeris modum puluerum. Clementius contrà, si pulueres minueris, vel auxeris pinguia. Eadem ratione ex descripta materia infinita pharmaca miscebis.

*De profluvio capillorum.*

**A** Morbo sæpiùs, rarius sine morbo capilli defluunt, partim inopia alimenti, partim raritate cutis. Hic ergò vsu alimentorum salubrium & *Victus.* euchymorum regenerandis pilis materiam comparabis: cutem adstringes medicamentis, quæ modicè calefaciant, & leuiter adstringant, atque ita corroborent cutem, & poros constringant. Calidiora alimentum capillorum in halitum discutiunt. Quæ nimium adstringunt, eandem materiam repellunt, & sæpe etiam, nimium adstringendo, vias intercipiunt futurarum, per quas vapor inutilis quotidie exhalat. Atque ita retentis excrementis dolores capitis, fluxio in nares, fauces, & reliquum corpus commouentur. In vsu medicamentorum sub hyemen quidem & hyeme detondendus pilus est: sub æstatem & æstate ipsa omninò radi debet. Veteres ante balneum, & à balneo medicamenta illinebant. Nunc exoleta consuetudine balneorum, vtemurfotu ex decocto absynthij, stæchados, sarmetorum vitis, & vocatarum capillarium, adiectis interdum myrthi foliis. Coquenda in æquis partibus aque & vini rubri. Medicamenta iusta consistentia esse oportet, neque tam crassa vt inhærent, neque

# AD LIB. I. DE COMP. MEDIC.

vocant, atque intermisceri atramentū sutorium, nigretam vocāt, aut pulvis lapidis nigri, quo iam passim calceos denigrant, & illustant. Denigrat enim & astringit. Aliquid quoque atramenti impressorij, vernicis, vt magis hæreat sapo. Item pectine vtendum stāneo, plumbeo, corneo intincto medicamentis, quæ nigrefaciant. Capparis cortex aqua incoquitur, vt Dioscorides: lacte asinino, bubulo, vt Archigenes: vel (vt alij) coquitur ad tertias dum putrescat, atque ita illinitur. Similiter cortex radicis ilicis, quam rustici (houx) appellant, coquitur dum putrescat. Decocto tergetur caput, corrice verò illinitur. Item myrthi nigræ folia, semina betæ, folia ficus nigræ, mori nigræ, nucamenta seu catuli nuciū, cortex fructus nucis nondum maturæ, cortex salicis, faba fabacea, galla, sumach, cinara, suber aridum, plumbum vstum, excrementum ferri. Alia coquuntur in aqua pluuiæ, quædam in aceto. Succus ex alijs exprimitur: alia teruntur in puluerem: quædam cremantur, vt inde fiat lixiuium. Sunt ex veteribus Medicis, qui præcipiant prius caput radendum. Sic enim melius subeunt intrò medicamenta. Ex tritis in puluerem & succo aliorum fit mellis crassitudo. At flauos capillos reddunt lupini triti addito nitro ex aqua illiti, vel eadem aqua macerati, vel lixiuio. Experimenta sunt mulierum. Lixiuuium parant, & inde caput detergent, lauāntque, & ita exponūt soli. Aliæ madidos capillos statim conuoluunt suis linteis, vt sponte sua siccescāt. Lixiuio addunt stramen triticeum, glycyrrhizain, ramenta buxi. Veteres ramenta loti arboris decoquebant. Fæx vini veteris vsta cum oleo muscellino. Illinitur radix eringij &

*Simplicia ad nigrorem capillorum.*

*Flauos capillos quæ faciant.*

3.2. Terantur omnia in puluerem: misceantur oleo myrtillorum, donec fiat mellis crassitudo & consistentia.

*De tinctura capillorum.*

**C**Anities fit consensu Philosophorum & Medicorum non à siccitate, sed humiditate cruda, <sup>Canitijs causa.</sup> quam nativus calor non concoquit, externus corrumpit atque putrefacit. Naturis humidioribus celerius ex anteriore parte capitis, quæ humidior est. Qui viuunt capite plurimum operto, raro detecto & perflato, aliquando ætate, nonnunquam morbo, sed præcipuè vitilagine, in hanc sæpius incurrunt. Quibusdam de repente pilus exalbuuit vapore hydrargyri, aut cura graui. Habenda itaque cura, vt mali causa cognoscatur. Purgandum corpus, siquidem egere videatur: & vt nigrescat pilus medicamentis duorum generum vti licet, calidis: quale est apud veteres Cedrium oleum ex Cedria, pix liquida oleo mixta. Aliud genus medicamentorum terreum est, adstringit & habet aliquid tenuiū partium permixtum, vt in profundum penetret. Sed ab horum usu constrictis spiraculis capitis, per quæ vapores exhalât, frigidi morbi capitis, corruptelæ dentium, fluxio in pulmones & reliquum corpus, tabes, mors aliquando insequuntur. In usu melius est primum extergere caput. Veteres utebantur terra Cimolia. Nos sapone commodè utemur: ac sapo commodè poterit confici ex consuetis seuis, ouillo, caprino, hircino, pice liquida addita, lixiuio parato ex iis, quæ partim detergent, partim nigrefaciunt, vt è cineribus corticum salicis. Diuitibus poterit condiri sapo moscho & ambra, quam ambra giseam

# AD LIB. I. DE COMPOS. MEDIC.

tam liquida, vt defluant. Iusta est mellis crassitudo. Hyeme paulò calidiora & liquidiora tātum detruso pilo: contrā æstate. Olea conueniunt rosaceum myrrhinum concoctum omphacio, extremitatibus rubi & rerum huiusmodi, quæ adstringunt, atque his calidiora oleū de absynrhio, de spica nardi, costinum. Medicamenta oleis miscentur, vt ladanum, herbæ vocatæ capillares, grana myrthi, semen brassicæ, mastiche, & alia id genus. Singulare hoc. ℞, polytrici, capillorum veneris an. M. β. foliorū myrthi, rosarum, absynthij an. P. 2. decoquātur in olei dulcis & vini rubri austeri ana quart. 3. donec vinum consumptum sit. Omnia colentur, exprimantur, expressum oleum reponatur. Iam, ℞. huius olei ℥. 3. ladani ℥. 1. β. mastiches ℥. β. ladanum & mastiche subigantur in mortatio pistillo calido, paulatim oleum infundendo, deinde consperge, & probè misce pulueris capillorum veneris ℥. 4. Aliud.

℞. ladani ℥. 2. subige in mortario, calido pistillo, paulatim infundendo vinum austerum, donec mollescat: deinde misce duplum olei conuenientis. Aliud.

℞. ladani, absynthij ana ℥. β. baccas iuniperi tulas & ligatas linteo: deinde per dies quinque macerentur in oleo conuenienti: exprimatur linteum in oleum. Hoc illitum, & profluuium pilorum prohibet, & furfures. Item brassicæ cinis oleo myrrhino miscetur ad mellis consistentiam: similiter abrotonum in puluerem tritum, & hoc quoque Græcis & Arabibus probatum.

℞. corticum cannæ & auellandarum vstarum, granorum myrthi ana ℥. β. absynthij, gallarum ana

*Olea capil-  
lorum proflu-  
uium sisten-  
tia*

verbasci, flores lixiuio macerantur, & aliquid herbæ, quam geldam vocant, adiicitur. Singulare est hoc ad flauitiem capillorum.

℞. olei tartarei & persicorum ana ʒ. 2. commisceantur & verberentur fortiter in sole, quater in die. Continuetur, donec sint bene flauī. Item accipe radicem ireos, siccetur in sole, admisceatur lixiuio, inspergatur, & fiat vt suprà. Item limaces rubri sale condiantur, ex quorum aqua abluatur caput & capilli.

*De furfuribus.*

**P**ityriasis vocant. Morbus est extimæ cutis capitis cum leui scalptu, quasi furfures excutuntur. Ferè à pituita salsa, nonnunquam ab altero bilis genere. Remedia sunt, conueniens diætā repugnans vicio materiæ, purgatio corporis, vt in alopecia, apophlegmatismi & errhina, quæ per os & nares pituitam ducant. Medicamenta topica, quæ discutiant, vel tergeant. Vrinæ quoque & sudores vtiliter moueri possunt. Materia comparatur ex siccatis tritisque faba, hordeo, fœnugræco, orobo, lupino, cineribus betæ, brassicæ, abrotoni, cucumeris agrestis, parietariæ, puluere absynthij, enulæ, ireos, aristolochiæ, staphisagriæ, bryoniæ, ari, sulphuris, lapidis calaminaris, & generis terræ, quæ iam venalis circumfertur exsiccandis scripturis recentibus, pumice, ossē sepia, foliis ficus. Conuenit item sapo, & diuitibus pomata. Adhæc fæx vini, calx, argenti spuma. Cōposita fiunt ex his. Nam arida incorporantur succo betæ, brassicæ, ireos, enulæ, cucumeris agrestis, bryoniæ, oleo amygdalarum amararū, fraxini, rutæ, vt sit crassitudo mellis. Hæc omnia fient

*Pityriasis.*

# AD LIB. I. DE COMP. MEDIC.

meliùs rasis capillis, præmissaque frictione ex linteo asperiore. Possunt & pulueres per se affricari ex iisdem cineribus. Lixiuum fit, quod conuenit.

℞. argēti spumæ, olei rutacei, aceti ana: misceantur calidis cineribus. Aliud. Pulueris ireos & abrotoni ana ℥. β. succi enulæ & betæ quod sufficit ad crassitudinem mellis.

## *De morbo pediculari.*

*Phthiriasis.*

**P**hthiriasim appellant. Interioris cutis capitis morbus est ab humore calido illic collecto, unde putredine pediculi gignuntur. Post habitam rationem totius corporis, rectè institutam vitam & alia, vt priùs, medicamentis siccantibus, detergentibus, attrahentibus ex alto, ac, si vis, amarore præditis vti conueniet. ℞. staphisagriæ tritæ ℥. β. aloës ʒ. 2. aceti scyllitici, & olei amygdalarum amararum, vt sit mellis crassitudo. Aliud. ℞. pinguedinis erasæ è lardo falso ℥. 2. aloës subtilissimè tritæ ℥. β. cum aceto scyllitico fiat vnio. Aliud.

℞. aloës, herbæ pedicularis tritæ ana ℥. β. olei fraxini & succi genistæ quantum sufficiat, vt fiat mellis crassitudo. Aliud. ℞. pilularum communium ʒ. 2. pul. contra vermes tantundè: cum succo athanasias fiat linimentum. Sapo cum aloë compositus, aloë mollis addito oleo irino in muriam & lixiuū, vel falsuginem carniū aut pisciū iniicitur, & inde affricantur partes. Lixiuum fuerit fortius è cineribus athanasias & truncorum cynaræ, id est, articaulis. Licebit vti & iis, quæ faciunt cōtra vermes. Sunt qui arrhenicum misceant. Vulgus hydrargyro vtitur. Sed in pueris & mollioribus naturis, neque hydrargyro, neque aceto vtimur sine periculo.

**A**Choras Saphati vocant Arabes, vulgus Tineā. In achoribus cutis ab acri sanie primū prurigne irritatur: deinde exulceratur, & sanie reddit, subestque aliquando humor lentus, crassus & viscidus, vnde sanies, tineæ species. Remedia sunt vita recta. In plethora, phlebotomia: in cacochymia, purgatio totius corporis: deinde per Apophlegmatismos capitis. Sequuntur remedia topica, quæ distingui debent, vt vitium magnum est, vel exiguum, recens, confirmarum, inueteratum, superficiale, vel profundum. Denique vt est natura corporum, exiguo vitio, leuia remedia sine purgatione aliquando satisfaciunt. In recenti, repellentibus vtendum est. Discutientia commiscantur, eaq; mediocria. Confirmato vitio & inueterato magis, quæ magis discutunt, tergent, incidunt. Leuiora remedia superficiali Tineæ: maiora profundæ comparari debent. Acetum vi repellendi, incidendi, discutiendi præditum, & propterea eximium. In hoc morbo pueris, mollioribus natæ, & corporibus noxium. In remediis olea sunt, axungia, succi, medicamenta arida, quæ liquidis & pinguibus permiscantur. Olea quædam repellunt, vt rosatum, myrthinum, cydoniorum, salignum, id est, è salicibus. Alia verò tergent & discutunt, irinum, de cucumere asinino, amygdalis amaris, iuniperinum, fraxinum, de serpentibus, de frumento, medio cortice sambuci, de nucleis persicorum. Axungia in alopecia scripta, succi borraginis, fumarie, scabiosæ, parietariæ, betæ, anagallidis, enulæ, aristolochiæ, ireos, sambuci, absynthij, ebuli, centaurij minoris, marru-

*Achores,  
eorūque  
causa.*



# AD LIB. I. DE COMP. MEDIC.

bij, cucumeris agrestis. Arida, sulphur, cinabrium, sales torrefacti, arrhenicum, ærugo, metallica acria, & ea quę scripta sunt in Alopecia. In vsu radendum caput est, & perfricandum succo aut liquore conuenienti. Succi iam scripti & liquores conueniunt, lixiuium, vrina, falsugo, quibus acetum permisceri potest. Postremò medicamēta illinūtur. Aceti loco mixtura vini & lixiuij vtendū est. Vinum sit austerrum, vbi repellendum: acre & vetus, vbi discutendum est. Leuia sunt creta, argilla figularis, rubens sapo, pomata dissoluta aceto, in pueris & mollioribus corporibus, vino austero, & lixiuiio, spodium, antispodium, pompholyx, lapis calaminaris miscētur initio. Sinapis vulgaris repellit, vi aceti incidit, deterget virtute sinapi. Sales torrefacti, & diu cum hydrargiro triti, donec nigrescant, vtiliter permiscuntur. Mediocre est ex axungię veteris bene lotæ in aqua rosarum ℥.4. sulphuris viui triti in aceto acerrimo ℥.1. salis, vt dictum est, torrefacti & triti, pul. sinapi, plātaginis ana ℥.1. Aliud sulphur viuum aceto acerrimo maceratur in vase æneo collocato ad solem: deinde siccatur in eodem aceto. Ouum cum sua testa triduum maceratur. Vitellus extrahitur, crematur testa, omnia permiscuntur. Aliud. Radix lapathi acuti & enulę cæsa in taleolas in aceti & lixiuij partibus æqualibus ad putrilaginem coquitur: deinde permiscuntur axungię veteres: consperguntur sulphure, vt priùs, præparato. Aliud, colla fabrorum, gummi cerasorum simul in aceto macerantur: deinde coquuntur in eodem aceto, atque hoc abiecto oleum de frumento vel de sulphure miscetur, vt fiat satis liquidū euchristum. Postremò

*Remedia  
ad acho, 44.*

fulphuris & cinabrij partes æquales miscentur. Aliud. ℞. succi borraginis, scabiosæ, lapathi acuti, iteos ana ℥. 2. fæcis olei veteris, aut olei quod conueniat ℥. 3. aceti, quod sufficit. Bulliât simul omnia. Deinde subductis igne, misce pulueris ellebori albi & nigri, sulphuris viui, lythargiri auri, auripigmenti, cinabrij, calcis viuæ, aluminis, gallarum, fuliginis picis, vnde fit atramentum impressorium, cineris è fæce vini vsta, æruginis ana ℥. 2. eo plus minúsve. Acre est aliud. Pix aceto coquitur: adiecto aceto, oleo conuenienti miscetur. Sulphur, cinabrium, sinapi tritum permiscetur. Vidimus tineam, in quam *Maligna tinea lues venerea remedia curata.* lues venerea degenerauerat, eaque nullis aliis remediis potuit curari, quàm quæ solent vsurpari in ea lue.

*De Psyracia.*

**P**Syracia, pustulæ sunt duræ, subalbidæ, quæ expressæ saniem reddunt: vbi enulato vnguento, citrino, lacte virginali, salina limacum, pomata, theriaca, radice enulæ, & lapathi acuti, in aceto cocta, & cum axungia mixta vtendum est.



AD LIBRVM SECVNDVM  
GAL. DE COMPOSIT.

PHARMACOR.  $\chi\tau'$  τόπος.

PERIOCHE II.

**C**Aput dolet intemperie, aut solutione continui. Intemperies alia simplex alia composita. Vtráq; cum materia, vel sine materia: in toto cerebro, in solis venis, arteriis, membranis, neruosis corporibus. Solutio continui acri humore, erodente, putri, bilioso, falso, grauis dolor excitatur distentione. Distendit autē humoris copia vel flatus, vulnus, casus concussio in eodem sunt genere. Galenus ex varietate causarū efficientium, ex partium laborantium natura, ex loco, ex qualitate propria doloris, dolorum genera distinguit. Causæ efficiētes, internæ, & externæ, æstus, perfrictio, ebrietas, casus, concussio, vulnus, fumus, vapor aliquis virulentus, vt grauis odor, vel alius quidam suauis, sed hinc infectus. Sic Medico non solum cōmunis, sed vnicuiq; propria & particularis natura, quæ sua cuique est, cognoscenda. Causæ internæ sunt naturalis intemperies, aut contracta morbo, quātitas, qualitas materię, mala cōformatio, obstructio. Obstruunt ferē humor crassus & viscidus, aut vapor eiusdem naturæ. Obstruuntur viæ, futuræ capitis, ossa palati colatoria, viæ ad nares, aures, oculos, ad spinam, venæ

& arte-

*Dolorum genera ex quibus sunt à Gal. no distincta.*

*Medico particularis & propria cuiusque natura cognoscenda.*

& arteriæ. A partium natura, neruoforū corporum dolor magis punit, diffenditq; arteriarum pulsat. *Dolorū diff-*  
 In venis & substantia cerebri stupidior est. Loco, *fricta appo-*  
 perioftio superficialis: altus in meningibus. Intra *tibus petita.*  
 caluariam inclusus dolor sæpe pertingit ad radices oculorum. Ex propria qualitate hoc modo. Grauis dolor est in plenitudine & copia in acri humore, & vapore simili rodit. Sed in vapore acri distentio maior, minor rosio. Contrà in humore, distentio cum pulsu membranarum, inflammatione. Sequitur cum grauitate copiā mēbranis conceptam: sine grauitate & pulsatione, copiam crudi, frigidūq; flatus. Dolor diuturnus & contumax vel totum caput occupat, vt in cephalæa: vel alterum latus, vt in hemicrania, A sanguine ferè in frontem: à pituita in occiput: à bile flaua in dextrum latus: à melancholia, in sinistrum decumbit. Sed & ex proprietate dolorum humor aliquādo intelligitur. Nam ferè moderatus est à sanguine: à pituita, coniunctus est frigiditatis sensui, stupori, somnolentiæ, tarditati. Vbi facies decolor est, à melācholia varia phantasmata & imagines animæ offerentur: à bile, calor maior, pallida facies, vigiliæ. Sed his omnibus adiungenda est antea cta vita, requirendūque, quo modo habeant viscera, & reliquum corpus. Humor enim & vapor, qui dolorem facit, aliquando generatur in ipso cerebro. Sæpe ab aliis partibus corporis & toto genere venoso transmittitur. Sunt quibus arteriarum intemperies multum sanguinem spirituosum colligit, vnde vehemens pulsansq; dolor. Quibusdam, quod rarum scribit Auicennas, & memoria nostra visum est, vermis procreatus in cerebro,

*Doloris præ-*  
*præ: ad humo-*  
*ris peccantis*  
*index.*

## AD LIB. II. DE COMPOS. MEDIC.

graues dolores excitat, & hoc quoque rariùs, quod cuidam ex frequenti odoratu basilici scorpio in cerebro genitus, graues longósque dolores, & tandem mortem attulit, vt primo capite lib. I. de internis morbis diximus.

*De dolore capitis ab aestu.*

**D**utiùs iter facientibus; in sole commorantibus, in thermis, aut vaporariis calidis, calidiores vapores aut fumos excipientibus, dolor excitatur, vbi caloris sensus est in capite, fronte temporibus, sæpe etiam post aures, vigiliæ, oculorum rubor. Hic ergo cùm sit sola intemperies, contrariis pugnare oportet. Ea verò sunt refrigerantia & repellentia: in quibus tamen vitanda sunt, quæ nimium refrigerant & insigniter adstringunt. Declinandus splendor solis, instituenda quies, somnus, aquæ potus, aluus molliri debet, bene perspirata habitatio, & auersa à solaribus radiis, vita frugalis, alimenta quæ refrigerant & humectant.

Vitetur clamor, strepitus, motus animæ, corporis, & præcipuè mandibularum. In topicis hæc sunt obseruanda. In declinatione, quo iam tempore lenitur dolor, medicamenta leniter digerentia, refrigerantibus miscenda sunt. Deinde, vt Apollonius consulit, fasciæ è lana, vel, vt nunc, gossipio circumligandæ fronti, omninoque prouidendum, vt ne liquor, qui capiti adhibetur, parte aliqua in oculos, vel os defluat. Raditur caput aliquando, & ros paulò crassiora, vt detrusis liquidiora medicamenta fingenda sunt. Vtimur autem oleis, succis, liquoribus, foliis, floribus & germinibus plátarum, mucaginibus farinis mixtis in succo conuenienti. In

*In topicis  
quæ obser-  
uanda.*

oleis conuenientissimum rosatum recens sine sale & ex oleo omphacino cōparatum, alioqui in oleo albo, hoc est virginali vocato, vel eloto multæ rosæ aliquoties cōmutatæ madeant: aliquādo rosatū nō ita laudabile, sæpius lauamus aqua rosarum: quòd si omninò desideratur legitimū rosatum, nenupharino, violaceo, papauerino, aut alio id genus refrigerante vtremur. Sed vt addatur adstrictio, aliquid olei cydoniorum, aut myrtillorum intermiscemus.

Succi sunt è portulaca, lactuca, semperuiuo, vmbilico veneris, millefolio, polygono, & aliis eiusdem naturæ. Sed hæc recentia esse oportet, nondum æstate duriora, & sine succo. In liquoribus acetum, sed interdictum pueris, & mollioribus corporibus. Folia vitis, salicis, nenupharis, & herbarum præscriptarum. Flores nenupharis, rosarum, violarum, papaueris, capreoli vitium, fruticis, rosarum, rubi. Farinæ fabarum, hordei, quæ in succis prædictarum herbarum adhiberi possunt: aut iisdem tritis commisceri. Muccagines psylij, cydoniorum, aliquando semina contundimus, paulatim effusa rosacea, donec fiat crassitudo aliqua: quale hoc remedium, Arabibus probatum, & nostris vsitatum.

℞. seminis papaueris albi, hyoscyami albi, lactucæ, portulacæ ana ʒ. i. semi. cucumeris & cucurbitæ ana ʒ. 2. cōtundantur paulatim affusa aqua rosacea, donec fiat crassitudo: vnde frons, & tempora illinantur. Oxyrhodinū in frequenti vsu est, ex quinque partibus olei rosati, vna aceti, aliquando aliquid aque rosarum permiscemus. Ceratum Galeni rosatum, ex ceræ tribus partibus, duodecim aut decem olei rosati conficitur, subigitur cum succo her-

## AD LIB. II. DE COMP. MEDIC.

barum dictarum. Multa cerota conficies mutato rosaceo in aliud genus olei conuenientis. Cera fit alba, prius mollita in aqua tepida, lotaq; postremo subacta aqua rosarum. Sic enim maior vis inerit cerato, ad maiorem refrigerationem. Tota nocte sub dio collocantur, inclusa vase, hinc sepeliuntur puteis, aut aquis frigidissimis immerguntur. Licebit uti conseruis rosar. violarum, & nenupharis, emplastri more adhibitis, oxyrhodino, oxycrato, caphura quoq; topicis immiscetur. Lac muliebre cum tantillo caphuræ naribus inditur. Nodulus è rosis madefactis in aceto & aqua rosarum, naribus admouetur. Spongia quoque in decocto rerum quæ cōueniunt, immergitur, exprimitur, admouetur. In declinatione, quæ concoquunt, ut muccago, seminis althææ extracta in aqua chamæmeli, oleū chamæmelinum repellentibus misceri debent. Initio adhibita ut refrigerent, quia celeriter incalescunt, subinde innouari debent. Ratio vitæ frugalis, aquæ potus, somnus, quies, perflatum cubile, & auersum à solis radiis, tranquillitas animi, quies corporis, & mandibularum: propterea in omni dolore capitis vehemēti interdiciamus duris alimētis. Debet alius esse mollis quod procuratur iusculis è lactuca, oxalide, borragine, beta, iusculo prunorum, sero lactis, cassia, catholico, & omnino leuioribus medicamentis. Dolor à perfrictione si fuerit, concidit facies, sed est decolor, pigri sensus, pigræ animæ functiones, frigidis læduntur, utendum calidis, oleo rutaceo, irino, costino, nardino, quibus hyeme frigida, & maiori perfrictione, styracem calamitā, benzoinum, mithridatium, theriacam permiscemus,

euphorbium quoque oleo subdecuplum, vel subduodecuplum. Possunt olea confingi è maiorana, thymo, serpillio, origano, satureia, mentha, rosmarino, & aliis id genus calidis plantis, in oleo & vino coctis ad consumptionem vini. Affectu perseverante, raditur caput, aut detonditur, paulò crassiora medicamenta quàm in æstu adhibentur. Fiunt capitella seu pileoli ex aluta, quæ interiore parte induta sit mollibus emplastris, calefacientibus, vt mithridatio, theriaca, aut vnguentis crassioribus ex præscripta materia. Sinapis quoque vsui est. Abstinentum phlebotomia, cathartici fortibus, cucurbitulis, multò magis eo genere curandi, quod vsitatum in lue venerea, quod genus tantùm locum habet in dolore longo, & pertinaci, à crassis multis, & viscidis humoribus. Alimenta sunt boni succi, quæ moderatè calefaciunt, vinum tenue, calidum cubile, illitus narium, infusio in aures, ex materia præscripta, oleis & aliis.

*Ab ebrietate.*

**E**Brietas grauissima affert symptomata: alia quidem subitò, alia post tempus, quale est illud scriptum ab Hippoc. apho. 5. lib. 5. Si ebrius quispià obmutuerit repente, & quæ Gal. commemorat cap. 5. lib. 5. de locis malè affectis. Moderatum symptoma est, dolor capitis, in quo videndum, an vinum crudum, & crapula restiterit in ventre: sic enim vomitus imperandus, confirmandus ventriculus, alioqui vteris iis quæ contra ebrietatem faciunt. Quorum duo sunt genera: alia quæ refrigerant & repellunt, iam descripta in dolore capitis

*Ebrietatem  
profligant duo  
genera reme-  
diorum.*



## AD LIB. II. DE COMPOS. MEDIC.

contra æstum, vt rosatum; & peculiariter polygonum: alia naturali quadam proprietate, aut certè non ita manifesta ratione, vt hederæ folia alligata fronti, ruta, decoctum centaurij minoris, amygdala amara, ceruinum cornu, brassica, quã scripsit Theophrastus naturali quodam odio dissidere cum vite, vt vim huius succumque eliciat, si feratur in vite, atque inde vitem corrumpit: propterea Andracidem vsum brassica contra ebrietatem. Quod autem vulgo persuasum est crapulam vino elui, non caret ratione. Siquidem bene puro ventriculo & distributo priore vino, bibitur. Hoc enim vapores crassos discutit, quos genuit crapula. Quod & Hippoc. & Gal. ostendunt in dolore oculorum ab huiusmodi vaporibus, eo Apho. vbi scripsit Hippoc. Dolores oculorum meri potio soluit. Apollonius somno, inedia, quiete, vomitu, vel vacuatione vitur: sed hæc conueniunt, vbi crapula grauatur ventriculus, alioqui inutilia. Alimenta sunt pauca, & boni succi, quæ facilè concoquantur, pullastra, pulli columborum, capus iuuenis, alæ & testiculi gallorum, pisces saxatiles molli carne, oua sorbilia, hordeatum, aquæ potus, si quidem inde non læditur ventriculus: sic enim vino bene diluto hydrosaccharo, cum vino granatorum, iulepo Alexandrino vti licebit. Secunda mensa, cydonia, vuæ passæ, pira, & mala leuiter adstringentia, in vapore cocta, conueniunt. In declinatione diutiùs & paulò celerius ante cibum obambulandum. Post duas, aut tres horas à cibo breuiùs, & lentiùs. Atque hîc balneum conuenire potest, & refrigerantia topica, commutanda in ea quæ moderanter calfaciant,

*Brassica e-  
brietatē ar-  
cet.*

quale chamæmelinum est. Superstitio est in usu amygdalarum amararum contra ebrietatem. Voluit enim septem esse numero, 9. aut 11.

*De dolore capitis ex ictu, vulnere, aut contusione.*

**I**Cto capite, contuso, aut vulnerato, spectandum est, an malum ad pericranium extendatur. Sic enim membranam usque ad os diuides cultello, aut scalpello, derafo osse, linamentis vulnus replebis, sed in primis omnia aduertenda sunt signa, cum præsentia, tum ea quæ veluti accidentia recens illato ictu superueniunt. Leges itaque cap. 4. libr. 8. Celsi. Alioqui si temerè vulnus factum solidabis, aut contusionem negliges, grauissima accidentia consequentur, vt mortes, fisso, fracto, aut aliter læso subiecto osse. Itaque in magna contusione, siquidem nullum vulnus est, aut exiguum, tutius fuerit, iniecto clystere, detracto sanguine ex cephalica respondentem, in crucem interfecare, cutem contusam, & vulnus breuius ampliare. Sic enim facilius probamus, nunquid os læsum sit, vulnus linimento implendum est. Inducendum splenium, aut complicatum linteum medicamento, quod inflammationem prohibeat, quod reprimat, ex oleo rosato, albuminibus ouorum, bolo armena, puluere myrtillorum, aliisque id genus, & supra lanam succidam, vino, acetove tinctam, vel oxycrato impones. Postremò fasciola omnia colligabis. Iam tertio die, cōtusio vel omnino discutienda, vel in pus vertenda est. Quod si magna diuisio fuerit, iam tētato osse & membrana, futuris vulnus cōiungendum est: sed ita, vt inter duo fila iustum spatium relinquatur, & parte decliui magis pateat, qua scilicet pus commodius de-

## AD LIB. II. DE COMP. MEDIC.

fluat, quod alioqui collectū aut arrodit caluariam, aut per futuram fluit. In caput interius grauius adfert periculum. Dolor autem ferè excitatur ab inflammatione. Hîc ergo leniendus dolor est, & exstinguenda inflammatio. Vtrunque fit mistis medicamentis, quæ sine adstrictione & calore laxant: quorum materia abundè descripta in lib. de materia Chirurgica, cap. de dolore. Iam sublato metu inflammationis, lenito dolore, pus omnino cōficiendum est medicamentis suppurantibus. Repurgandum vulnus, detergēda sanies, tūcq; glutinādum, vbi benè purum vulnus fuerit. Hoc autē fiet prius regenerata carne, per medicamenta quæ peculiari-ter appellant cephalica. Deinde iam tecto ossē, per ea quæ vocant glutinātia: vtrāque materia, ex monumentis veterum, & obseruatione recentiorum, descripta est à nobis libr. 2. de materia Chirurgica. Est & aliud quod Galenus colligit de vsu aceti. Si quidem membrana quæ dura meninx appellatur, nudata est, omnino abstinendum ab aceto. Si verò ab ossē incolumi ea omnino tecta est, distingues hoc modo: nam si grauis est inflammatio, & grauis dolor, hîc abstinebis. Vel si vtrunque malū leue est, ita vt eris & medicamentis, quale rosatum est, permiscebis, vt tenuitate partium, vim aliorum medicamentorum deducat in altum. Retinenda vitæ ratio, quam Apollonius instituit, quies corporis, subtractio alimenti, vacuatio quæ fit, vel phlebotomia, vt antè dictum est, & medicamentis purgātibus, & clysteribus, noxiorum abstinētia, balnei, vini, neq; vini solū, sed & potuum qui inebriant, falsorum, acrium, acidorum, clamoris, strepitus, motus ani-

mi, corporis, præsertim mandibularum.

*De diuturnis capitis doloribus.*

**C**Ausa ferè intemperies cum materia frigida, in genere intemperies, vel solutio cōtinui. Intemperies, vt dictum est de dolore capitis sine materia, quæ ægerrimè curatur. Vbi confirmata est, vel cum materia, atque hæc vel biliosa & flatuosa, vel quod sæpè sit, frigida, crassa, viscida. Atque hanc quoque statim flatuum copia sequitur, vnde distentio & dolor, quasi contundenti similis, & ad instar malleoli ferientis. Signa ex dictatis antea repetenda. Altera causa est solutio continui à vulnere, contusione, casu, distentione, à flatibus. Iam verò flatus generatio medico intelligenda est. Generatur enim inopia caloris: atque hæc inopia duobus modis intelligitur, quia vel singulariter calor imbecillus est, vel non simpliciter quidem, sed vt ad materiam refertur. Atque in hac comparatione materiæ quantitas eius, & qualitas considerāda: quantitas quidem, qui copiosior est, quàm vt à calore etiā integer confici possit. Qualitas autem, quia natura sua flatulēta est, quod in multis alimentis cōtingit, & humore frigido, qui facilè in flatus resoluitur. Atque hi flatus cōtinuitatem soluūt, quia mēbranas & sensilia corpora præter naturā distendunt, & vi quadā futuras relaxant: vnde & diadematis, & fasciis arctiùs colligatis remedia inuenta sunt. Graue malum est, vbi materia putrescit, vnde febris, inflāmationes, & phrenitides.

*Flatibus vnde sit generatio.*

*Curatio.*

Recta vitæ ratio instituat. Aluus lubrica, aquæ potus, media aut parcissima vita, nisi à bile malum oriatur temperamentum. Ætas, cœlum, cōsuetudo,

## AD LIB. II. DE COMP. MEDIC.

& reliqua repugnent. Vitetur omnis vehemens motus corporis, & animi. Alimenta acria, acida, falsa, & omnia quæ vapores gignunt, clamor, strepitus, splendor magnus, nocturnus aër, sed is præsertim, quem illustant radij lunæ. In intemperie pura, neque phlebotomia, neque purgationibus utendum est: cum materia hæc sequitur. Si plenitudo grauis, obstructio, inflammatio, febris, contusio, insignis fractura, vulnus, ac denique si intolerabilis dolor est, venam secato. Celsus phlebotomiam superuacaneū remedium putat, ubi intolerabilis dolor non est: quem sequi nō oportet. Nam citra hunc in propofitis cōditionibus necessaria est. Vena cephalica aperienda, aut, si malum ab inferiori corpore, mediana, paulatim digito indito, expressa cephalica. Deinde perseverante malo, venæ capitales, in fronte, temporibus, post aures secare oportet. Itaque Medicū diligenter animadvertere oportet, ut qua parte dolor magis vrgeat, maior sit rubor, tumor, pulsatio, secetur vena capitalis. Arteriotomia cōueniet, ubi à sanguine calido & spirituofo dolor natus est, de qua lege 13. Meth. medēdi, & 6. de Sanitate tuenda. Setis quoque porcinis, folio arundinis, aut festucæ, irritanda sunt venæ interiores nariū, ut sanguis profluat: nam & inde sanguis sponte naturæ motus, dolores capitis dissoluit. Alij utuntur sanguisugis fixis in pinnis narium. Sed ante phlebotomiam, siquidem resistit aluus, clystere aut leui pharmaco purganda est: quia è facie intestinorū sublatus vapor sæpè dolorem mouet. Cucurbitulæ occipiti, vel paulò inferius in ceruice adhibentur, etiam cum scarificatu, nisi æger videatur oportunus paralyfi. Purgationes

*Intemperies  
nuda ne  
phlebotomē  
neque purga  
tionem postu  
lat.*

instituantur, vt est materia, ex ratione quæ in alopec-  
cia descripta est. Animaduertédum tamen in dolo-  
re, qui à flatibus excitatur, num flatu ab alimento  
generentur, aut à materia. Nam si ab alimento, fru-  
stra purgatio est: si à materia, id ipsum distingui de-  
bet. Nam si pauca, & solo capite inclusa, aliis reme-  
diis deduci debet. Si multa vel etiam toto corpore  
collecta, purganda est. Sed si crassa & frigida, inci-  
dentibus & concoquentibus priùs præparanda est:  
quæ si tota potest cōcoqui, & pituita dulcis est, non  
eget pharmaco: si salsa, putris, aut corrupta, necessa-  
riò purgāda est. Post habitam rationem totius cor-  
poris & capitis, per rationē vitæ, vacuationes, pur-  
gationes, ad particularem vacuationem capitis, per  
errhina, sternutatoria, masticatoria veniendum est.

Errhina & sternutamenta maximè conueniunt, in-  
cisa priùs & cōcocta materia, siquidem crassa est & *Errhina & sternutamen-  
ta concocta  
materia con-  
ueniunt.*  
viscida. Sternutamenta peculiariter cōueniunt, vbi  
caput multis vaporibus repletum est, vtrāque præ-  
ferēda, vbi pars anterior capitis purgāda est, quem-

admodū Ἀγματομήματα caput posterius melius  
repurgant. Illa tamen, errhina dico & sternutamen-

ta, suspecta esse debent, vbi imbecilliores oculi, *Eadem quā-  
do suspecta.*

vel iam laborant: adhæc quibus nates aut polypis,  
aut ozænis, aut aliis id genus vlceribus vel iam la-  
borant, vel opportunæ sunt, multò magis, si mate-  
ria repurganda virulenta est: id quod sæpè accidit  
in lue venerea. Hîc ergo masticatoriis potius vten-  
dum est. Masticatoriis similiter abstinendum, vbi  
fauces, palatum & reliquæ oris partes, pulmones  
quoque, vel iam laborant vlcere, vel vlceri oppor-  
tunæ sunt: hæc autem, ne fiat consuetudo, & vlcera

*Masticato-  
riis quando  
abstinendū.*

## AD LIB. II. DE COMP. MEDIC.

iam facta irrigentur, quæ resiccati oportet, vel quæ in metu sunt, moueantur, neque contrà. Nec facit quod quis obiiciat, materiam illectam, & deductam masticatoriis hiatu oris, & decliui capite, repurgari: quia in transitu vlcera irrigantur, & per somnum consuetudine facta iam non repurgatur materia. Errhina, alia sicca, alia liquida, alia verò euchrista, vt quæ illinuntur. Succis vtendum in maiore copia humiditatis, eoque corniculo vel fistula infusa priùs subtilissimè trita insufflantur, alioqui inspiratu attrahuntur.

*Errhinorum  
materia.*

Aliquando solus vapor satis est, vt nares scilicet admoueantur pyxidibus, in quibus illa reposita sunt. Liquida vel vola manus, vel cochleari excepta, tepida quidem inspirando attrahuntur. Quæ verò iam consistunt euchrista, digito, penna, vel alia re simili, illinuntur. Errhinorum materia, acris, amara, falsa, nitrosa, elaterium, piper, sinapi, elleborus, melanthium, cyclamen, maiorana, centaurium, pyrethrum, hyssopus, thymum, thlaspi, satureia, anagallis, beta, soldanella, sales torrefacti, ammoniacum, nitrum, & alia id genus. Liquida ex iisdem exsuccatis, vel liquori mixtis. Plurimus vsus est succi betæ, hederæ, mercurialis, parietariæ, maioranæ, anagallidis: contunduntur herbe, & vt faciliùs reddant succum, aliquid aceti, aquæ vitæ, vini, aquarum maioranæ, parietariæ, & similium instillatur: intermiscemus quoque aliquid zinziberis, piperis, nucis moschatae, eorum quæ priùs sunt dicta. In siccis errhinis, quorum si multum est succis permixtum, fiunt euchrista, aliquando teruntur sicca, ex aceto, aqua hyssopi, maioranæ, vitæ & similium: aliquando ex

iisdem friguntur, inuoluuntur linteo raro, & calida naribus admouentur. Ab imbecillioribus inchoandum ad fortiora, vt elaterium & euphorbiū, atque hæc temperantur lacte, mucagine althææ, psyllij, lini & similibus. Hæc omnia melius à balneo, siquidem hoc vsitatum est, alioqui matutino, laxato corpore: aquam autem continemus ore, aut lac, ne dum hæc immittuntur naribus, aliquid in os decadat, quod os exulceret, vel deuoratum lædat. Si inde nares incaluerunt, lacte vel aqua tepida immissa naribus, medendum est. Eadem seruanda sunt in masticatoriis, quorum materia eadem, quæ errhinorum. Sed excipiantur ferè mastiche, vua passa, ficu, cera: alioqui errhinorum materia vino incoquitur, ad gargarismos. Sternutamenta subtilissimè tritis errhinis siccis commouentur, sed maximè acris, elaterio, elleboro, castorio, zinzibere, pipere albo, & aliis id genus. Sequuntur topica. Ea repellunt & refrigerant, quæ conueniunt initio. Concoquunt & tenuant, quæ incrementis misceri debent repellentibus.

*Topica remedia.*

Quæ discutiunt, maximè conueniunt in declinatione. Dolorem leniunt, quorum maximus est vsus in vigore. Corroborantia locum habet, iam discussa materia, & pacatis doloribus. Itaq; raso prius vel detonso capite, remedia adhibenda sunt paulò crassiora, vt dictum est. Liquidiora hæc fiunt, vt melius penetrent pharmaca. Laxetur cutis, declinetur rædiū, quod relinqueretur, inquinatis capillis. Atque dum his vtimur, vel pharmaca repetenda, vel qui hac parte plurimùm cōueniant, clysteres acres iniiciendi, frictionibus partium inferiorum vtendū est.



## AD LIB. II. DE COMP. MEDIC.

Materia repellentium in humore, vel vapore frigido & crasso tepida applicatur, multò magis hyeme, & temperamêto frigidiorè. Contrà verò in materia calida & biliosa, frigida sunt repellentia. Verùm dum hæc aguntur, prouidendum vt ne caput nudatum pilis frigore lædatur, multò magis hyeme & cælo frigidiorè. Itaque cucuphis vocatis, & gossipio caput muniendum est, consuetis quoque pileolis, qui è materia conuenienti perfumari possunt, benzoino, stirace, caryophyllis & aliis id genus. Puluis quoque ex conuenienti materia intermisceri potest. Cucuphas ex gossipio, alioqui emplastra aluta inducimur, ex qua fiat veluti pileolus. Materia remediorum priùs descripta est, in dolore capitis ab æstu, ebrietate, perfriktione. Legenda est historia apud Æginetam de muliere, quæ cõtumaces huiusmodi dolores curabat decocto radicis cucumeris agrestis, & foliorum absynthij in hydrelæo: expresso oleo, quod relinquebatur, fouendum caput, & irrigandum. Materia verò emplastri modo applicanda: potest medicamentum augeri hydrelæo facto ex oleo conuenienti, chamæmelino, irino, & aliis priùs descriptis, cui oleo olibanum, opopanax, galbanum, benzoinum, & alia huiusmodi misceri possunt. Quod paratur ex atramêto, parabile est, sed vulgari scriptorio vtendum magis circa, initia, post initia verò, impressorio. Democritus vtēbatur arida fæce atramêti, quam diem integrum

*Cucupha muniendo caput  
inst. suenda.*

*Capitis vaporibus crassis discutien-  
dis cōueniens  
remedium.*

terebat ex aceto, deinde addebat octauam partem opij. Neque omittendum remedium, quod maximè conuenit vaporibus crassis, dum retinetur anima, seu respiratio, ligatur collum, vt his artibus san-

guis vnà cum calore & spiritu colligatur sursum in  
 venis & arteriis capitis, atq; ita collectus vaporē te-  
 nuet atque discutiat. Extrema remedia sunt, empla-  
 strum de Vigo cum hydrargyro, in pileolo aluta  
 capiti inductum, & toti ceruici affixum. Hoc reme-  
 dium in crassis & viscidis humoribus tempestiuè &  
 conuenienter adhibitum, plurimùm potest. Adhæc  
 sinapismus, diacopregias medicamentum, dropax,  
 quæ scripta inuenies cap. de Pyroticis 3, de materia  
 Chirurgica. Adhæc cauteria, *ἡ δὲ χέντεσις*, quæ  
 vocatur seton. In materia frigida, crassa hæc postie-  
 ma remedia conueniunt, non in calida.



AD LIB. III. GALENI  
 DE COMPOS. PHARMAC.

*ἔν τῷ πρῶτῳ.*

PERIOCHE III.

*De aurium dolore.*



Vribus acris sensus à natura datus,  
 descendente neruo à quinta con-  
 iugatione, cum dura meninge, fu-  
 soque ac disperso in meatum audi-  
 torium. Causæ dolorum in gene-  
 re, intemperies, morbus instrumen-  
 talis, solutio continui, particulatim refrigeratio, cal-  
 factio, densatio, obstructio, spiritus flatulentus, hu-

*Aurium do-  
 lora causa.*

# AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

*Aurium  
doloribus à  
frigid. quæ  
conueniunt.*

mor crudus, frigidus & viscidus illîc inclusus, humor mordax, sanies acris, inflammatio tum propaginis membranæ, tum nerui auditorij vlcus. Dolor autem in ambitum auris, propter circumpositas latebras extenditur. Refrigeratæ auri, & inde dolenti calorifica conueniunt, fel tauri cum adipe anatis, vt Arabes & Græci cum succo porri, quod remedium præterquam quòd calfacit, aperit quoque obstructions, terget, incidit. In hoc quoq; remedio consensus est Arabum & Græcorum. Cæpa, præsertim rubra, ampla excauatur, in cavitatem oleum conueniens cum succis conuenientibus & medicamentis immittitur. In calidis cineribus aut furnis vulgaribus super tegula coquitur, excipitur liquor. Oleum ex cæpa exprimitur, mixtura auri instillatur. Olea cōueniunt, in quibus folia ruthæ, lauri, eiusdémque, bacca, aut iuniperi, maiorana, origanum, rosmarinus, hyssopus, calamus aromaticus, piper, galanga, zedoaria, grana paradisi, zinziber, caryophyllum, & similia coxerint. Oleum de spica, de cinamomo, euphorbio, vel in quo vigesimaquarta pars euphorbij mixta sit, oleum è castoreo, de piperibus, de scylla, de scorpionibus, de ben, seu muscellinum, de nucleis persicorum, amygdalarum amararum, auellandarum, de galbano, ammoniaco, & alia id genus. Plurimum vtédum est succis ruthæ, baccarum lauri & iuniperi, canabis viridis, centaurij minoris, bryoniæ, ari, dracuntij, persicariæ, & rerum amararum: vbi præsertim frigiditati coniuncta est frigida materia & viscida, qua detergent. Materia sicca, castoreum, elleborus, calamus aromaticus, cardamomū, galanga, zedoaria, & alia in oleis memorata. Sacculi ex

culi ex eadem materia implentur, incoquantur vino acri & cretico seu maluatico, aut alio vino generoso: exprimuntur, admoventur calidæ auri, vt inde vapor excipiat. Dolens auris gossipio clauditur, vt vocant, moschato, pileolis cōsuetis omnino via ad aures frigori præcluditur. Ex oleis commemoratis vnguenta fiunt pretiosa benzoino trito, momento moschi & ambaris, id est, ambra grisea, addito.

*De dolore auris à calore.*

**G**AL. vtilissimum remedium putat in inflammatione & calore ouum crudum rosaceo subactum. Arabes liquore oui tenuis subacto ex aqua rosarum, nenupharis, violarum, lacte muliebri, succo parietariæ vel polygoni cum rosaceo vtuntur. Materia remediorum, quæ refrigerant & dolorem leniunt, itémque eorum quæ calefaciunt, amplissimè descripta cap. de dolore, lib. 3. de materia Chirurgica. Quo loco remedia quoque inuenies narcotica, quale est Philonium cum lacte muliebri, semina papaueris albi, hyoscyami albi lactuca, cucumeris, trita omnia affuso succo è foliis & floribus papaueris, nymphaeæ, hyoscyami, vel aqua rosarum, violarum, nenupharis, trochisci Stellæ dissoluti sapa, vel in lacte muliebri, Trochisci de croco descriptione Mesuæi. Finges pastillos narcoticos ex opio, castoreo, sinapi, calamo aromatico, pipere, & omnino addita materia, quæ concoquat, incidat, calefaciat, eritq; aliorum proportio ad opium dupla, quadrupla, sextupla. Vniuntur pastilli sapa, vino, in vsu dissoluuntur lacte muliebri vitello oui. In obstructionibus à crassis, vel flatibus, vel humo-

*Purgatio ad  
obstructiones  
à crassi fla-  
tibus & hu-  
moribus.*

ribus purgat corpus pillulis cocciis, assaieret, & de hiera mixtis, incorporatis cum expressione 3.ß. agarici troiscati infusi in oxymelite, sitque dimidium dragmæ cocciarum, aurearum ʒ. i. Purgato corpore, errhinis, masticatoriis vtendum est, cucurbitulis in ceruice & scapulis. Ratio vitę præscripta in dolore capitis ab eiusmodi materia, remedia topica, eadēque in dolore aurium à frigore, nisi quod debent seligi, quæ detergent, discutiunt flatus tenuāt.

*De ulceribus aurium.*

**H**vmor interdum è capite in aures defluit molestus primùm & plurimus, qui deinde putrescit, consuetudinem facit, vt iam nihil molestus sit. Vbi ex Hippocrate purgandum corpus, affigendæ scapulis cucurbitulæ: errhina, masticatoria sunt imperanda ad reuulsionem: detergenda sanies, siccādum vlcus. Sed primùm leuioribus vtendum est. Veteres remediis vtebātur, quæ iam exoleta sunt; quorum hic ordo est. Primùm vtebantur glaucio ex aceto, deinde pastillo Polyidæ, post Andronio, tum bythinio vel è charta, postremò è scorria ferri. Pastillos describit Galenus 6. *κτ' γένη* Paulus 7. Scoriam ferri variè præpararunt. Galen. primùm terit ex aceto acerrimo 9. de simpl. medicamētis, deinde ex eodem coquit. Arabes meliùs præparant. Terunt scoriam, ex aceto lauant, & deinde siccant in latere calido, vel feruente sole: siccā rursus ex aceto terunt: imbuunt aceto, siccant vt priùs. Idēque septies reperunt. Post hæc intenuissimum pollinem resoluunt, coquuntque longa coctione ex aceto acerrimo, dum sit mellis crassitudo, atque ita siccant. Remedium hoc maximam vim siccandi

habet:epuloticum est, quod non nisi bene puris vlc-  
ceribus, iisq; inueteratis & duris corporibus vsur-  
pandum est. Sunt qui frigrant octies in sartagine ex  
aceto, deinde cum aceto coquunt, miscntque ro-  
faceum: alij more Gal. tantum terunt, & aceto qua-  
druplo coquunt. Clementius est remedium hoc mo-  
do. Scoria ferri in frustula diuisa fictili crudo coqui-  
tur, dum vas percoctum sit: deinde extinguunt la-  
cte: idque bis & ter repetunt, cremant, extinguunt,  
tum in mortario terunt affusa aqua vel fontana, vel  
rosarum, vel plantaginis, vel simili, vbi diu versant,  
purgant, siccant: tum repetunt in mortarium, volu-  
tantque affusa pluuia: postremo siccant. Singulare  
auxilium, vbi citra morsum siccandum est. Recen-  
tiores abluunt mulsæ. Ablues & remediis scriptis  
cap. de purgantibus libr. 2. de materia Chirurgica.  
Post ablutum vlcus, succos parietariæ, anagallidis,  
faniculæ, buglæ, centinodiæ, plantaginis, bursæ pa-  
storis, millefolij cum melle coques, & his vteris. Si-  
militer melle rosato, syrupo de absinthio vel succo  
eius cum melle rosato. Eodem modo, apij succo, vbi  
metus est putredinis, addes puluisculum aloës &  
myrthæ, centaurij minoris, gentianæ, sarcocollæ. Æ-  
gyptiacum quoque solutum vino vel ænomelite,  
remedium est veterum & recentiorum. In siccanti-  
bus vlceribus aurium alumen vstum ex vino, vel, vt  
sit fortius, ex aceto tritum. Alij vrina pueri impubis  
vtuntur cum ænomelite. Forte est, ærago trita cum  
ænomelite scyllitico. Sed quibus remediis abluas,  
tergeas, sicces, inuenies cap. de purgantibus & epu-  
loticis in materia Chirurgica.

# AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

*Ad dolorem ex inflammatione, & sine ulcere.*

**S**anguinem detrahito: interdicito vino: nutrito, vt in febris. Sanguis ex cephalica eiusdem lateris detrahitur, clystere vel leui medicamento priùs instituto. Circa initia lenientibus medicamentis sine calore dolorem sedato. In quibus præstantissimum credidit Gal. ouum crudum ex rosaceo subactum, molliter immissum auri. Rosaceum sit legitimum, quod magna præcautione admonuit Galen. Ouum sit recens. Licet vti rosaceo cum tantillo aceti. Arabes hoc remedium leuiter coquant, tantillum caphuræ adiiciunt, quale fuerit rosacei optimi ℥.1. aceti ℥.2. leuiter bulliant in aqua calida: deinde misce caphuræ gr.4. Utendum quoque mucagine seminis psyllij & cydoniorum extracta in aqua rosarum. Hæc mucago per se vel mixta prioribus medicamentis vsui est: lac quoque muliebre conuenit instillatum auri. Quod si nimis vrget dolor, & inde periculum ægro imminet, ad narcotica priùs descripta confugere oportet. Iam remissis doloribus ad cōcoquentia simul & lenientia veniendum. Sed dum hæc fiunt, omnino procurandum, vt vel clysteribus, vel leuibus pharmacis moueatur aluus. Leniunt itaque & concoquunt mucagines seminis althææ, lini, fœnugræci, gummi arabici. Extrahuntur in aqua bismalux: adduntur pingua, butyrum, æsypus, adipēs gallinæ, anferis, adeps suillus recens & sine sale. Postea basilicum & diachylon paruum, oleo anethino, amygdalarum dulcium, chamæmelino, irino dissoluimus & aliis medicamentis leuioribus, quæ cap. de suppurantibus scripta inuenias. Farinis etiam hordei, fa-

barum, althææ, lini, fœnugræci coctis rosaceo, vel oleis memoratis, vti conueniet. Aliquid indetur auri. Magna pars toti auriculæ & ambitui in linteis applicabitur.

*De vermibus aurium.*

**V**ermes innascuntur ex putredine, quibus remedio sunt amara: qualia hæc: Olei persicorum, amygdalarum amararum ana  $\mathfrak{z}$ . i. succi apij, centaurij minoris, ana  $\mathfrak{z}$ . 2. aceti  $\mathfrak{z}$ . 2. Coque in calidis cineribus, deinde adde myrrhæ, aloës ana  $\mathfrak{d}$ . i. addito felle fiet efficacius. Aliud. Foliorum persicariæ, absynthij, graminis, athanasia, matticariæ, horum vnus vel duorum,  $\mathfrak{z}$ . 2. succi extracti ex nucleis persicorum addito pauco aceto  $\mathfrak{z}$ . 2. olei de fraxino  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . ellebori nigri  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ .

*Observationes quedam in doloribus aurium.*

**I**N his obseruandum ne quid durius; asperius, frigidius, calidius, grauius ex alto cadens dolorem exasperet. Liquidum sit medicamentum, tepidum, quod molliter instilletur, vel corniculo, vel crassiore penna secundum longitudinem diuisa in duas partes, extremo molli vel lana obuoluto, vt per cauitatem alueoli molliter influat medicamentum. Aliter hapso gossipij, lanæ, serici, imbuto prius medicamento & molliter expresso efficies, vt medicamentum leuiter influat. Vapores inferuntur auribus, sacculis (vt antè dictum est) tepidis expressis, spongiis cōplicitis, linteis in conueniente medicamento inculcatis, expressis, admotis. Aliter veteres lenticulas implebant decocto conuenienti, claudebant orificiū vel lana pauca, vel raro linteo, per quæ exhalaret vapor. Orificium admoueant



### AD LIB. III. DE COMPOS. MEDIC.

auri. Aliter quoq; corniculum auriculare fingi potest, altero extremo latiore, quodque sit satis cōprehendendo orificio lenticulæ : altero angustiore, quod auri inditur: vocāt per embotum. Sed corniculum cū sit inflexum, cōmodius est: alioqui emboto vocato vtendum erit. Quod si inflexo collo iisdē corniculo auri inditis, & ab alio exuctis flatus & alia corpuscula extrahūtur auribus, vel instrumētis, quę similia sunt vulgaribus siringib<sup>9</sup>, exsufflatio ab ore, & naribus efficiet, vt vapor meliūs attrahatur, & excidant, quę restiterunt in auribus.

*De corpusculis, quę incidunt in aures.*

**A** Qua, lapilli, festuca, animalcula, faba, & alia id genus incidentia auribus, periculum graue afferunt, nisi maturē excludantur. Nam inde dolor grauis, distentio, surditas, inflammatio, febris, conuulsio, mors denique consequitur. Iubebis ergo vel corniculum, vel stipulam, vel plumam comparari, quę aperta extremis partibus, altera quidem in aurem immittatur: altera comprehendatur ore, vt fiat suctus, & inde quod lædet, extrahatur. Alij extremam partem infarciunt stupa, qua incensa orificium externum claudunt. Incenditur autem extrema parte, quę foras prominet: alioqui iuncum lucernarium, medullā sambuci, ceream candelam, veruculum ferreum vel argenteum extrema parte inducūt visco, glutine, terebinthina, ac re omninō viscida, quam immittunt auri, vt quod lædit, aglutinet. In materia duriori eiusmodi instrumentorum molli lana extrema mollienda sunt: atque dū eiusmodi instrumēta induntur auribus, omninō prouidendū, nequid diffingatur, quod relinquatur aure.

Quòd si quid viscidum pòst extractum corpusculum inhæsit auri, detergente decoctione eluendum est. Iubendus æger vt inclinata aure celeriter descēdat è gradibus, aut mōte insiliat pede, qui auri læsæ respondet, tussiat. Sternutatione vtendū: atque aliquando cietur sternutatio, vt violento motu, quod lædit, excludatur. Nōnunquam eadem prohibetur præhensis clausisque naribus, vt aure, vt retentus spiritus impetum faciat in aures. Tabella illa, cuius meminit Gal. violentum remedium est, concussio puerorum prehensio pede, herniæ pericalum facit in molliore corpore, & quod ei malo opportunū est.

*De graui auditu.*

**I**N læso auditu vel præcipuum instrumentum læsum est, vel quæ partes ei seruiunt, vel cerebrum ea præsertim parte, vbi oritur quinta neruorum coniugatio à qua neruus auditorius est. Præcipuum instrumentum auditus extremitas est interna meatus auditorij, vbi neruus cum dura meningē exporrectus attingitur. Læduntur autem intemperie, simili morbo & solutione continui. Intemperies rebus externis & morbo contrahitur: animaduertendūque qualis præcesserit morbus, calidusne an frigidus, vt inde cognoscatur intemperies. Morbi instrumentales hoc loco ab obstructione, quia non potest esse communicatio aëris externi spiritus auditorij. Obstruitur meatus à tumore præter naturam, tuberculis, aut carunculis adnatis, crassiore pure, crassa & viscida materia, copia sordium, corpusculis incidentibus. Solutio continui, vt in vlcere. Intemperies curanda contrariis, calida frigidis, frigida calidis, quorum materia supe-

*Auditus  
præcipuū in-  
strumentum.*

# AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

rius descripta est. Obstructio liberanda remediis cōuenientibus, vt si ab inflammatione, iis, quæ contra inflammationem scripta sunt. Si ab œdemate, incidentibus, attenuantibus, detergentibus. Similiter si à crosso pure aut pituita. Materia autem in dolore scripta est contra flatus & crassam pituitā. Scirrhus mollientibus, incidentibus, tenuantibus, & ea ratione, quam scriptam inuenies cap. de malacticis, percuratur. Tubercula, verrucæ maximum negotium faciunt, & vix nisi ferro, aut eo genere remediorum, quæ exedunt supercrescentē carnē, curari possunt. Corpuscula eximenda iis artibus, quæ proximè dictæ sunt, sordes auriscalpio & detergentibus infusionibus expurgandæ sunt. Quibusdam vi tonitru, bombardarum, campanarum, laborat auditus, quibus vox lenis, tarda, exigua, numerosa aut musica similis mulicorū instrumētis remedio est. Peculiariora quædam remedia sunt contra læsum auditū, qualia quæ sequuntur. Castoreum solutum aceto & mixtum oleo amygdalarum amararum: bacca lauri vel iuniperi: terūtur paulatim, affusa aqua vitæ: singulis vnciis expressi succi, dimidiū drachmæ ellebori nigri permiscetur. Subtilissimè trita colocynthis oleo cōuenienti permiscetur, vel eadem oleo & vino addita parte aceti: coquitur oleum, vsui est. Vtile balsamū artificiale & acopa, quæ scripta inuenies cap. de dolore. Suffumigia fiunt per corniculū ex caryophyllis, ligno aloës, baccis lauri, ramētis iuniperi & rosmarini, maiorana sicca. Meliora fiunt, si in aceto scyllitico macerentur, vt ex omnibus fiat suffumigium. Fiunt quoq; trochisci ex elleboro albo, castoreo, pipere, calamo aromatico, boraçe, iūctis aceto.

*Auditus  
læsus peculiariora  
remedia.*

Trochisci vsui sunt fuffumigiis, vel foluti in oleo conuenienti ex adipis anguillarum vncia vna, olei mufcellini femuncia, fucci caprifolij & Iouis barbæ 3.2. aceti 3.1. ouis formicarum, quantum capiat dimidia tefta nucis. Coquuntur omnia in vafe teftaceo: colatura vtrique auri infunditur, atque omnino materia conuenit prius descripta contra dolores aurium à craffis & vifcidis humoribus. Desperatis aliis auxiliis decoctum ligni fancti, & emplaftum de Vigo toti ceruici adhibitum, & poft aures, fingulari remedio eft: verum cognoscendum eft inueteratum malum effe immedicabile, atque inueteratum putant poft duos annos, & vbi æquabilis furditas eft, neque augescens, neque remittens sese, aut vbi fcirrhus aut tuberculum interius iam intercipit meatum auditorium, vbi in interiore meatu folutio continui eft in neruo auditorio. Medicamenta liquida effe oportet, tepida, quantitate modica, fubinde commutata, vt tertia quaque hora. Atque priusquam noua immittantur, detergenda auris atque repurganda. Iaceat æger in aurem fanam, vt medicamentum influat. Sed quia iniecta in aurem cohibita sæpè corrumpuntur, & præsertim quæ funt pingua, propterea fuffumigia & vapores præferunt iniectis. Quod fcripfit Hippocr. cessare furditatem biliosis deiectionibus, de furditate critica vel fymptomatica in morbis intelligendum eft.

*De Parotidibus.*

**A**bscessus funt glandularum, fed auribus sæpe numero pestilentes. Omnino pestiferi, nonnunquam maligni, quales fcribunt viguiffe, multosque rapuiffe anno 1510. Nonnunquam clemen-

# AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

tes sunt, quales viguerunt anno 1545. & præcipuè vere. Nōnunquam sunt critici, qui si intrò redeunt, lethales, nisi alui profluuium, vel insignis excretio subsequatur. Alij tardiùs erumpunt: alij celeriùs. Quidam cum dolore & inflammatione: quidam sine his. Itaque vbi vel dolor grauis, vel inflammatio, clystere molli vel leui pharmaco moueatur aluus: deinde auferatur sanguis è cephalica eiusdè lateris, tum medicamentis, quæ leniant, vtendum est. Cataplasmata ex farina hordeacea cocta hydrelæo, cerato variè comparato ex oleis, quæ nō reprimant quidem, sed refrigerent, qualia scripta inuenias cap. de dolore: quibus mucago psylij misceri potest, præsertim vbi calor coniunctus est. Abstinendum hoc loco, vt in toto genere parotidū, medicamentis, quæ reprimant. Pacato dolore digredientibus nec ita calefacientibus vtendum est, vt si fieri potest, materia resoluatur. Quòd si resolui non potest, & ad suppurationē vergit, suppurantibus vtendum est: qualia sunt farina tritici hydrelæo cocta, butyro vel axungia mixta. Acetosa nō ita manifesta ratione cocta sub cineribus suppurat. Potest pinsi cum butyro, radici liliorum coctæ permisceri. Similiter licebit vti radice lapathi acuti, althææ, liliorum cocta, & cum butyro pista. In calore hyoscyamo cum butyro vti licet. Archigenes diu fouebat tepida: deinde cataplasma è farina hordeacea adhibebat, quod scriptum inuenies, vt alia multa, cap. de suppuratibus. Vbi iam pus factum est, vel ferro decliui parte, vel ruptor. o vocato vomica aperies. Vtêris medicamentis, quæ pus exhauriant. Materia describitur cap. de resoluentibus, de vomica aperiēda,

*Parotidilus  
omnibus re-  
primētia ini-  
mica.*

de pyroticis. Vbi apertus est abscessus, vlcus suo more curandum est, & purgandum sordibus, incarnandum & cicatrice ducendum: ac fit aliquando in malè curatis parotidibus, vt fistulæ ducantur, contra quas incipientes, Gal. vehementer probat pharmacum quod sequitur. ℞. olei vetustissimi, alioquin ricinini, anethini, caryini, cocti in fartagine ʒ. 6. aceti fortissimi tantundem, lithargyri ʒ. 4. Bulliant simul, coquantur per diem semper agitando, donec nigrescat pharmacum, splendeatque. In mitibus parotidibus hoc medicamentum sufficiet. Olei chamæmeli, liliorum, butyri recentis ana ʒ. 6. croci grana 6. Fiat linimentum, superponatur lana sordida. Quòd si paulò durior videatur abscessus, admiscebis & retrapharmacum, vel dialthæas, vel diachylon paruum, de muscillaginibus, resumptium, vel aliquod id genus, qualia multa inuenias cap. de malacticis. Ac primùm crassiusculis linimentis, postea compage mollium emplastrorum, præsertim si dolor abest, vti conueniet, vt si durities relicta fuerit, vteris remediis contra scirrhos ex cap. de malacticis.

*De narium affectibus.*

**I**N nares propago à dura meninge, nervus à tertia coniugatione descendit, patet & foraminibus exterioribus: & altero angustiore, quod ad mammillares processus, & anteriores ventriculos cerebri pertinet: altero ampliore, quod ad palatum & os diuertit. In naribus polypi fiunt & ozænæ. Polypus tumor est præter naturam duriusculus, similis substantia caruncula polyporù pisciù. Ozæna vlcus est malignum, quod ab acri fluxione, & aliquando

*Polypus.*  
*Ozæna.*

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

putrilaginosâ nascitur, atque putredinis signum est, quod grauius olet: neque omne vlcus narium ozæna est. Nam sæpè à pituita falsa vlcera concitantur in naribus, quæ crustulas ducunt, & faciliè curantur. Ozænis malignitate respondent vlcera in lue venerea suborta, quæ & aliquando, vt ozæna, cancrum referunt: quod vbi fit, magna desperatio est neglectis eiusmodi vlceribus. Os nasi cariem ducit, atque corrumpitur, vnde forma naturalis nasi deprimitur & deperditur. In ozænis & polypis hæc sunt communia. Vacuandum corpus aliquando phlebotomia è cephalica: deinde etiam è venis, quæ ad labra perueniunt: deinde purgatione, ex quo resiccandum caput optima vitæ ratione, & medicamentis. Idemque corroborandum est in medicamentis, quæ resiccant caput & corroborant. Cucuphæ sint gossipio intertextæ & conspersæ puluisculis, qui siccent & corroborant, quales sunt è ligno aloës, caryophyllis, macere, moschata nuce, stêchade, saluia, maiorana, mentha, rosmarino, betonica, lauendula & aliis id genus. Præterea frictio è sponsia à sincipite ad occiput & latera ducta. In medicamentis, quæ raso capiti adhibentur, emplastrum barbarum, tum quod descriptum inuenies cap. de hæmorrhagia, tum quod cap. de glutinâtibus, vel quæ sequuntur. Myrrhæ, thuris ana ʒ. i. duo oui albumina, limaces triticum suis testis numero sex, rursus terantur omnia in mortario, & linteis inducta, capitiq; affixa 9. dies sinantur. In medicamentis topicis differentia est, quia ozænis conueniunt, quæ repellant & discutiant: in polypo, qui ab humore crasso & viscido nascitur, quæ adstringant, incidant, tergeant, discutiant,

Atque in ozænis alia quidem remedia lenia sunt, alia verò acria, quibus in rebelli malo, serpente & putrido vtendum. At mediocria ex vtróque genere fiant, vbi malum erit mediocre. Lenia sunt rosæ sicca inperse, plantago sicca, herba vocata scorpioïdes, clymenum vulgare, malorú granatorum trium generum succus leuiter coctus, vel cum melle in vase æneo ita coctus, vt crassitudinē habeat. Mel vstulatum cum succo plantaginis, cum puluere ireos, myrrha, aloë. Fortia sunt, aquæ fortes, metallica acria, pulueres dracuntij, batrachij, & quæcunque acria sunt. In leuibz verò metallica, quæ sine mortu siccant, quale est plumbi recrementum, lithargyrus, cerusa, pompholyx, puluis malicorij, & magma illud Galeni ex cōtusis granatis. Ceterum cum omnis ozæna vlcus sit, ordine quidem curanda est, purganda sordibus, incarnanda & claudenda cicatrice. Purgabitur hydromelite è decocto marrubij, centaurij, gaiaci, apij, absynthij, agrimonie, mixto aliquando sero lactis, vnde acrimonia lactis retundatur, aliis quoque abundè scriptis cap. de purgantibus. Purgatum vlcus aqua forti, qua aurum separant, aqua sublimati attingi debet. Mel Hispanicum tostum, addito puluere corticis gaiaci, purgat, incarnat, & cicatricem ducit. Recrementum plumbi tenuissimè leuigatur æquali parte vini austeri, deinde adiecta æquali parte olei myrthini ad spissitudinem coquitur: psoricum Mesue huic rei vtile est. Ægyptiacum siccatur, & inde puluisculo facto aliquid aristolochiæ admiscetur, gentianæ & similibus. Gal. pastillis Andronis, Polyidæ & similibus utebatur, quos scriptos inuenies cap. de Hæmorrhagia. Sed

*Ozænâ pæ  
optime pur-  
gent.*



# AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

quia medicamentorum vis subinde affluente humore diluitur, subinde cōmutare oportet. Negotiū fit maius, cum vlcera ea parte sunt, qua foramen est narium ad palatum: quia non tā facilē medicamenta adhiberi possunt. Iubendum ergo, vt æger maiore vi inspiret, vbi medicamenta immittūtur: alioqui os amplissimē aperiat demissa lingua, vt specilli extremo medicamenta ad vlcus adducantur. Sunt qui firmum asperūque filum, vel è setis textum in nares mittant, impellāntque, vt æger magno inspiratu attrahat, & alterum extremum in os perueniat. Itaque vtroque extremo filum prehensum diducitur, vt asperetur vlcus, & sanguinem reddat: deinde filum medicamenti illinunt, vt inde cōtingat vlcus. Nec desunt, qui acum plumbeam eo filo transigāt, ne filum reduplicet. Resupinato capite & naribus esse oportet, quum medicamenta immittuntur: iubemúsque aliquando, vt vel muliebre lac, vel aliud, vel aquam ore contineant, vbi acria medicamenta sunt lethalia, ne quid translatum in os deuoretur.

## *Cura polypi.*

**I**N polypo particulatim conueniunt ceratum myrrthinum, ceratum ex cera rubra cum oleo myrtillorum. Sed oportet ceratis addere sextam, octauam, decimam, duodecimam partem ægyptiaci, vel æruginis. Alioqui tantundem alicuius pharmaci generis eorum, quæ cathēretica dicuntur, quorum materia & descriptio est cap. de pyroticis. Ad idem facit pforicum Mesue, Macerionis emplastrum, tetrapharmacū cum duodecima parte æruginis, Lamponis medicamentum, quæ omnia scripta inuenias lib. de materia Chirurgica, & quo-

modo sit eis vtendum. Ex argenti spuma & cerusa, vino, aceto & myrthino oleo coctis fiunt vnguenta, quibus aliquid pulueris malicorij, rosarum, balaustiorum, aluminis & similium misceri potest. Puluis & succus dracuntij, cum foliis, radicibus, seminibus, medicamentis miscetur, vt proximis vnguentis, succo granatorum mixtura fiet, vt sunt corpora, & contumax malum est. Malicorium tritum, coctum cum parte trofchicorum Alubiadis efficacissimum remedium est. Describuntur cap. de Pyroticis. Quod si crustæ fiunt vel in ozænis, vel poly-  
*Malicorium tritū efficaciss. ad polypos remediū.*  
 pis, medicamentis siccantibus resiccare oportet: qualia sunt epulotica, vnguentum de cerusa, & alia id genus ex cap. de epuloticis. Deinde vel volsella molliter commouendæ, vt leui motu decidant. Nunquam enim vi excutiendæ sunt, nisi iam resiccatae non ita hæreant. Veteres sternutatorio utebantur, vt maturæ crustæ deciderent. Alij emolliunt butyro, adipe anseris, aut gallinæ, muccaginibus tragacanthæ, gummi arabici, vt emollitæ cadant crustæ. Remedia resupinato capite alia quidem instillantur: alia corniculo insufflantur: quædam specilli nucleo capta inferuntur naribus, vel è pyxide, cochleari, vola manus inspiratu trahuntur vapores è vasis angustioris orificij admoti naribus. Excipiuntur in vlceribus narium à lue venerea remediis, quæ contra hunc morbum adhiberi solent: illitu, emplastris mercurialibus vtendum est.

De hæmorrhagia non agemus hoc loco, propterea quod de ea abundè à nobis actum putemus cap. 4. lib. 3. de materia Chirurgica. Illinc petantur remedia.



# AD LIBRVM QVART.

## GAL. DE COMPOSIT.

PHARMACOR. *καὶ τόπος,*

### PERIOCHE IIII.

*De Medicamentis ocularibus.*

*Topica me-  
dicamenta  
ocularia.*

**M**edicamenta ocularia alia sunt, αἰώ-  
δυνα, quæ & λυσιπρόνια appellant,  
cæque dolores leniunt. Alia repellunt,  
sed leuiter, & adstringendo robo-  
rant. Nonnulla sunt, quæ cōcoquant  
& extergent, discutiant, molliunt. Plurima quo-  
que excrescentem carnem consumunt : quædam  
peculiariter confirmant oculos, conseruant visum,  
& aciem eius intendunt, hieracia & oxidorcia. Vl-  
cera oculorum peculiaria habent medicamenta:  
sed leuiora aliis vlceribus, quæ videlicet extergent,  
siccant, incarnant, cicatrice tegunt, aut crassiores  
cicatrices exterunt : quorum alia mitiora, vt citra  
morsum siccant : alia paulò acriora, de quibus om-  
nibus ordine dicendum est.

*ιεράκια.  
ὀξύδερκῃ  
κοκκύρια.*

*De dolore oculorum.*

**D**olores oculorum, inquit Hippocrates, meri-  
potio, balneum, fomētum, venæ sectio & epo-  
tum medicamentum soluit. Meraco vino vtitur,

vbi

vbi bene puro corpore venæ oculares, quæque vicinæ sunt, crasso sanguine, vel eiusmodi vapore repletæ sunt. Sit vinū vetus, tenue, giliuum, odorum, non adstringens, quod vel in cibo, vel inter cibos propinetur. Nam ieiuno datum vehemēter nocet. Et quanquam ab Hipp. scriptum est, mei potus, & consuetis tamen, & natura biliosis, adolescentibus quoque leuiter dilui potest, sed minùs solito. Ac quidā ex veteribus calida diluebant. Phlebotomia vbi corpus plethoricum est, & dolor grauis excruciat. Eligitur vena primū basilica in plenitudine, vel mediana, deinde cephalica: postea in trōte: Postremò ex angulis oculorū, nisi vlcuscula, quæ phlyctenas vocāt, aut profundius vlcus cum inflammatione adfit. Tunc enim reprobāda phlebotomia in minoribus venis, sed venī amplo foramine aperire conuenit, vt sanguis crassior effluat, & maturius sequatur animi deliquium, quod in asperimis doloribus magnā vim habet, vt ex aliquot historiis licet colligere. Balneum vsui est vacuato corpore, cocta inflammatione. Vbi acris fluxio est, fomento vteris, initiò quidem, vt tentes num corpus reliquum, vel caput laboret. Sic enim adhibito fomento dolor fluxioq; augebitur. In incremento & vigore, vt lenias: in declinatione, vt discutias & corroborea. Verū fomēta in mollibus linteolis & leuibus applicentur, nequid vel grauitate, vel aspredine, vel duritie lædat. Propterea Hipp. saculos reprobat. Medicamentum epotum in cacochymia pro natura vitij, quod redūdat. Sed præter hæc, frictiones cucurbitulæ occipiti & ceruici affixæ, vincula reuellēdo doctores leniunt: leues quoque inspiratus cōprehensō

*Animi deliquium in asperimis doloribus fomentum.*

# AD LIB. II. DE COMPOS. MEDIC.

ore medicamento, quod vim habeat leniendi, dolores sedant. Medicamēta topica duorum sunt generum. Alia reuera leniunt: alia stupefaciunt. Sed stupefacientibus non temerè vtendum, qualia sunt collyria è cerusa lota, amylo, opio, & breuiter, quæ opium aliâque id genus recipiunt. Nam vehemēter fluxiones reprimere non possunt: sed excerni prohibent, vnde erodi corneâ contingit, si acris fluxio est: vt si multa, magis irritari, aut vehemēter intendi, nisi medicamentum fuerit vehementer narcoticum. Intolerabilis dolor remouetur, sed stupefactio aliud malum sequitur. Nam vis oculi omnino læditur, vt in posterû vel nihil, vel hebetius videat. Hinc quoque relinquitur dura quædam dispositio tunicarum, quæ non facilè corrigitur. Hæc Gal. qui non solum his, sed & in leniendo dolore emplasticis pinguibus, nimium adstringētibus, abstinentum putat. Emplastica poros infarciunt, ne quid exhalare possit. Adstringentia immodicè eosdem constringunt, atq; ita interceptis viis, per quas debet fluxionis materia discuti, eadem retenta, in oculis dolores exasperat. Sed præter hæc adstringentia tunicas nimium resiccāt, & inde visum hebetant. Pinguia verò propterea prohibet Gal. oleum & alia id genus, quia in vehemēti ardore oculi faciliè incenduntur. Eadem quoque sordes faciunt, & omnino vlcerum initia sunt. Tutior itaque vsus est eorum medicamentorū, quæ reuera anodyna sunt, qualia sunt fomēta ex sola aqua tepida, ex decocto meliloti, chamemeli, fœniculi, anethi, fœnugræci, rosarum, absynthij. Quòd si calor multus coniunctus est, ex decocto psylij, foliorū mādragoræ, hyoscya-

*Oculorum  
anodyna duo  
rum sunt ge-  
nerum.*

*Oculorum ar-  
dor vehemēs  
pinguia res-  
puit.*

mi, papaueris, violarum, rosarum, similiter liquor oui, aqua rosarum, mucago seminis cydoniorum, medulla cocti cydonij, vel pomi alicuius cocti in vapore aquæ. Moderata est mucago althææ, tragacanthæ, gummi arabici, lac muliebri, sænugræci bene loti prius infusi diem integrum, deinde cocti, ut prima & secunda aqua abiiciantur, penidia, alphenic, diatragacanthum frigidum, amyllum, muliebri lacte dissoluuntur, leniēdo leuiter, & citra morsum extergendo, creta similiter uti licet. Anodynon est oui liquor cum suo vitello. Aliquando caphuram miscemus, ut in hoc, quod lenit & coquit. ℞. mucaginis seminis psyllij & tragacanthæ extractæ in aqua bismalua 3. 2. liquorū oui 3. 3. croci 3. 3. caphuræ Gra. vj. Atque meminisse oportet recentibus mucaginibus & succis utendum, quia vno atque altero die acescunt, atq; corrumpuntur. Quæ collyria anodyna dicuntur, ferè opium recipiunt, quale est diarrhodon Nili, quod etiam ingentes dolores lenit, tenues fluxiones, acrésque sistit. ℞. rosarum resectis vnguibus 3. 3. croci 3. 2. gummi arabici 3. 1. spicæ nardi, opij ana. 3. 3. cum aqua fit collyrium. Vsus tēpore lacte muliebri, vel liquore oui liquidissimè diluitur. Anodyna enim liquidissima esse oportet. Arabes hoc collyrium, si est rosatum vocāt, atque ita conficiunt. ℞. rosarū resectis vnguibus 3. 15. croci 3. 18. gummi arabici 3. 19. spicæ, opij ana. 3. 2. fiat si est cū aqua pluvia. Habent & si est alba, quibus plurimū vtuntur: quale hoc est in principiis inflammationū & dolorū. ℞. gūmi arabici, tragacanthæ, amyli ana. 3. 3. cerusæ lotæ 3. 6. opij 3. 1. opiū in sapa aut vino dulci tēperatur: deinde reliquis iungitur in oui albumine,

# AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

In vſu diluitur lacte muliebri. In augmento hoc conuenit. ℞. ſarco collæ nutritæ in lacte muliebri, aut aſinino ꝑ. ſ. amyli, diatragacanthi an. ꝑ. ſ. ceruſæ lotæ ꝑ. 6. olibani ꝑ. 1. ſ. confice cum aqua pluuiæ.

*Alexandri mirabile in calida ophthalmia & dolore.*

**C**Admiæ vſtæ, lotæ ꝑ. 10. ceruſæ lotæ ꝑ. 1. ſcoriæ ferri vſtæ lotæ ꝑ. ſ. gummi arabici, tragacanthæ ana ꝑ. 4. olibani, opij ana ꝑ. 2. croci ꝑ. ſ. confice cum aqua pluuiæ. In declinatione ſarco collæ nutritæ ꝑ. 10. croci, ſpicæ, aloës ana ꝑ. 1. Teruntur omnia ex muccagine ſeminis fœnugræci. Linimenti modo adhibentur. Sed quia in ocularibus remediis, ſæpè cadmiæ vſtæ lotæque, & ſarco collæ nutritæ mentio fit, vtriuſque ratio explicanda eſt. Cadmia itaque, quæ & Cathinia dicitur, vel cuius loco lapide calaminari vtimur, vi ſiccandi & extergendi prædita vtitur, & lauatur, hoc modo. In fruſtula magnitudine grani hordei confingitur, melle optimo conſpergitur, concluditur fictili crudo, cuius officium operiendo clauditur, lutaturque. Sed operculum vno vel pluribus foraminibus peruium eſſe oportet, vt fumus exhalet. Vas autem, vbi coctum eſt, ſubiecto igne vel in fornace ſigulari, iam ignita cadmia & vaporibus nigris in albidos commutatis, qui, ſcilicet, per foramina operculi exeunt, tollimus, & ablato operculo cadmiam vino aſtremo extinguiamus, & mortario terimus, ſiccâque ad medicamentum reſeruamus. Aliter quoque veteres. Cadmia incluſa fictili vaſe puro igne crematur, deinde lacte aſinino extinguitur: ſecundò ac tertio vritur atque extinguitur lacte: iam tertio vſta extinctaque

*Cadmia  
preparatio.*

in mortario affusa aqua fontis diutissimè versatur, purgatur, siccatur, siccata secundò ac tertio in mortarium repetitur, versatur vt priùs, & siccatur.

Postremò cum aqua pluuià in mortario circumagitur, siccatur, iam omnis qualitatìs expers, ex qua fiat collyrium planè diuinū, vbi dolor sedādus est.

Vlcera implenda, siccanda hypopia, vbi sistenda est acris fluxio, & leniēda calida lippitudo, vbi pruritus, ardor, vstio, sed peculiariter, vbi detergendum & siccandum.

℥. cadmiæ, vt antè, præparatæ ʒ. 2. cerusæ è lacte lotæ sæpiùs ʒ. 2. ʒ. Cerusa cum cadmia sæpiùs miscetur, & 15. diebus in mortario ex aqua pluuià versatur. Postremò tragacanthæ lotæ & purgatæ ʒ. ʒ. succo fœnugræci per noctem imbutur, vt multum succum imbibat. Postridie vniuntur omnia: reponuntur vase vitreo operto tenui linteo, loco subdiali, & bene puro. In vsu dissoluitur oui liquore, vel muliebri lacte. Sarcocolla citra morsum siccatur, coquit, digerit leuiter, amaricat. Trita itaque maceratur in aqua rosarum tribus diebus, tum siccatur, & pluribus diebus in succo rubi maceratur, siccaturq; postremò infunditur in lacte muliebri, siccaturque blandissimum medicamentum fit.

*De repellentibus.*

**R**epellentia duorum sunt generum. Alia leuiter repellunt, quæ conueniunt oculis, eaque vel leui frigore, vel corroboranti adstrictione reprimunt. Alia verò vehementer adstringunt noxia oculis, quia poros contrahunt, tunicas resiccant, exasperant, dolores creant, visum interturbant, quibus tamen aliquando, vt in procidentia oculi,

*Repellentio  
genera duo.*



# AD LIB. IIII. DE COMPOS. MEDIC.

*Repellentia  
leniora.*

sed aliis mixtis, utimur. Leuiter repellunt rosarum succus, flores, folia nardi, spica, crocus, hypocyſtis, oui candidum, muccago pſyllij, ſumach, cydoniorum, aqua rosarum, plantaginis, & quod ex mororum ſucco præparatur. Succus mororū rubi quar-  
tarium vnum ſiccet in ſole, ſubinde agitando: vbi fuerit ſiccatus, imbuere liquore oui, & ſine ſiccari in ſole. Poſtremò conſperge lacte muliebri, & fac ſiccari. Puluiſculo vttere ſoluto liquore oui, vt lenias & reprimas. Repellunt quoque cadmia uſta, vt prius, & auitero vino extinſta: deinde trita è puluis, & quæ metallica citra morſum ſiccant. Deinde hæc, quæ leniunt quoque. ℞. farina capitum papaueris & meliloti ana. P. i. pul. rosarum P. ſ. panis albiſſimi ℥. 2. fiat decoctio in lacte mixtis pulueribus in fine decoctionis. Deinde transferantur omnia in mortarium, & ſubigatur cum ouo integro & croci ſcrupulo. In doloribus oculorum abſtinendum à multis linteis, vinctulis arctioribus, grauibus ſacculis aut cataplaſmatis: ſed tenuiſſimis linteolis medicamēta continenda ſunt: videndumque, ne remedia, quæ adhibentur, dolorem creent, & priuſquam ſiccantur, commutanda ſunt. Et quia in doloribus oculorum multa ferè lachrymatio eſt, quæ vim medicamentorum diluit, propterea ſubinde commutanda ſunt remedia.

## *De ulceribus oculorum.*

**V**Lcus in alba tunica cornea, genis, angulis oculorum à re externa fit, vt ſtylo, gladio, vel aliter. Præterea ab acri fluxione, cui prudentiſſimè occurrendum eſt, alioqui ne vnà procidat & ſequatur cæcitas, periculum eſt. Hoc vlcus in

genere quidem cōmunem habet curationem cum reliquis vlceribus. Vult enim repurgari, ficcari, impleri, & cicatrice claudi. Peculiariter tamen ex natura partis clementiora remedia desiderat, multò magis, si proprietate indiuidui acerrimo sensu & purissimo spiritu præditi sunt, quales ferè sunt oculi cœrulei. Declinanda itaque tum quæ exasperando tergent, tum quæ mordicando siccant & nimia adstrictione exasperant. Atq; hæc vlceri, qua vlcus est, propriè conueniunt. Nam & in collyriis & remediis ocularibus sæpè mixta inuenias, quæ sunt acria, vt in malignis & nimium sordidis vlceribus, quæ dolorem leniunt: vt in dolentibus, quæ molliunt: vt in callosis, quæ plurimum adstringunt: vt cùm magno impetu irruit fluxio in oculos, vel à prolapsu, vnde mixtus est. Quæ omnia vt non statim vlceri conueniant, conueniunt tamen per accidens. Ita- *Collyrium.* que influxionis impetu stalticis vocatis, id est, sistentibus, vtimur, quæ materiam recipiunt frigidam & adstrictoriam, quale hoc est singulariter prædictum. ℞. æris vsti, cadmiæ vstæ lotæque ana ʒ. 3. myrrhæ, opij ana ʒ. 4. acaciæ, gummi arabici ana ʒ. 7. Ex aqua fingitur collyriū, quod liquore oui dissoluitur in ipso vigore, quando sordes & maturatio tum in vlcere, tum in lippitudine apparet. Sed hîc animaduertendum, quod sit commune omnibus ocularibus remediis, oculos parum assuetos medicamentis sæpè irritari, cùm primùm medicamenta adhibentur. Quod si contingit, tepefacto liquore oui dolor sedandus est: deinde medicamentum adhibendum donec assuescat oculus. Conuenit & collyrium prius descriptum in præparatione cad-

## AD LIB. IIII. DE COMP. MEDIC.

miæ, additis rosa, hipocystide, acacia, & ʒ. i. opij in dolore vehemēti. Aliud Philoxeni, quod impetum fluxionis reprimat, caput siccat, lenit & stupefacit. ʒ. rosarum ʒ. 2. seminis hyoscyami albi, ʒ. i. thuris ʒ. 3. myrihæ ʒ. ʒ. farina volatilis, vel hordei tosti ʒ. 2. ʒ. oui tosti luteum vnum, succi mandragoræ, vel hyoscyami, apij ana ʒ. ʒ. crocci ʒ. 2. ex vino austero fit collyriū. Siquid inest durtiei, thus pingue, myrrha, bdellium, galbanum, ammoniacum & similia miscentur collyriis: sed ad sistendas fluxiones, quæue siccescunt, vlcera prohibent, & dolorem commouent. Anacollematibus, frontalibus vti conueniet, quorum hæc sit materia. E fabis fressis, tosto hordeo, auena, fit farina. Assumitur quoque farina volatilis: subiguntur autem ex ouorum albuginibus: admiscetur sanguis draconis, bolus armena, thus, mastiche, gummi, rosarum puluis, fiuntque satis crassa & hærentia cataplasmata. Sed quæ peculiariter extergent, siccantque vlcera, alia quidem liquida, plurima sicca sunt: liquida, lac serosum, vel dilutum suo sero. Seri autem plus miscebitur vt plus est sordium, vinum conditum saccharo, diluta mulsa, decoctum plantaginis, vel aqua eius addito melle, decoctum fœnugræci, quod conuenienter præparatum per se purgat vlcera, nisi sordidiora sint. Nam si tantillum mellis adiicitur, vel pulueris diatragacanthi frigidi, diaireos & similium, sicca pompholyx vsta, loræque, seu tuthia præparata, lapis calaminaris vstus lotusque, vt prius, terra sigillata, lapis hæmatites, recrementum plumbi & ferri vstum lotumque, spodium, antispodia, cerusa, amyllum, lac in mortario plumbeo pistillo plumbeo agitatum,

donec crassius nigrescat, sarcocolla nutrita, pumex  
 vstus & lotus, ostreorum cinis, ossa sepia, gemmæ  
 trita, pulvis absynthij, plantaginis, bardanæ, cly-  
 meni, herbæ scorpioidis, buglæ, saniculæ, herbæ  
 Paridis. Sed melius erit ex his succum exprimere,  
 subigere in mortario plumbeo, pistillo plumbeo,  
 donec crassities & liuor contrahatur: deinde siccari  
 oportet, & ita vti puluere. Cornua cerui, capræ, vsta  
 lotaque, antimonium vstum lotumque. Vehemen-  
 tiora sunt æs vstum lotumque, squama æris, vitrio-  
 lum, cuprosa, arrhenicum, sandaracha, ærugo: sed  
 his in malignis & plurima sorde madentibus vti  
 conueniet. Ex hac materia, concoquentibus, myr-  
 rha, thure, croco, galbano, castoreo, fiunt collyria  
 ferè ex succo fœnugræci. Vtimur quoque saccharo  
 cando, penidiis, alphenic, diatragacanth, frigido, so-  
 lutis lacte & liquoribus, qui extergent. Sic enim  
 lenies, extergebis, & vlcus ad carnem comparabis.  
 Parietaria, anagallis, cœtaurium minus, absynthium,  
 plantago teruntur in mortario paulatim affuso la-  
 cte: exprimitur succus, qui vt prius versatus in mor-  
 tario plumbeo ad crassitudinem siccatur, vt fiat  
 pulvis: è cornu cerui collyrium expurgat, in carnat,  
 exterit cicatrices. ℞. cornu cerui vsti loti, thuris,  
 plumbi vbi loti ana ʒ. 2. squamæ æris, vstæ lotæ ʒ. 1.  
 opij ʒ. ʒ. gummi arabici ʒ. 1. cum aqua pluuia fiat  
 collyrium.

Sed hîc meminisse cōuenit duplicem esse aquam  
 pluuiã in preparandis metallicis: vna enim hyberna *Aqua plu-*  
 est, & inutilis: altera estiuæ & tonitruosa, vtilis. Aliud *uia duplex.*

℞. sarcocolæ nutritæ in lacte ʒ. 10. pulueris diai-  
 reos simplicis, gummi arabici, tragacanthæ ana ʒ. 2.

# AD LIB. IIII. DE COMP. MEDIC.

punicis vsti lotique in lacte ʒ. 1. ex mucagine fœnugræci fiat collyrium. Atque hîc meminisse conuenit in vlceribus nimiùm madentibus puluisculis vtédum esse: in aliis collyria liquoribus dissolui: lac autem conuenire dissoluendis collyriis, vbi est leniendum, & breuiter extergendum: succum verò fœnugræci, vbi detergendum magis. Quòd si copiosius quoque detergendum, veteres succo fœnugræci tantillum mellis addiderunt. Aliud. ℞. punicis vsti lotique ʒ. 2. gummi arabici, tragacanth. ana ʒ. 1. pulueris diatragacanthi frigidi ʒ. ʒ. cum succo fœnugræci fiat collyrium. Absterget plurimùm, vt etiam aspredines & albugines tollat. Vrina pueri impubis æneo vase diu versatur pauculo melle adiecto, donec sit crassitudo. Materia siccatur, fit puluis, ac primùm, vt consuescat oculus, mucagini tragacanthæ, deinde fœnugræci permiscetur, eritque quadrupla mucago. Licebit vti collyrio diuino antea descripto è cadmia præparata. Adhæc diarhodo Nili, deterso vlcere, regenerâda caro. Implendis vlceribus oculorum conueniunt terra sigillata, sarcocolla nutrita, thus, cortex thuris, manna, aloë lota, myrrha, gummi arabicum, tragacantha, metallica, quæ citra morsum siccant, & alia scripta cap. de sarcoticis, quale hoc. ℞. corticis thuris, myrrhæ, aloës, sarcocollæ nutritæ ana fiat puluis. Collyrium è cornu cerui antea descriptum, & Cleonis plurimùm vsitatum veteribus, quod incarnat & cicatricem ducit. ℞. spodij loti, plumbi vsti loti ana ʒ. 2. batituræ calybis ferraturæ vstæ & lotæ, croci ana ʒ. ʒ. gummi drach. 1. confice cum aqua. Vfus tempore diluitur liquore oui & lacte, aqua infusionis

*Cleonis collyrium.*

tragacanthæ, mucaginis tragacanthæ extractæ in aqua plantaginis. Sief de plumbo incarnans & consolidans. ℥. plumbi vsti, antimonij vsti, loti, tuthiæ lotæ, æris vsti, gummi tragacanth. ana ꝑ. 2. opij. Gra. 8. cum aqua pluuiæ. Aliud, quod incarnat, reprimat, vestigia corrigit & lenit. ℥. tuthiæ, cadmiæ præparatum, vt decet, cerusæ, antimonij, olibani ana drach. 2. myrrhæ drach. 1. sarcocollæ, sanguinis draconis, aloës, opij ana ꝑ. 1. β. f. ex aqua. Collyrium è thure, quod mollit, lenit, coquit, incarnat. Thuris ꝑ. 10. antim sarcocol. ana drach. 5. croci ꝑ. 2. ex mucagine fœnugræci pleno vlcere cicatrix ducenda est per ea, quæ vocant epulotica medicamēta, quæ citra morsum siccant, qualia inuenias cap. de Epuloticis, & quod sequitur. ℥. antimonij, blattæ bisantiæ ana ꝑ. 10. acaciæ ꝑ. 3. aloës, sarcocollæ nutritæ ana ꝑ. 1. confice cum succo rubi. Sarcocolla, vt prius, nutrita cicatricem ducit.

*Sief de  
plumbo.*

*Collyrium  
è thure.*

*Hebes visus.*

**V**isus hebes senio, morbo, frigidityte humorū, & spirituum crassitie immodica, tenuitate spirituum, inopia vtriūsq; contrahitur. Sed à senio & inopia spiritus vel humorum difficillimè instauratur. In tenuitate spiritus leuiter adstringētibus & refrigerantibus vtendum est. Huius rei manifestum argumentum est, quod interdum & in splendore Solis statim disperfo spiritu & quasi euanescente parum acutè vident. Nocte verò iam cogente & leuiter refrigerante, spiritus acutissimè cernunt. Id quod videre licet in felibus, leonibus, pardalibus, & pleròque genere animalium, quibus veluti igne micant oculi in tenebris. Contra crassitiem humo-

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

rum & spirituum, detergentibus & incidentibus leuiterque corroborantibus vtendum est: oxydorca vocant Græci medicamenta, quæ hebetudini visus citra manifestam occasionem ortæ medentur, quorum magna pars è materia constat, quam contra crassitiem facere diximus. Quale est Antonij Musæ. Fellis perdicis siluestris partē vnā; succi parietarię, succi centaurij minoris, mellis optimi ana. Aliud.

Fel gallinæ veteris succo centaurij pari miscetur, quibus mel sextupla ratione adicitur. Aliud. Scribonij Larg. Succi radice fœniculi ℥.2. pari melli commiscetur, reponuntur ærea pyxide. Alij parem modum succi chelidonie permiscēt. Obscuritatem quamlibet persanare scribit Gal. gruis fellis ℥.1. succi marrubij & mellis optimi ana ℥.2. Aliud. Fellis tauri, succi fœniculi an. ℥.1. mellis optimi ℥.2. Aliud. Mellis scyllitici, succi marrubij ana ℥.2. succi granatorū dulcium ℥.6. fellis accipitris ℥.1. fortiora sunt collyria antea descripta vi prædita extergente, quæ metallica extergentia recipiunt. Atque hætenus præscripta sunt, in crassis vaporibus & humoribus conuenire possunt. Cōueniunt etiam suffusionibus & maculis oculorum ex detergente, digerente, leuiter corroborante materia. Quod sequitur maximè probatum est veteribus, quod maximè iuuat, scriptores, pictores, lectores, aurifices, & quicunq; contenta oculorum acie plurimùm laborant. Succus exprimitur ex granis punici acidi, vt Aërius: dulcis, vt Octauius. Is succus æneo vase reponitur, quod sit opertum tenui linteo, quodque exponatur Soli, donec crassescat succus. Succo iam crasso par modus mellis additur, miscenturque, & fictili repo-

nuntur. Illinitur medicamento oculus hora somni.

*Ad albugines.*

**I**N albuginibus atque omninò morbis oculi, vbi medicamentorum vim subire profundius velimus, balnea frequentia imperamus: alioqui iubemus, vt vapor humidus ex aqua primùm repida excipiatur oculis: deinde vapor è materia, quæ extergeat: postea medicamenta leniter diùque affricando adhibemus. In albuginibus sagapenum cum melle distillatum, vel solutum cum melle liquido, vel, vt sit fortius, cum oxymelite scyllitico singulare remedium est. Succi anagallidis, parietariæ, chelidonij, amygdalarum amararum cum melle, ac breuiter earum rerum, quæ detergent. Addunt succum papaueris rubri: & quæ gerta serpentaria vocatur, è radicibus dracuntij descripta cap. de sarcoticis, soluta lacte equino plurimùm iuuare potest. Aliud. Fel hirci aut cuiusuis, alterius animantis exsiccat in vase æneo, adiecto syrupo de artemisia, ruta, calamento: vbi inde puluis factus est, succus marrubij, anagallidis & similium miscetur, & quod inde molliter applicatur oculis. Aliud. Ossis sepiæ ʒ. 2. salis ammoniaci, cerusæ ana ʒ. 1. ammoniaci, sagapeni ana ʒ. 2. Fiat puluis. Aliud. Rad. dracuntij, aristolochiæ, chelidonij ana ʒ. ʒ. ʒ. concidantur in taleolas, reponantur in vase æneo. Superfundatur vrina pueri impuberis: exponantur Soli: siccentur, terantur: tritis adde salis ammoniaci ʒ. 2. mellis torrefacti tantundem. Fiat puluis. Ammoniacum, salvia matris subigitur, & illinitur albuginibus infantium. Mirum est, quod scribunt, butyrum per se illitum mirabiliter cōferre in cōtumacibus. Metallica

*Oculorū albugini accōmodatum remedium.*



# AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

miscemus vi extergente prædita, & collyria quæ inde comparantur. Ærugo crematur: diu teritur ex aqua plantaginis. Capitur ℥.β. cui additur cerusæ lotæ in lacte ℥.i. gersæ serpentariæ ℥.2. trita omnia cum mucagine fœnugræci illinuntur.

## *Ad Hyposphagmata.*

**I**Cto oculo resudat sanguis tenuis, atque effunditur in oculum, vnde rubor & aliquando dolor & inflammatio. Taifati vocant Arabes. In dolore & inflammatione recurrédum ad remedia priùs descripta. Quòd autem attinet ad remedia propria hyposphagmatis, initio vtendum iis, quæ reprimant & leniant: deinde iis, quæ digerant: postremò quæ digerant & corroborent. Primùm itaque liquorem oui illinito, & lanam vel linteolum molle in eodem inculcatum adhibeto. Lac quoque muliebre similiter adhibetur. Veteres magnam vim in sanguinibus posuerunt. Alij sanguinem hirundinis primo loco statuerunt: deinde palumbæ, vel turturis: tum columbæ, sed masculi, prætulerunt. Tenellæ pennæ extrahuntur plenæ suo sanguine, & molliter oculis sanguis infunditur. Galen. 10. de simplicibus medicamentis parui facit eiusmodi controuersiam de sanguinibus, vtiturque succo fœnugræci post initia cum collyriis primùm Democratis è myrrha, diasmyrno: deinde quæ in multo thure sunt: postremò quæ è croco. Quæ collyria scripta inuenias septimo Aëtij, & Pauli, & quarto *ἔτι τόπος*. Rosas, vel rosarum magma aqua rosarum & vino incoques, & tepida oculis admouebis. Nam & tepesactum oui liquorem & reliqua remedia tepida adhibemus. Alij bolum armenā, terram

*Sanguinis  
magna vis  
ad ὑπόσφα-  
γµατα.*

figillatam, argillam ex liquore oui dissoluunt & adhibent. Post initia lini semen teritur cum butyro: totum vehementer exprimitur, & pingue expressum illinitur. Mirum est, quod scribit Archigenes, *Archigenis remedium ad eructatos oculos.* Hyssopi coma trita, & linteo inuoluta, deinde incalcata in aqua calida, si inde foueatur oculus, sanguinem diffusum ita extrahit, ut si lintheum exprimitur, sanguinem reddat. Arabes plurimum utuntur arrhenico bene loto, sublimato rursus loto ex aqua coriandri, præsertim ubi iam hyposphagma liuorem duxit. Leue collyrium digerens. ℥. thuris 3.3. diligentissimè conteruntur: deinde in collyrium uniuntur cum aqua sequenti. Salis ammoniaci, salis gemmæ, ana ʒ. i. liquecant in aqua pluuiæ, qua thus uniatur. In vñ dissoluitur aqua, vel succo coriandri. Fortius est quod sequitur. ℥. thuris, myrrhæ, croci, ammoniaci ana ʒ. i. sublimati bene loti cum succo vel aqua coriandri ʒ. ʒ. cum eodem succo vel aqua fiat collyriū, quod adhibeatur cum eodē succo, vel aqua. Fortius. Arrhenici bene loti, sublimati prius, deinde rursus bene loti & cōfricati cū aqua coriandri ʒ. 2. sarcocollæ, piperis, ammoniaci, lapidis lazuli an. ʒ. i. cum aqua, in qua ʒ. ʒ. salis ammoniaci dissoluta sit fiat collyriū. Fiūt fofus in declinatione ex decocto absynthij, meliloti, chamæmeli, fœniculi, hyssopi, & remedia adhibentur, quæ scripta in albugine.

*Ad ædemata oculorum.*

**A** Pituita, quæ in oculis diffluit, mollis, laxus & indolens tumor circa oculos nascitur, genas ferè occupans, qui bene purgato corpore, his remediis dissoluitur. Primùm fouetur locus ex aqua repida cum spongia molli. Faba, lens, cicer, in aqua cum

# AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

tantillo aceti, horum vnum, vel omnia percoquuntur: deinde trita pressaque cribro culinario transcolatur, mel adiicitur, cataplasmatibus modo adhibetur. Postea verò, vbi magis discutiendum est, hyssopus & pars radicis sigilli beatæ Mariæ cum dictis leguminibus coquitur: alioqui creta oxycrato vel lixiuio dissoluitur, aliquid mellis additur, & ita illinitur.



## AD LIB. V. GALENI DE COMPOS. PHARMAC.

κε' τόπους.

### PERIOCHE V.

*De Hypōpiū.*

**Υ**ΠΩΠΙΟΥ per ω in secūda syllaba & i in penultima, suggillatio est, quæ ferè fit sub oculis, genere ecchymomatū, id est suggillationū cōprehēsum. Ὠπ-  
ΠΟΥ per ο & υ in penultima, ocularis morbus, cum pus fusum cornea includitur. Differt hypōpiū, quod est sugillatū, ab hypōsphagmate quia hoc in oculis: hypōpiū verò in genis & malis. Conueniunt autem remediis. Nam vbi graue malū est, phlebotomia, clysteribus, purgationibus, apoplegmatismis, sed leuioribus, communiter vtendū est. Quod ad topica attinet, primū quidem leui-

ter

ter repellētibus, mixtis modicè digerētibus, multò magis in hyposphagmate, vtendum est. Initio ergo caseo recenti, diarhodo Nili soluto in decocto meliloti, aliis quoque similiter repellentibus & leuiter digerentibus vtendum est: ac breuiter, quæ in hyposphagmate descripta sunt circa initia, non inuenteratis hypopiis conueniunt. Recentiores rosaceo, oui candido, insperso puluere myrtillorum vtuntur: deinde speciebus sanguinis, quæ descriptæ sunt in hyposphagmate, farinis fabarum, hordei, coctis in oxymelite. Eadem farinæ saluia subactę tergent, leniunt, discutiunt. Fotus ex aqua tepida, ex decocto chamæmeli, meliloti, althææ, ac tandē scænugraci: oui luteū cum melle, faba vino macerata, læuigata. Item quod sequitur. Lithargyri, cerusæ ana ℥.i. cum melle subigatur. Nutriuntur primū rosaceo, deinde chamæmelino. Dissolutum vnguentum rosatum tantillo syrupi de absynthio mixtum iam nigricantibus hypopiis, nux rancida & iam oleosa cum melle subigitur, & supinè decumbente ægro ne excidar, hypopio tribus horis adhibetur, quæ cū excidit, alia reponitur. Pannus inculcatus oleo de kerua, oleo de nucibus veteri, de ricino & similibus, panis diu mansus & saliuā subactus, cuminum nodulo includitur, & feruenti aqua salsa immergitur, & ita imponitur. Serpentis exuium melle vel aqua marina subigitur, & imponitur. In remediis præcipua sunt, iam plurimū nigricante hypopio, raphanus, radix bryoniæ, dracunculi, sigilli Mariæ, quæ primū cum butyro, deinde per se adhibentur. Quod si inde ardor & mordicatio excitatur, tepida locus foueri debet. Si locus vehementer in-

AD LIB. V. DE COMPOS. MEDIC.  
tumuit, foru tepidæ ex spongia plurimùm vtendū  
est: deinde inungendum anethinum. In inflamma-  
tione diu foueto calida, & farinas coctas fabæ &  
leguminum scriptorum in hyposphagmate colato-  
rum, vt priùs, cribro culinario cum melle imposito.  
Quòd si fissura quedam coniuncta est, ad remedia  
glutinatoria, qua parte vulnus est, decurrendum.

*De Ægilope.*

**A** Egilops paruus est abscessus inter os nasi &  
maiores angulum oculi, periculosus, pro-  
pterea quòd excarnis locus est, & vicinus oculo.  
Primùm itaque Ægilope nascente repellentibus  
validè vtendum est: factò verò ægilope, diaphore-  
ticis primùm citra morsum, deinde fortioribus  
vtendum est, adhibita cura, ne quid diffuat in  
oculum. Ac breuiter inflammationum modo cu-  
randus est. Propterea neque phlebotomia præter-  
mittenda est è cephalica, neque purgatio, si fuerit  
opus. Cucurbitulæ quoq; & masticatoria vsui sunt.  
Vbi verò suppuratio facta est, ampliandum vulnus,  
vt pus effluat, & non corrumpat. Os aperto ab-  
scessu purgandum mellicrato, melle rosato, & aliis  
id genus. Purgatum vlcus abluendum è vino: im-  
plendum sarcoticis, aristolochia, manna, thure, aloë,  
myrrha, resina, sarcocolla, chamædri, ruta, & aliis  
quæ scripta inuenies cap. de sarcoticis. Ex quo epu-  
lorico cicatrix ducenda est. In Ægilope difficultas  
spirandi, inde læso osse, sed iniuria leuis tantùm  
asperato: maior verò iam carioso: maxima, vbi  
iam ad colatorium os & malas corruptelas transiit,  
vbi fistula ducta est, & mucosa caro atque cor-  
rupta. Hic ergò veterum & recentiorum consilium

*Ægilops  
nascens vali-  
da repellētia  
postulat.*

est. Diuidendus angulus in triangulum, vt apex  
trianguli versus radicem nasi:litera verò & basis ad  
oculum vergant. Quòd si caro corrupta, aut callus  
prohibet, cathæreticis vtendum erit, quæ scripta in-  
uenies cap. de pyroticis. Ampliatum vulnus pri-  
mum implendum vel spongia, vel medulla sambu-  
ci intorta, ne scilicet coalescat. Quòd si tantum as-  
peratum os est, rasura sufficiet: si cariosum, tenui &  
retuso cauterio vtendum est: quod cum sit, munien-  
dus oculus spongia, quæ sit imbuta aqua frigida.  
Sed priusquam cauterium imprimatur, videndum,  
quò perueniat ossis corruptela. Aliquâdo enim sur-  
sum ad colatoria vergit, nonnunquam ad malas.  
Atque quocunque vergat, cultello aperiendus lo-  
cus est, vt fiat via cauterio. Iam repurgato osse,  
ægyptiaco mixto cum melle rosato, & syrupo de  
absynthio vtendum est: quod medicamentum etiam  
os purgare potest, si quidem levis est iniuria. Vete-  
res cephalicis vtuntur scriptis cap. de sarcoticis. Ar-  
chigenes inurebat plumbo liquefacto per infundi-  
bulum missò. Recentiores aquis Alchymistarum  
fortibus vtuntur. Sed primum permiscet lacti, vel  
muccagini althææ, lini, fœnugræci, vel tragacan-  
thæ extractæ in aqua vitæ: postea solis aquis os at-  
tingunt. Vtuntur purgantibus & incarnantibus ex  
succo agrimonie, apij, absynthij, rutæ, melle rosato,  
syrupo de absynthio, aloë, mirrha, sarcocolla, vsto  
alumine, antimonio, mixtis in putri carne puluerib.  
ægyptiaci, mercurij cum alumine vsto. Superponunt  
emplastrum diacalcitheos, quod sit recens factum  
& repellens: partem per ambitum fouent vino ru-  
bro decoctionis ros. chamæmeli: superponuntque

linthea inculcata in dicto vino post adhibitum emplastrum diachalciteos. Parant & mundificatium, quod vocant ex farina fabarum & hordei cocta, in prædictis succis addita, in terebinthina lota, in vino albo. Purgato ulcere veteres probant alumenustum ex terebinthina, vitri subtilissimè triti pulvisculum, rutam pistam cum vino granatorum. Discutiendo verò nucem rancidam conquassatam, & appositam, chamemeli folia vel masha, vel subacta cum salvia salsa.

*De ionthis seu varis.*

**I**onthis, quod sint similes ὀνθῖς, id est, fimo, & faciem conspurcent, appellati. Vari à Latinis tubercula parva, dura, in cute faciei à crasso succo orta. Remediis egent, & Galenus scribit, mollientibus, quia dura: discutientibus, quia alienam materiam in se continent. Veteres Medici incidentia & tergentia videntur miscuisse. Fricabis ergo mixtura pari mellis & aceti, amygdalis amaris aceto pistis, lithargyro subtilissimè trito, concorporato terebinthinæ liquidæ, & butyro. Poteris intermiscere aliquid fellis caprini, vel similis. Lilij radix vel panis porcini melle subigitur, lapis calaminaris subtilissimè teritur, maceratur in aceto, & siccatur, quadruplo melli permiscetur. Item. ℥. saponis ʒ. 2. olei amygdalarum amararum ʒ. 1. aceti ʒ. ʒ. ossis sepiæ triti & puluerati ʒ. 2. Pomata oleo ouorum, vel de tritico dissolvitur, aceto albo addito, & illinitur. Gummi arabicum album, sal torrefactum, utrumque subtilissimè tritum acri aceto diluitur. In callosis & inueteratis varis ammoniacum, sapo, galbanum, opopanax, & alia id genus aceto dissoluta prædictis miscentur. Qui si contumaciores sint, ali-

quid metallicorum acrium detergentium intermiscetur, quemadmodum & in tumoribus ficosis, vlcerosis, subrubris, rotundis, dolentibus. Vnde principium impetiginis, mentagræ, aut lichenis agrestis quæ materiam habeant crassam, permixtam ichoribus acribus. Nam hæc vbi transferint impetiginem, rarò nisi acribus permixtis & medicamentis ecdoriis, id est, excoriantibus curantur. Primum tamen leuioribus vtemur: deinde contumaciore malo transibis ad ecdoria, de quib. in materia impetiginum. Hæc sunt acetositas citri, aqua vitis, vltimi inclusa in folliculis, aqua fabacearum, florum fabæ, centaurij minoris, parietariæ, enulæ, gentianæ, ranunculi, ari, bryoniæ, anagallidis, & his fortiores aquæ sublimatæ & vocatæ fortes. Oleum ex eadem materia, de tritico, de sulphure, de vitriolo, de ouis, de fraxino. *Εκδόρια* sunt metallica acria, æris squama, lapis calaminaris, sulphur, ærugo, arrhenicum. Diu teruntur ex aceto acerrimo. Pastilli fiunt, qui ceratis liquidis permiscuntur. Cætera fiunt ex cera fulua, vel, vt fortiora, viridi oleo conuenienti, & vt hæreant magis, terebinthina mixta, superponitur vesica bubula, aut membrana suilla, vel similis. Medicamentum tota nocte finitur, vel ad horas multas, lacte, sero lactis, aquis memoratis tepidis facies abluitur: repetuntur medicamenta, donec exarescant pustulæ & vlcera. In medicamentis leuioribus, sanguis leporinus illitus, saliuæ præmanso sale, ouum integrum triduo maceratur in mixtura sulphuris & aceti post triduum abiecta testa: ouum ex ea mixtura subigitur & illinitur. Gummi cerasorum, aceto dissoluitur & illinitur, radix enulæ &



# AD LIB. V. DE COMPOS. MEDIC.

Iapathi acuti coquuntur in aceto ad putrilaginem: tepido aceto, permixto melle: affricatur locus: deinde radices pistæ cum axungia viperarum illinuntur. Pforicum Mesuæi salua ieiunii hominis, & liquido melle dissoluitur. Fraxinus viridis crematur, salua excipitur, quam extrema reddunt. Sublimatum & cinabriū, aliāq; ecdoria in muccagine gummi arabici, vel tragacanthæ, vel muccagine fœnugræci illinuntur. Sed in usu ἐκδορίων extremæ partes impetiginis, & quæ sanæ vicinæ sunt, medicamento repellente, & quod inflammationem prohibeat, muniendæ sunt. Cinabrium, thus, mastiche, æqualiter miscentur cum aceto. Fiunt pastilli, vnde fumus excitatus loco impetiginoso excipiendus munitis oculis, ore, & naribus. In his omnibus meminisse oportet, priusquā adhibeantur, habendam esse rationē totius corporis, vt, scilicet, aliquoties reputetur, atque medicamenta, vt facilius subeant, malaxata impetiginosis partibus adhibeantur. Malaxantur autem decocto maluæ, bismaluæ & similiū.

## *De dentium affectibus.*

**D**entes viris ferè triginta duo: mulieribus, viginti octo. In vtroque dentium ordine quatuor acuti & lati, vt prehensum cibum solidum incidant, vnde τομῆες & τόμαιοι, iidem μελαῖνοι, quòd in risu sese maximè proferant. Inter quos duo medij & præcipui columelares exoriuntur ferè primi septimo mense, quanquam aliis tardiùs. Hos ad latera canini duo sequuntur: acuti quidem, sed non lati, ac potius in cuspidem acuti. Configunt dura vi maiore, & diuidunt duo numero in vtroque ordine. Ad decimum ferè mensem, aut

nonum enascuntur. Sequuntur maxillares plani, firmis radicibus defixi, in quibus, qui genuini vocantur & postremi erumpunt, tardissimè apparent, vix anno vigesimo, vt Aristoteles voluit, aut post genituræ profusionem, vt Auicenna. Varro anno ferè septimo. Reliqui maxillares ante secundum annum & secundo anno producuntur. Primores vulgus anteriores & lacteos appellat: caninos verò oculares: maxillares parùm deflexa voce, maxillarios. Crescunt dentes, quia nutriuntur, & assiduo teruntur mansu. Excidūt omnes ætate, sed postremi maxillares neruos substratos habent à tertia coniugatione, qui affecti imaginem præferunt laborantis dentis, quomodo & gingiæ. Dentes autem in propria substantia & sentire & dolere contra multorum sententiã affirmat Gal. 16. de vsu partium, & 5. *ἡ τὸ πρῶτον* Historiam dentium scribit Aristoteles 4. cap. & 8. lib. de gener. animalium: cap. 1. lib. 3. de Partibus animalium: cap. 1. 2. 3. 4. lib. 2. de Historia animalium: Gal. vndecimo de vsu partium. Plinius cap. 37. lib. 11. Celsus, cap. 1. lib. 8.

Sunt autem affectus dentium communes reliquis ossibus, qui exasperantur, roduntur, perforantur, cariem ducunt & rubiginem, nonnunquã quoque ab affectione, quæ sit similis inflammationi, liuëntque omnia à saniosa, acri, & virulenta materia. Proprius affectus dentium, neque cõmunis reliquis ossibus, dolor est. Itaque in corruptela dentium tria genera sunt remediorum. Nam dens corruptus & vitiosus ferro extrahitur, vel medicamentis acribus, siccat, tabescit, vt deinde sponte sua excidat. Tertium remedium, vt quod est incolume, relinquatur.

*Dentium corruptela tria genera remediorum.*

# AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

Instrumentum quo dens extrahitur, ὀδονταγωγὸς à Græcis Medicis appellatur, forceps (vt dicat quispian) dentarius. Sed de extrahendo dente nō satis conuenit inter veteres Medicos: quanquam magna pars vitiosum & corruptum dentem extirpandum credidit. Erasistratus non temerè extirpandum putat, eiúsque rei testimonium adducit, quod apud Belgas in templo Apollinis ὀδονταγωγὸς, forceps dentarius, plumbeus suspenderetur, quo significaretur non esse tollendū dentem, nisi vacillet, vt plumbeo forcipe excludi possit, id est, nulla vi: qui si qua parte cariosus fuerit & vitiosus, vitiū scalpro atteratur, relinquatur quod est sanum. Ac re vera non temerè

*Dens non temerè euellendus.*

euellendus dens est, sed si corruptus, totus tabidus, vacillans, si nerui subiecti inflammatio, à qua periculum immineat. Sic enim excluso dente liberatus neruus iam nō aprimitur, sed transpirat, & remedia cōuenientia admittit. In corruptela videndū quanta ea sit. Aliquando enim superficialis est, aut extremæ parti infedit, quomodo in ossibus asperis & cariōsis non os totum excindimus, sed aspredinem & cariē scalpro deradimus. Ita in dente aut pars quædam deciditur lima, radice incolumi. In medicamentis autem, quæ hæc faciunt, exsiccant & tabefaciunt, acria sunt omnia, lac tithymali, exuuium serpentis.

*Gummi hederæ tritum ad dentium dolores remedium.*

Gummi hederæ vulgò cognitū est remedium, quod religione quadam colligitur post medium Augustum, & intra idus Septembris, eoque vtūtur ad dolores dentium. Exuuium verò serpentis remedium est memoratū ab Antiquis. Galenus vndecimo de simplicibus decocto eius vtitur cōtra dolores. Archigenes cōburit, miscet oleo & melli, illinit ægro

denti, munitis cera, vel re simili dētibz vicinis. Idē quoque non vltum denti admouet, vt excidat, pyrethrum, aut radicē cucumeris agreſtis in aceto acerrimo triduò maceratam teres. Indes purgato denti. Id ad tres aut quatuor dies repetes, vt dens excidat.

Adeps ranæ viridis dentem depellit. Licet quoq; vt cauteriis per canaliculum denti impositis: atque cauteria modò è ferro, modò è testa nucis, radice gentianæ, & ſimilibz cōparantur. Sunt, qui oleum calens, vel aquas fortes denti immittant, vt excidat.

*Contra vermes.*

**V**ermes aiunt ſubnaſci dentibus & hos arrodere, à quibus dolor non ita fortis, pruriginofus, nulla aut pauca ſaliuatio. Hi amaris rebus enecantur, decocto centaurij, colocynthidos, pilulis communibus, aloë, myrrha, ſemine cæpæ, porri, ceruino cornu, puluere contra vermes & aliis id genus. Quod autem vulgus ſibi perſuadet, & ab antiquis Medicis ſcriptum eſt de ſuffumigio è ſemine hyoſcyami, videtur fabuloſum. Nam inde aiunt manifeſtè vermes excidere. Reuera incenſo ſemine euolant tanquam vermiculi, etiam ſi non attingat fumus vermiculoſum dentem. In doloribus dentium remedia multa ſunt. Phlebotomia, vbi inſlāmationis ſuſpicio, præſertim in neruo, purgatio totius corporis. In vitio humorū clyſteres acres, cucurbitulæ in cervice & ſcapulis, extremarum partium frictiones, errhina, maſticatoria, & quæ viam fluxioni intercipiūt, anacollemata, id eſt, frontalia, fotus malarum & faciei, periapta, quæ vel è collo ſuſpēduntur, vel alligantur carpo, Topica denique denti adhibita. Horū materia ferè incidens, digerens, calefa-

# AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

ciēs, quia ferè à crassis humoribus & flatibus dolor is excitatur, mixtis aliquando adstringētibus, rosis, galla, malicorio & similibus. Ac ferè collutiones fiunt materia in aceto cocta. Itaque origanum, hyssopum, saturciā, calamentū, nasturcium, maioranā, pulegiū, thymū, saluiā, adhæc pyrethrum, qui pes Alexādrinus dicitur, galangam, piper, & alia id genus aceto coques, ac inde collues, vel fumum ore excipies mixtis circa initia rosis, malicorio, balauistiis, vbi nō videbitur caput nimis redundare excrementis. Post collutionem hianti ore sinat æger pituitam defluere. Hipp. 7. Epid. castoreo, pipere concoctis vino, diūque contentis ore dolores dentium & gingiuarum coniugis Aspasij liberat. Mentastrum cum radice euulsum, & in peluim datū, conspersaq; aqua calida fumum reddit, qui obuoluto vestibis ægro exceptus ore, dolorē mirabiliter sedat, præsertim si æger in lecto bene coopertus quiescat, & moueatur sudor. Dioscorides radici althææ vel hyssopo coctis in aceto, vt inde fiat collutio, magnā vim tribuit in doloribus dentium. Ranæ virides in aqua & aceto coctæ simile ius reddunt. Acetū scylliticū colluitur. Dans caninus vstus tritus coquitur in aceto ad collusionem. Allium tritum respōdenti carpo alligatur. Ranunculi similiter folia alligantur, sed exulcerant. In dentiētibus pueris lac caninum gingiuis abluitur, cremor lactis, butyrū recens, subactū ex aqua violarū. Cerebellum leporis physicum est appensum pueris, cornu veteris cochleæ, vbi dolor à calore ortus est, aqua rosarū cum caphura colluitur. Decoctum papaueris, vel radicis mandragoræ & hyoscyami, solani, pilulę de cinoglossa, quæ con-

tra omnes morbos dantur, leuiter solutæ butyro induntur denti. Materia anacollematū, errhinorum, masticatoriorū prius descripta, similiter sacculorū, cataplasmatū & fomentorū in materia oculorum.

*Ad dentes mobiles.*

**S**enibus consumptis dentium stabulis, ictu concussis dentibus, neruo, qui dentes firmat, emolito, dens mobilis vacillat. In senibus collutio ex adstringētibus coctis austero vino. Eadem collutio ictu concussis. Sed in neruo, qui multa pituita mollior ac infirmior est, omnibus modis vacuanda pituita est pharmaco purgāte, errhinis, masticatoriis. Deinde ad collutiones siccantes & adstringentes veniendum, alioqui adstringentia excepta melle rosato, syrupo myrtilorum, conserua rosarum, cornorum & similium adhibentur denti. Acetum scylliticum confirmat dentes, & constringit gingiuas, lac asininum similiter, vlmi cortex & ramuli in vino cocti, vt inde colluas. Materia adstringentium sæpius descripta est, describeturque in stomachicis.

*Ad corrosos dentes.*

**M**ateria vacuanda medicamento purgante, quod vel bilem flauam, vel atram, vel pituitam falsam purget. Eiusmodi vitium aliquando nascitur communi vitio totius corporis: aliquando assidua fluxione è cerebro: nonnunquam hepatis aut potius lienis vitio. In remediis localibus consensus est Græcorum & Arabum, nigella romana torrefit, teritur ex aceto acri, denti imponitur, zinzi-ber, radix capparis, angelicæ vel sylphij, tormētillæ, vel lapathi acuti in aceto coquitur, acetū colluitur: cocta radix adhibetur dēti. Benzoinum, opopanax,

## AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

soluta oxymelite adhibentur denti. Sal ieiuno sub lingua liquatus & retentus ore dentem prohibet à putredine & erosione. Sal cum alumine vritur, extinguitur aceto, acetum colluitur, materia denti applicatur.

### *Ad dentes malè coloratos.*

**Q**Uæ dentes præseruant, sunt è materia eorum, quæ siccant & abstergent: vnde fiunt dentifricia, sal torrefactum cum melle, pulvis parietariæ, amygdalæ amaræ, cornu cerui, margaritarum pulvis, rasura eboris & coralli pulu. geria serpentaria, iris florentiæ, marmor tritum, pumex vstus, os sepiæ, lana succida colligata linteolo cum tertia parte salis. Vritur cinis capitis vulpini & leporini, quibus pulueribus aromatica miscentur, santala, rosæ, cinnamomum. Lignum aloës & similia arida dentibus affricentur, concorporètur melle rosato, vel anthosato. Materia vino decoquitur ad ablutiones & collutiones dentium. Sed & ex materia quæ ad collutiones doloris dentium coquitur, remedia parantur, præsertim quæ aromatica sit. Repurgatur dens virga rosmarini vel lentisci. Contrà verò corrumpunt dentes, quæ nimium calida, nimium frigida, sed præsertim, vbi deinceps & interiecta pauca mora nunc calidis, statim frigidis attinguntur dentes. Adhæc pingua, acerba, dulcia, viscida, frequens vomitus, dura, lactis multus vsus, magni pisces & pingues, raphanus, porrum, brassica.



# AD LIBRVM SEXT.

## GALENI DE COMPOSITIONE PHARMACORVM

ἡ τέταρτος.

### PERIOCHE VI.

*De oris affectibus.*

**I**Nflammatio oris, vt affectus indicat, post habitam rationem totius corporis initio eget repellentibus medicamentis, quale est mulsæ, in qua rosæ coxerint. Ac mulsæ melior fuerit cõparata è rosaceo melle, aut mixtura aquæ & cõserua rosarũ. In incremētis & vigore miscenda, quæ concoquunt, ficus, vuæ passæ, myrrha, crocus. Postea quæ discutiũt, sulphur viuum, nitrum, sal ammoniacum, & quæ eius sunt virtutis. Ex natura partis repellētia & digerētia leuiora sunt, quia cutis oris reliqua cutē corporis mollior & rarior est. Deinde in ea materia seligi debet, quæ nihil grane oleat, aut sapiat, quæq; nihil mortiferũ habeat. Pręter hęc, ab iis omnibus metus est, non solũ propter os, sed propter subiectos pulmones & ventriculũ, ad quos ab ore patēs via est. Alia quoque ratio ex natura corporũ, quia pueris, mulieribus, & omnino molliorib. corporibus leuius medicamentum comparādum. Propterea Gal. diacaryo simplici in his vtitur, sed sine



# AD LIB. VI. DE COMP. MEDIC.

adstringētibus pulueribus, acribus & aliis. Sed hoc quoq; considerandum in mixtura mellis. Medicus enim aliquid cōcedit saporī & ori: deinde in acri & tenui fluxione minus intermiscet mellis, ne, scilicet, mel fluxionem attenuet, & propterea acriorem reddat. Diacaryon medicamētum ex succo primū & melle cocto Gal. cōficit. Sit autē modus mellis subduplus, subquintuplus. Nam iis, qui dulcibus gaudēt, & ubi crassa materia est, plus mellis: in cōtraria conditione minus, miscendum est. Propterea mirandum non est quōd aliter Paulus, Aëtius, Alexandrinus, Nicolaus diacaryon conficiunt. Paul. Succī corticum exteriorum nucis expressi Iulio mense ante maturitatē nucum heminas quinque, mellis hemina: coque ad dimidium: deinde adde myrrhæ ʒ. 2. croci, aluminis an. ʒ. 1. in declinatione nitri, sulphuris an. ʒ. 1. pro hemina succi ʒ. 10. accipies: pro hemina mellis ʒ. 13. cum dimidia, quod magis cōuenit in crassa materia. Succī percolati heminam vnam, mellis heminam vnam, glycyrrhizæ ʒ. 1. coques primū glycyrrhizam cum succo, deinde mel adicies. Alexand. Succī lib. 6. mellis lb. 1. β. coque ad spissitudinem in vase stanneo duplici. Coctis adde myrrhæ ʒ. 3. croci, omphacij an. ʒ. 2. aluminis scissilis ʒ. 1. Illinitur medicamentum cynanchicis & faucibus exulceratis, vel oxymelite colluitur, aut prædicta mulsa, in qua rosæ præcoxerint. Nicol. Succī lb. 4. bulliant vna ebullitione. Adde tunc mellis lb. 2. coque ad spissitudinem. Tum adde initio pul. rosarū, balaustiorū, aluminis an. ʒ. 1. in incremētis & vigore glycyrrhizæ. ʒ. β. croci, myrrhæ ana ʒ. 1. In declinatione, boracis, nitri, salis ammoniaci ana ʒ. β.

*Diacaryon  
Pauli.*

*Diacaryon  
Alexandrini.*

*Diacaryon  
Nicolas.*



## AD LIBRVM SEPT.

## GAL. DE COMPOSIT.

PHARMACOR.  $\chi\tau$  τόπος.

## PERIOCHE VII.

*Diamorum.*

**M**Ororum duo genera, alterum celsi, domesticum ferè & esculentum : alterum bati, id est, rubi. Ex utroque diamorum fit. Sed quod ex succo mororum rubi fit, vocatur diabatinon. *Diabatinō.* Initio inflammationum oris solo succo uti licet, sed ex rubentibus, necdum maturis exprimi debet. Nunc aliquid syrupi myrtillorum, vel rosarum siccarum succo misceri potest. Ad usum verò, ut seruetur succus, melle concoquitur. Efficacius fuerit, si vel myrthinum, vel rosatum loco mellis communis misceas. Parari potest cum saccharo rosato : atque succi ad mel quadrupla, quintupla, sextupla, proportio est, præsertim ubi per multos menses seruandum non est. Succus seorsum coquitur : deinde mel, aut saccharum adiicitur. Coquitur in vase æneo stannato ad syrupi crassitiem. Octauius in diamorobati, batina mora collecta triduum asseruat, priusquam exprimat succum. Initio, ut magis adstringat

# AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

medicamentum, omphacium, omphax, rosæ siccæ, balauftium, malicorium, & breuiter quæ adstringunt, misceri debent. In vigore, quæ mitigant, decoctum ficuum pinguium, passularum mundatarum, glycyrrhizæ, decoctum bismaluæ, quo hoc medicamentum dilutius esse debet. In declinatione permiscetur mulsæ in qua coxerit ea materia, quæ descripta est in dolore dentium à materia frigida.

*Diamoron* Varia autem est mixtura. Heræ. Succī lb. 6. mellis  
*ex descriptio* lb. 1. vini austeri ℥. 10. croci ℥. 1. myrrhæ ℥. 2. ompha-  
*ne Heræ.* cij ℥. 1. aluminis ℥. 3. Gal. succi lb. 5. seorsum coqua-  
*Galen.* tur: mellis lib. 1. adiiciatur. Coctis & ab igne depo-  
sitis adde croci, myrrhæ ana ℥. 1. 3. omphacij ℥. 1.  
siquidem, vt Heras, austeri vini ℥. 10. medicamento  
permisceas. Quod si citra vinū, omphacij ℥. 1. duas,  
vel tres permiscere potes loco omphacij, vel succi  
rhois, vel vinum granatorum austerorum misceri  
potest. Quemadmodum & balauftium & malico-  
ria, siquando miscentur ex austeris malis punicis,

*Diamoron* meliora sunt. Διαμώρων bati, vt Alexandrinus.  
*ex descriptio* Succī mororum bati lb. 2. mellis lb. 1. sapæ lb. 3. co-  
*ne Alexan-* quantur omnia lento igne, vasæ æneo stannato ad  
*drini.* syrupi crassitudinem. Seruetur medicamentum eo-  
dem vase. Nicolaus in antidotario miscet succi mo-  
rorum celsi lb. 3. succi batinorum lb. 1. sapæ ℥. 3. co-  
quit, vt Alexandrinus. Aliter quoque Mesue. Sed  
mixtura Galeni & ratione semper vtendum est.

*Diareon.*

*Diareon, ex granatis.*

**G**Ranatorum tria genera: austerum, quod ad-  
stringit: dulce, quod lenit: acidum, quod al-  
tius penetrat. Ex his succus exprimitur, vel integris  
cum succo malicorio, vt magis adstringat: cum  
nucleis,

nucleis, vt mediocriter : cum pulpa sola, vt minùs adstringat. Quod adstringit magis, initiò coctum per se conuenit sine melle, quia tum resolutione nihil est opus. Atque vt valentius adstringat, aliquid adstringentium pulueratorum concoqui potest: vt sit iucundius medicamentũ quarta pars syrupi ros. de siccis, vel myrthorum, vel cydoniorum misceri potest. Postea quoque mel rosatum, aut sine his cõserua rosarum siccarum & similium. Mel autem adiiciendum magis, cùm digerendi locus est. Coqui debet in vase aneo stãnato, rudicula agitari ex materia, quæ adstringat, qualis est rubi. Succus ita coctus, ros ab Arabibus appellatur. Incrassatur aliquando Sole. Aëtius hoc modo cõfecit ex Galeno. Ex tribus generibus granatorum lb. 3. mensura nostra aut pondere exprimuntur. Galenus addit exprimi oportere cum suis corticibus tuis. Aëtius addit glycyrrhizę ʒ. i. decoquit ad spissitudinem: tum addit mellis ʒ. 13. 14. 15. contra inflammaciones oris, fastidia ciborum, & alui fluxiones. Medicamẽto addi possunt, quæ in medicamento diamoro, & diacaryo dicta sunt. Eodem modo è succo cotoneorum cum prunorum acerborũ, qualia quæ vulgò dicuntur (prunelles) & genus quoddam, quod tardissimè maturatur, berberorum, cerasorum adstringetium; grosellarum (gallicè groselles) cornorum, sorborũ, mespilorum, omphacis, agrestæ, stomachica conficiuntur. Sed vt acerbitas vincit, ita plus mellis miscendũ est in his stomachicis. Quædam parantur ex materia esculenta, & hæc non solum inflammationibus oris, sed fastidio ciborum, fluxionibus alui, & vomitionibus conueniunt. Alia ex materia non escul-

AD LIB. VII. DE COMPOS. MEDIC  
lenta, vt quod paratur ex corticibus nucum, quæq;  
alumen, sulphur, calcanthum & similia recipiunt.  
Hæcque solum stomachica sunt.

*De Gargareone inflammato.*

**G**argareo defluxu humorum aliquando nimis  
relaxatur, vt quasi flaccidus concidat, quod  
malum medicamentum adstringentibus & siccantibus curandum. Vuluam appellant, quanquam vix  
morbus vel vulua, abscessus est in extremo garga-  
reone eo modo, quo si digitus inflammatus in ex-  
tremam sui partem materiam inflammationis trās-  
mitteret, vel ea parte turgeret magis. Initiis in-  
flammationis clystere, vel potione molliēda aluus,  
sanguis è cephalica detrahendus, cucurbitulæ cer-  
uici affigendæ. Diuidendæ verò, quæ sub lingua  
sunt, quies, inedia, alimēta forbilia imperanda sunt.  
Interdicendum vino, acribus, duris. Topica initio  
repellant: in statu misceantur, quæ mitigent: in de-  
clinatione, quæ discutiant. Abeunte malo in vuam  
appellatam, animaduertendum an rubeat, doleāt-  
que. Sic mitigatoriis & discutientibus, vbi liuescit,  
præcidere oportet. Nonnunquam exulceratur, vbi  
ad curationem vlcera recurrendum, vt purges,  
incarnes, cicatricem ducas. Sed in materia, hæc  
efficiat, esculenta, aut quæ nihil habeant virulentū,  
eligenda: quanquam aliquando vbi ea vlcera ser-  
punt & putrida sunt, calchanto & similibus metal-  
licis vti licet. Sed ne deuorentur, prouidendum, at-  
que ea materia ex secundo de materia Chirurgica  
repetenda. Quæ repellunt, alia sunt leuia, sapore au-  
stero, aut leuiter adstringentia, palmulæ, rosæ, ca-  
præoli vitis, rubi genera, cytini, id est, hypocystidis,

austera mala & pruna. Talia cerasa, pyra, radix mori & similia. Alia verò media, myrthus, myrrha, illicis & quercus folia, glandes, mespila, cotonea, castaneæ, echini. Fortia sunt rhu, malicorium & balaustia ex austeris punicis galla, alumen. Materia incoquitur aqua vel oxycrato ad gargarismum. Lauigatur vel aspergitur gargareoni : ex leuibus & fortibus varia proportione infinita miscentur medicamenta. Eodem modo temperatis mediis cum leuibus aut fortibus. In duriore corpore & maiore fluxione fortioribus vtendum, ita & aliis vtêris pro ratione. Ex eadem materia succus, si licet, exprimitur, qui liquidus vsui est. Siccatur vt inde puluis inspergatur : qui si viscidus permanet, diluitur. Mitigant glycyrrhyza recens, althæa, vux passæ, iniubæ, pruna, sebesten, ficus pingues. Horum vtimur decocto, vel eadem adstringentibus concoquitur. Digerunt autem prius commemorata, origanum, hyssopus, & similia. Atque diacaryo, diamoro, diaræo è granatis, & aliis id genus, conscripta prius ratione, in inflammatione gargareonis vtendum est. Præcidendi gargareonis ratio ex lib. 3. Prognost. Hippoc. 6. Pauli, & Celso petenda est. Vritur, scarifcatur, præciditur. Sed videndum ne maior pars, quàm oportet, auferatur. Sic enim vox perit, & spiritalia nimium refrigerantur.

*Cautio in  
gargareone  
præcidendo.*

*De Aphthis.*

**A** Phthæ Græci, Alcola vocant Arabes. Serpentia oris vlcera vertunt Latini. Aphthicos vocatur, qui laborat. Aphthos morbus est familiaris pueris, vt ex 3. Aphorif. lib. licet colligere. Est autem, quod superficiem oris occupat. A gingiuis sæpè in-

*Aphthæ.*

# AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

capit, serpit in palatum, descendit in vnam & fauces, periculosissimum pueris, & quod sæpè eos consumit. Galenus duplex genus facit 3. Epid. Aliud est mitius, aliud cachoëtes & malignum. Hoc vitium ferè cum ardore & erysipelate. Causa autem duplex: in pueris quidem mollities oris, quod ait Gal. quasi βρωδης, propter mollitiem à sero lacteo patitur, & insuetis generibus cibi & potus. Altera causa, quæ grauius malum facit, excrementorum acrium copia, vnde maligna vlcera & depascentia sæpè commouentur. Hoc viris & mulieribus aliquando accidit. Sunt & Aphtharum differentia à materia sumptæ. Aliæ enim rubent à sanguine: à bile flauescunt: albicant à pituita falsa: nigricant ab atrabile. Remedia inde euariant. Deinde quia in mollioribus & nimis maligna affectione clementioribus vtendum est. Itaq; ardor refrigerandus est. Quod autem exulceratum, cicatrice claudere oportet. Itaque in pueris prouidendum nutrici, vt primum quidem purgetur: deinde nutriatur alimentis partium refrigerantibus, partim adstringentibus loco pulticularum, quæ farina tritici, lacte, & sale vulgò pueris coquuntur, hordeato vtendum est cum saccharo rosato. Os colluatur iulepo rosato, myrtino, addita parte succi granatorum, & eorum, quæ prius commemorata refrigerant & adstringunt. Similiter ex materia, quæ leuiter adstringit, rosas, capreolis vitium, & cæteris aqua coctis collutiones fiant. Inde pulueres vlceribus inspirantur, qui vel mediocriter adstringunt, quique fortiter. Præscripta sæpiùs ratione vsurpanda sunt in igneo feruore, lactuca, intybum, solanum, portulaca, plantago, cen-

*Aphtharum  
gen<sup>o</sup> duplex.  
Aphtharum  
causa duplex*

*Aphtharum  
differentia à  
materia sum-  
pta.*

tinodium & similia. Coquantur aqua ad collutionem: quæ aqua etiam alimentis misceri potest. Vt mur quoque aquis inde distillatis caphura addita, succis, granatorû, ribes, oxiacanthi, cerasi, mali, pyri, materiæ adstringentis quæ vt dulciora sint, saccharo rosato cõdiri possunt: Miscetur quoque diamorron, diacaryon, diaræon, & alia prius cõmemorata ac mellita, Miscere cõuenit in initio, & fine adstringentia. In prærubris vtendum iis quæ leuissimè adstringunt: in albidis, adstringentibus magis: postea iis, quæ citra rosionem digerunt: in subflauis, refrigerantibus magis: in nigris, magis discutiëtibus. Vbi verò sordida admodum vlcera sunt, & serpunt nimium, ad remedia malignorû vlcerum veniendû, vt purges, incarnes, cicatricem ducas, quorum materia ex secundo de materia Chirurgica repetenda.

*De vitiis vocis.*

**V**T vitia vocis intelligamus, qua ratione vox *Vocis male-* naturaliter perficiatur, intelligere oportet. *ria.* Materia vocis spiritus est, inclusus in thorace & pulmonibus non quomodocunque exclusus, sed vehementiùs, quàm in expiratione. Spiritum eo modo vehementiùs exclusum exsufflationem vocant. Exsufflatio itaque materia vocis est. At hoc esse non potest sine actione musculorum intercostalium: à neruis etiam, qui à respondentibus spinæ vertebri intercostalibus spatiis describuntur, vim nerui accipiunt à cerebro. Itaque cerebro læso, nec vim demittente in neruos, cessabunt muscoli intercostales. Nec erit efflatio, nec vox similiter radice læsa neruorum intercostalium, aut musculis essentiali morbo laborantibus. In vulneribus thoracis,



## AD LIB. VII. DE COMPOS. MEDIC.

quæ in cauum penetrant, quantum spiritus per vulnus efflatur, tantum materiæ voci detrahitur. Ut aliquando vel obscura, vel quasi dimidia, vel certa vox nulla relinquatur. Atque de materia. Iam verò spiritus ille aliquando interceptis viis intercluditur, ne ad asperam arteriam & laryngem perueniat, aut non conuenienter perueniat. Ita asthmaticis, purulentis vox sæpè læditur. At vbi efflatio libero trāsitu ad arteriam & laryngem peruenit, aliæ causæ læsæ vocis requirendæ sunt.

Ac causa sæpè & in tunica, quæ meliori parte arteriam vestit, communi quidem atque continua, & tunica, quæ totum os interius, fauces, linguam, palatum, & œsophagum inducit. Ea ergo tunica cum longa, multa, irrigatur distillatione, vocem adimit: moderatè verò humectata raucedinè facit. Irrigatur autem ferè à distillatione, cui accedit quoq; humiditas è pulmonibus, vel asthmaticis & purulētis. Sed hæc quoque inspirato aëre frigidiorè, vocem corrumpit: vel aëre venenato, aut maligna qualitate prædito: quod aliquando accidit iis, qui metalla curant, aut halitu quodā è speluncis, vel ab animæte venenato, quale fortasse est, quod de lupo scribunt, Lupi Mærim videre priores. Sed nimium resiccata ea tunica vox vitium trahit, & fit clangor: vel in febre vehementi ardente, causa post longas vociferationes, multasque, vitium contrahit simile lassitudini, quæ phlegmonodes appellatur. Vulnerata quoque arteria & ita efflato spiritu, materia vocis, vox perit, nonnunquam quoque potu meraciore. Sed larynge læsa maxima vitia accidunt voci, præcipuè vbi muscoli aperiētes vel claudentes laborāt.

Neruis quoque vocalibus læsis, vox grauitèr læditur. Sæpè etiam aboletur gargareone, epiglottide, faucibus, musculis, qui arteriam coniungunt, œsophago. Oesophago respondente, spina, & maximè, vbi intrò luxata est neruis sextæ coniugationis, qui carotidibus assident in collo, ac denique cerebro læso vox lædi potest. Itaque priusquam de remediis vocis statuatur, videndum de causâ, & an remediis locus sit. Incisis enim neruis sextæ coniugationis, gargareone, musculis, vel aperientibus, vel claudentibus, desperatur curatio: quemadmodum inueterata raucedo, quæ vel annum, vel duos annos superat, incurabilis à multis iudicatur. Ac Medici arteriaca vocant medicamēta, quæ vel musculis laryngis, vel membranæ, quæ arteriâ succingit, medeantur, quorum triplex genus est. Primū læuigat, minimè mordax, emplastica natura, quo genere vtuntur in raucedine, aspreddine, initiis inflammationum. Secundū genus est facultatis citra rosionem abstergentis: in quo genere, vt in reliquis, distinguēda sunt, quæ magis aut minùs id faciunt. Tertium genus eorum, quæ siccant, discutiunt.

*Arteriaco-  
rum medica-  
mentorū ge-  
nera tria.*

Itaque ordo est in vsu horum medicamentorum, vt primū lenientibus vtare, donec moderatior fuerit inflammatio: postea leuiter abstergentibus, vt paulatim abstergenti facultas augeatur, tum siccantia permiscantur, postremò acria. Magna pars horum medicamentorū in hypoglottidas, hoc est, medicamenta, quæ tenentur sub lingua, fingi debent, vt paulatim illiqueant, & deglutiantur, tumque omnino cohibenda tussis, ne materia defluens in arteriam reiiciatur. Etenim hærere necesse est.

## AD LIB. VI. DE COMP. MEDIC.

Præterea viscidis ferè medicamentis colligatur materia. Primi generis oua sorbilia, butyrum, amyllum, tragacantha, terra sigillata, gummi arabicum, glycyrrhyza, sorbitio vulgaris è tritico, ex hordeo, lac, mustum dulce coctum, ius passularum bene coctarum, dactylorum veterum & dulcium, iuiubarum, sorbitio ex pineolis recentibus, quomodo fit ex amygdalis, decoctum nucis pineæ, esus pedum animalculorum coctorum ad putrilaginem, gelatina, furfurum cremor, semen lini, althææ, & inde mucagines. Muccago psyllij, seminis cucurbitæ exorticati, cittuli, violarum, melonis. Hæc eadem fient secundi generis, additis saccharo, alphenic, diatragacantho frigido, penidiis, pilulis albis, saccharo violato, ac tandem melle. Iam in secundo genere præter hæc decoctum amygdalarum, caricarum pinguium (nam acres & aridæ ad tertium genus sunt referendæ) syrupus violatus, iuiubarum, prunorum dulciū, nenupharis, de papauere, de floribus & foliis althææ, è decocto nucis pineæ resinosa, è decocto passularum pinguium. Tertiij generis hyssopus, thymum, filicis radix, semen ormini, vrticæ cinamomum, cassia lignea, piper, spica, & alia id genus aromata acria, thus, crocus, myrrha, mastiche. In concoquentibus numerantur, terebinthina, coquit, terget, siccatur, amygdalæ amaræ, detergent, & his magis farina orobi, ormini semen, radix iridis. Diaireos salomonis facit ad abscissam vocem à frigore: similiter & diaireos simplex, vel diatragacanthum, ubi à calore vitium est. Nam in hæc tota materia distinguenda, quæ refrigerant, contra causam calidā: similiter quæ calefaciunt, contra frigidam causam.

Galenus ex Hippoc. in raucedine, siue fit à distillatione, siue à frigore, non putat vtendum medicamentis purgantibus, quanquam hoc tempore & cassia, & catholico sine periculo vteris. Voce clangosa læuigantibus, quæ refrigerant, vtendū est. Balneum quoque in læsa voce conuenit, vbi vel à calore, vel immodica vociferatione contractum vitium est. Consensus est veterū vocis studiosos plurimū iuari, si plurimum panem siccum ederint, priusquam bibant, aut liquida sorbeant. Mixtura trium generum concorporatis aridis, vel diaireos cum vitello oui, cum butyro, syrupis, muccaginibus, infinita remedia constitues, vt res exiget.

*Rauedini  
purgationem  
accommoda-  
re Galenus  
vetat: recen-  
tiores Medi-  
ci imperant,  
sed clemēti-  
orem.*

Reliquo hoc libro de tussi, reiectione sanguinis, & spirandi difficultate agit Galenus, ac plurimum vtitur medicamentis narcoticis: quorum vsus est bene purgato corpore, vbi nimium tussis vrget, & vigilia. In narcoticis, itaque syrupus est de papauere, cui proximi sunt syrupus de nenuphare, & violatus recens. Galenus plurimus est in descriptione diacodij, quod ita confici debet. Decem capita 7.8. aut nouem papauer. candid. loco neque squalido, neque palustri colliges, vt sint ea capita neque molliora, neque sicciora. Magnitudine verò mediocria capita ista selecta vnum diem fines. Neque statim exempta coques post horas 24. qui dies vnus est, sextario aquæ puræ & synceræ vel pluuiali, vel fontanæ, quæ non ducatur per canales plumbeos, incoques. Est autem sextarius, quantum capit cheopina Parisiensis, adiecta quarta parte. Coques autē dum capita intabescant. Sic autem capita exprimes in aqua, in qua coxerint, animaduertēsq; ad mate-

*Diacodij præ-  
paratio.*

# AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

riam decocti, vt dimidiũ vel sapæ, hoc est, vini cocti  
 è musto dulci, in morbis thoracis, ex musto adstrin-  
 gente, in dysenteriiis & vbi vigent vigilæ, tenuiõr-  
 que fluxio est, vel mellis, vbi partim sistendum, par-  
 tim educendum, nec ita vigent vigilæ, nec acris,  
 aut tenuis fluxio. Alioqui & sapæ & mellis vtriũs-  
 que parem modum in media conditione, decocto  
 adiicies. Coques autem dum sit spissitudo syrupi.  
 Aliquando glicyrrhyza addiicitur loco mellis, dia-  
 tragacanthum frigidum in calore & siccitate: dia-  
 reos simplex, vbi educendum. Saccharum quoque  
 loco mellis misceri potest. Datur cochleare delin-  
 gendum. Aliud est medicamentum narcoticum,  
 quod Philonium veteres & recentiores Medici ap-  
 pellant, quod variè conficitur. Græcum hoc modo.  
 Piperis albi ʒ. 20. β. feminis hyoscyami albi tantun-  
 dem: opij ʒ. 10. croci ʒ. 5. spicæ nardi, euphorbij, py-  
 rethri, ana ʒ. 1. vniantur omnia melle cocto. Detur  
 dimidium drachmæ, scrupulus vnus. Arabicum hoc  
 modo. Papaueris albi, hyoscyami, ana ʒ. 20. aut for-  
 tasse loco papaueris piperis scribendum est: opij,  
 terræ sigillatæ ana ʒ. 10. lapidis hæmatitis ana ʒ. 5.  
 pyrethri, castorei, spicæ, euphorbij, margaritarum  
 non perforatarum, carabæ, zodoariæ, doronici, gal-  
 liæ moschatæ ana ʒ. 1. caphuræ ʒ. 1. Incorporentur  
 omnia melle rosato colato. Dosis à ʒ. β. ad ʒ. i. cum  
 succo arnoglossi, in sputo sanguinis vino dulci, ad-  
 iecta parte rosarum. Rhazes aliter. Piperis, ameos,  
 foliorum mentastri, castorei, baccarum lauri, cymi-  
 ni ana ʒ. 1. opij, mandragoræ, feminis hyoscyami  
 albi ana ʒ. β. mellis q. s. Dosis ʒ. i. aut ʒ. 4. quia hoc  
 Philonium leuissimum est: Græcum fortissimum:

*Philonium  
Græcorum.*

*Philonium  
Arabicum.*

in medio verò Arabum. Nicolaus proximè describit ad Philonium Galeni. Alexandrinus quoque: Actuarius, sublato castoreo. Alexandrinus aliquot descriptiones Galeni facit. Compositio describitur lib. 9. Sunt & alia narcotica, Pilulæ de cynoglossa, Athanasia, diapente, & antidotum, quod & pleuriticis prodest, empyicis, tussiculosis, vt vna portione liberet. ℞. castorei, opij ana ʒ. 4. succi baccharum lauri, mandragoræ, cinamomi, spicæ, cardamomiana ʒ. 2. croci, cassiæ, dauci, ana ʒ. 1. β. costi, myrrhæ, galbani, piperis albi an. ʒ. 1. vniuntur melle. Datur castaneæ magnitudo cum tepida.

*De asthma, orthopnea, difficultate spirandi.*

**I**N his omnibus difficultas est spirandi: sed hæc in genere tres causas habet, quæ ad rectè curandum recognoscendæ sunt. Itaque difficilis spiratio est, vel propter vehementem æstum conceptum in thorace & pulmonibus, vt in peripneumonia, graui pleuritide: altera causa est, angustia partium spiritalium, quæ vel puri, vt in tabidis & purulentis, vel crassæ & viscidæ pituitæ, vt in asthmaticis, vel tuberculo aliquo, abscessu incluso in partibus spiritalibus, intercipiuntur. Tertia causa est, imbecillitas partium, quæ respirationem faciunt: atque hæc distinguenda suis notis, quas scriptas inuenies cap. v. & viij. libro 4. de locis affectis. Galenus hoc libro alias differentias difficultatis spirandi relinquit. Tantùm agit de asthmaticis & iis qui, quia periculo suffocationis, quasi recti coguntur decumbere erecta ceruice, orthopnoici appellantur. Asthmatis itaq; & orthopnoæ causa, angustia est à crassa & viscida materia bronchiis pulmonis:

*Spirandi  
difficultas  
tres causæ.*

*Asthmatis  
& orthopnoæ  
causa.*

## AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

atque huius mali initium ferè est à perpetua distillatione. Itaque imprimis habenda ratio totius corporis, deinde capitis : postremò liberandus pulmo ea materia, quæ iam inhæsit. Quòd ad vacuationem totius corporis attinet, phlebotomiæ quidem aliquando locus est in plethoricis, bene habitis corporibus, aut in quibus suppressa est solènis aliqua sanguinis vacuatio. Et quia hic morbus senibus, corporibus natura frigidis, conditione pituitosa ferè nascitur, non temerè detrahendus sanguis est. Quod ad capud attinet, vacuandum per errhina potius, quàm masticatoria. Tondendus est capillus, corroborandum caput est per ea, quæ prioribus libris descripta sunt: parca cœna, usus vini tenuis, alimentorum, quibus vis insitum incidendi, tum detergendi. Gal. 6. Epidimion ex Hippocr. sententia abstinentiū putat acribus, vt allio, sinapi, iis, quæ difficulter coquuntur, vt suilla, bouilla, ouilla, alimentis mali succi, quæ descripta inuenies lib. de euchy. & cacoeh. Postremò iis omnibus, quæ vehementer tendunt aut mouët, qualia sunt exercitia, cursus, clamor, ira, vociferatio, & alij id genus affectus animi. Medicamentorum facultas incidat, abstergat, sed citra insignem calorem : non adstringat, non refrigeret, non sit narcotica. Hoc quoq; vult Galenus. Medicamenta quæ natura sua siccât, diluit, vt faciliùs crassitiem humorum diuidant, & nec præter modum siccant. Propterea & multum potum concedit, vnde crassities materiæ diluatur. Sed talis sit multus potus, vt iuuet quidem, & non noceat. Nocet potus à quo repleri potest caput vaporibus. In remediis maxime probat, quæ parantur è scylla, qualia sunt mel

*Phlebotomiæ  
quando locus  
inspirandi  
difficultate.*

scylliticum, acetum & oxymel scylliticū. Gal. idem *Mellis scyllitici præparatio ex Galeno.*  
 mel scylliticum hoc modo comparat. Scyllas aridas vase; in quo mel repositum fuerit, reponit sub canicula, exponit soli, subinde obuertens vas calori solis, & prohibens frigore Aquilonis: inde resudat liquor, qui melli mixtus efficacissimum remedium est, vbicunque crassus humor incidendus, & viscidus detergendus, vt in asthmaticis, epilepticis, & aliis id genus: Alioqui scylla coquitur, exprimitur succus & miscetur melli, vel è cruda succus expressus concoquitur melli. Dosis à semisse drachma, vt in pueris, ad 3.2. Acetum & mel scylliticum describuntur à Nicolao. Looth de scylla respondet melli scyllitico. Purgationes autem totius corporis subinde reuocandæ aliquando ex cassia, catholico, sed præcipuè agarico. Materia, aristolochia, gētiana, enula, centaurium, radix maioris centaurij, melanthium, iris, origanū, thymum, hyssopus, satura, pulegium, semen vrticæ, irionis, asellorum puluis, & qui è limacibus torrefactis, è præparato pulmone vulpis, vermibus serici, ericio, lacertæ stercore, odorato, quod vulgus moschum appellat, vermibus subiectis vrticæ, interioribus oculis philomenæ. Adde sulphur viuum, sænugræcum. Ex aliorum decoctis oxymel fit, vel melicratum, pulueres butyro, melli scyllitico vel liquidis permiscuntur: alioqui decocto ficum aridarum. Laudatur decoctum rutæ, galli fatigati lucta, cocti cum herbis esculentis, quibus vis insit siccandi, incidendi, detergendi. Cucurbitæ scapulis, cruribus, sub mammis affigendæ. Thorax primùm munitur sordida lana, prius imbuta oleis amygdalarum dulcium, de lilio, & simi-



AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.  
 libus. Postea quoque dropaces, sinapismi, & quæ  
 exulcerant, adhibentur. Theriacæ & mithridatij  
 vsus conceditur interuallis: decoctum quoque sa-  
 tis dilutum ligni gaiaci: aut concoqui debent pas-  
 sulæ, ficus, glycyrrhiza. Videndum tamen ne quis  
 fallatur, vt putet causam asthmatum crassam &  
 viscidam pituitam, cum sit abscessus. Hic enim pau-  
 cus potus conuenit: medicamenta verò, quæ in-  
 cidant & siccent, in quibus maximè probantur à  
 Galeno, quæ aromatica sunt.



## AD LIBRVM VIII.

GAL. DE COMPOSIT.

PHARMACOR. καὶ τόπος.

### PERIOCHE VIII.

*Stomachici  
 qui dicuntur.*



Alenus in hoc libro 8. agit de sto-  
 machicis, & iecorariis. Stomachici  
 dicuntur, qui imbecillitate stomachi  
 laborant: quanquam ab acciden-  
 tibus, quæ imbecillitatem sequun-  
 tur, aliquando stomachicos dicunt,  
 qui vel subuersione ventriculi, quam vocant ἀνα-  
 τροπήν, vel supinitate, quam appellant ὑπλίσσµον,  
 stomachicos nominant. Atque omninò, vt antè  
 scripsit Galenus 2.li. imbecillitas stomachi, hoc est,

oris ventriculi, & virtutis concoctricis totius vētrici-  
culi, maximam vim habet aceruandis excrementis.  
In his affectibus deiicitur appetentia, nausea quædā  
est, aliquando vomitio & diarrhæa: atque aliquan-  
do ea humiditas fluitat, nonnunquam imbibita est  
biliosa, nunquam sine vitio: quæ omnia ad curatio-  
nem reuocanda sunt. Ac præterea, vt ventriculi af-  
fectibus artificio medeamur, cognoscenda ea, quæ  
scribit Gal. 3. lib. de morbis & symptomatis, cap. 5.  
lib. 5. de locis affectis, 6. de sanitate tuenda 7. Metho-  
di, & signa in arte parua. Intemperies si sola est, cō-  
trariis euinci debet. Nam vbi æstuat, refrigerandū:  
vbi friget, calfaciendum: si squallescit, humectan-  
dum: vbi multa humiditate laxatur, siccantibus at-  
que adstringentibus vtendum. Hæc autem omnia  
signis ostenduntur, quæ inuenies in arte parua. At-  
que remediorum duplex genus. Alterum in alimen-  
tis, quæ sua qualitate morbo repugnāt: alterum in  
medicamentis, quæ partim deuorātur, partim adhi-  
bentur foris. Quæ foris adhibentur, linimenta sunt.  
Alia cataplasmata: quædam emplastri formam ha-  
bent. Sunt & fomenta. Atque hæc omnia partim  
interiori parti, vbi sternū est, partim ad 12. vertebrā  
dorsi applicari possunt. Sed quæ à dorso applican-  
tur, aliquid tenuium partiū habeant, vt per densita-  
tem viæ penetrare possint. Itaque in linimētis, quæ  
refrigerāt, ceratū est rosaceum Galeni, ex ceræ parte  
vna, tribus aut quatuor partib. olei rosacei, quod le-  
gitimum sit, liquatis in vase duplici: deinde subactis  
cum succo omphacij, vel simili adstringēte. Hoc e-  
nim dictū sit in vniuersum, medicamenta quæ sto-  
macho adhibentur, egere adstrictione, quæ scilicet

*Stomachica  
remedia qui-  
bus partibus  
externis ap-  
plicanda.*

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

corroboret. Quamquam in adstringendo modus esse debet. Nam quæ nimium adstringunt, nimium siccando nocent. Conuenit & vnguentum rosaceum, ceratum santalinum rosaceo dissolutum, recentes rosæ, vel in austero vino parum vinoso decoctæ.

Item oleum cydoniorum, myrobalanorum, comparatum ex vitium capreolis, & aliis rebus id genus, quæ & adstringunt, & refrigerant. In eadem intemperie veteres plurimum vsi sunt medicamentis, quæ ex succo cydoniorum comparantur, quæ etiam secuti sunt recentiores, vt in syrupo acetoso, de cydoniis.

*Ad calidam  
vetriculi in-  
temperiem uti-  
le remedium.*

℥. succi cydoniorum depurati per residentiam, sacchari ana lb. i. aceti ℥. 3. coque ad spissitudinem. Datur cum aqua. Conuenit stomacho calfacto, confirmat, facit appetentiam. Poteris tamen inuenire modum sacchari, vt erit calor. Eiusdem generis sunt Miux, vt miua Rhazæ, siquidem sine vino & aromatibus comparetur. Nam cum his refrigerato stomacho conuenit succi cydoniorum depurati per residentiam lb. i. sacchari lb. i. β. vini veteris lb. β. Coquatur, & despumetur. In calidum autem immittatur nodulus sequens.

℥. Zinziberis, spicæ, cinamomi, caryophyllorum, ana ʒ. 2. mastiches ʒ. 4. Inuoluatur in nodulo. Alias Miuas describemus in intemperie frigida. Eodem modo oxyfacchara, syrupo de granatis, de ribes, de grossulis, de agresta vteris: hæc enim ad refrigerium ventriculi faciunt, corroborant & appetentiam excitant. In his autem qui abhorrent à syrupis, materiam horum immiscebis alimentis, vel, quod fit, coques & condies saccharo in vocatis vulgò Tartinaigiis. Cæterum hoc semel dictum fuerit, alimenta & medica-

medicamenta, quæ imbecillo ventriculo adhibentur, oportere vel calida, vel frigida esse, quia tepida robur dissoluunt. Abstinentum tamen nimium refrigerantibus, ne inde natiuus calor offendatur. Et quia frigida intemperies sæpius accidit, propterea multò plura medicamenta descripta sunt ab antiquis, quæ faciunt contra intemperiem frigidā: quam & horum quædam contra declinantes inflammationes ventriculi, ad resoluendum videlicet scripta sunt: quale est laudatum à Galeno, & quod stomachicum Galeni vocant. Sed iam parari non potest inopia nardini vnguenti & ceræ pōticæ, aut alioqui amaræ. Hoc modo tamen conficietur vtile, & accedens ad medicamentum Galeni.

*Tepida imbecillo ventriculo non adhibenda, quia robur dissolunt.*

Comparabis itaque optimum oleum nardinum, aut ex his aromatibus, quæ calfaciant & corroborent, vno, pluribusve, cinamomo, ligno aloës, moschata nuce, macère, spica, cypero, lauëdula, mentha, maiorana, rosmarino, stæchade, cardamomo, schœnuantho, & aliis id genus, quæ quidem olea hac arte conficies. Parem modum olei & vini permiscebis: coques deinceps, & ordine iniectis, quæ vel breuiorem, vel longiorem coctionem sustinent. Coques autem ad vini consumptionem, comparato oleo, hoc modo miscebis.

*Ad frigidantē ventriculū intemperiem remedia.*

℥. ceræ citrinæ ʒ. 4. olei ʒ. 3. β. Liquefiant in vāse duplici. Tum addes succi omphacij, sumach, vel alterius id genus ʒ. 3. aut 4. confice ceratum. Quòd si videtur esse diuirus, aut grauius, in vsu diluetur cōuenienti oleo, vt sit vel liquidius, vel spissius. In liquidiore intinges vel gossipio, vel lana dibaphatica (vulgò esscarlatte) & calidum medicamentū ad-

AD LIB. VIII. DE COMPOS. MEDIC  
mouebis. In declinationibus inflammationum, lo-  
co medicamenti Galeni & meliloti, vtemur empla-  
stro nostrò de meliloto dissoluto in oleo conueniē-  
ti, vt de spica, de lauendula, & aliis comparatis ex  
præscripta materia. Humidior ventriculus siccanti-  
bus & adstringentibus curari debet: siccior, hume-  
ctantibus. Meminisse tamen oportet semper inter-  
miscenda, quæ adstringendo corroborant, quales  
sunt rosæ, succus cydoniorum, prunorum non dul-  
cium, & aliorum id genus: aromata verò, vbi frigi-  
ditas coniuncta est. Sed ferè fit, vt ad intemperiem  
sequatur excrementorum prouentus, vnde ferè fiūt  
& anatrophe vocata subuersio, & hyptiasmos, hoc  
est, supinitas. Anatrophe hæc habet accidentia, cibi  
fastidium cum nausea, aquæ vomitus aliquādo, ro-  
sionem, voulimiam, aut caninā appetentiam, fasti-  
dium, quale est repletis è cibo. Sæpè accedit multi-  
tudo vitiosi succi, alioqui pauca, vel nullæ humidi-  
tatis. Hyptiasmos aliquādo ab intemperie citra hu-  
morem: aliquando cum humore multo quidem,  
sed non maligno. Is humor aliquando fluitat ferè  
tenuis, nonnunquam crassus & viscidus imbibitur  
ori & tunicis ventriculi: nonnunquam cum signis  
caliditatis, æstu, siti: aliquando sine siti, vbi frigiditas  
coniuncta est. Eiusmodi humiditas appetentiam  
deiciit, & ea cōmouet, quæ in anatrophe dicta sunt.  
Hæc autem affectio dissoluit tum os ventriculi, tum  
ventriculum ipsum. Quo modo vincula, nerui, mē-  
branæ, imbibita omnia multa humiditate laxa, vi-  
cta & quasi omninò dissoluta redduntur. Eget hæc  
affectio primùm quidem vacuatione: atq; vbi hu-  
mor fluitat & tenuis est, partim vomitu, partim le-

uibus medicamentis vacuari potest: deinde siccantibus, adstringentibus, & corroborantibus curari potest. Quod si crassa & viscida materia est imbibita profundius, oxymelite vel simplici, vel composito ex decocto radicis fœniculi, cinamomi, & aliorum id genus, quæ, scilicet, incidunt, tenuant, præparari debet. Hiera simplex, ut medicamentum efficacissimo, aliquoties utendum erit, ut quod vim habeat incidendi, detergendi, corroborandi, purgandi, & præsertim quæ sunt in ventriculo, & primis venis. Datur ʒ. 2. aut eò plus cum hydromelite, vel oxymelite. Repurgata materia, corroborantibus utendum erit. Vbi verò humiditas frigida est, siccandum, detergendumque. In humiditate neque crassa, neque viscida in alto posita, sola adstringentia satis esse possunt: quanquam tutius fuerit pilulis communibus, vel ante cibum datis vacuare materiã. Alioqui pilulis ex rhab. & agarico. Alioqui terebinthina utemur. In intemperie frigida & humida, tum quæ purgant, tum quæ adstringunt, inimica sunt, utendumque medicamentis, & alimentis, quæ calefaciunt, & siccant. Medicamenta in hoc libro descripta ad anatropas & hyptiasmos ferè composuerunt veteres ex rebus adstringentibus & detergentibus, succo punicorum acido, cydoniorum, sorborum, mespilorum, myrtorum, dactylorum recentium, & quæ vulgò (prunelles) dicuntur. Adde, si vis, grossularum, & similium, quorum compositionis hoc sit exemplum, addito melle, quod ad immoderatas omnes affectiones ventriculi facere scripsit Galenus, nisi sint cum vehementi æstu.

Succi cydoniorum depurati sextarij duo (hoc est

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

nostro more semisextarioli quinque, vel libræ duæ cum semisse) mellis despumati optimi sextarij duo, id est, semisextarioli quinque, vel libræ tertiæ cum 4. quartariis, aceti acris sextarius vnus, hoc est ℥. xx. vel non ita acris sesquiseptarius, hoc est ℥. xxx. Coque ad spissitudinem. Quòd si frigiditas communicata est, iam coctis adde zinziberis ℥. 3. piperis albi. 3. 8. Lauigata coctis aliis permiscuntur. Aliud.

Eiusdem carnis cydoniorū, mellis an. lb. i. aceti albi tantundem. Bulliant simul, & agitentur: tum adde piperis, zinziberis ana ℥. i. petroselini Macedonici ℥. β. In frigiditate cōuenit diagalanga, dianifon, diacuminum, diatriton pipereon, zinziber viride, nux moschata, condita diuitibus, vt Chebuli conditi. Confectio anacardina, theriaca, mithridatium, & maximè vbi refrigerato ventriculo plurimi flatus excutiuntur, vnde periculum hydropisis immineat. Et quia apud veteres, tum etiam recētiore Medicos absynthiū sæpè memoratur, de eo sic habeto. Utendū itaque absynthio aromatico, non eo, cui horribilis sapor est. Itaque decoctum absynthij biliosa deterget & subducit, si quidē altiùs non fuerint imbibita. Maior vis inest syrupo de absynthio, aut melicrato parato ex decocto absynthij. Infestissimum verò absynthium, quibus pituita in ventriculo inhæsit, nisi decoctum eius cōdiatur aromaticis, incidentibus, calefacientibus, & melle vel saccharo, quod detergeat. Emplastro vsitatissimo, eodēmq; efficacissimo ex mastiche, cerato stomachico Galeni, carne cydoniorum sic vteris. Mastiche & ceratum stomachicū vtrunq; corroborat, & discutit, cydoniatum, caro cydoniorū, deterget, & corro-

borat. Tria hæc pondere æquali permiscentur, singulorum  $\mathfrak{z}$ .i. iunguntur cum oleo mastichino, de spica, & aliis. Aliquando vbi discutiendum magis, neque ita adstringendum, plus mastiches & cerati minus miscetur, cydoniati aliquando, ex sola mastiche, aut cerato emplastrum conficitur. Augendus modus cydoniati, vbi vel vomitio, vel diarrhæa vexat. Sed duplex cydoniatum est: alterû sine speciebus, quod vbi calor est, vsutpandum: alterum cum speciebus, quod in sensu frigiditatis conuenit.

*Ad dolorem stomachi.*

**S**tomachus vegetissimo sensu præditus est propter neruos illos insignes à sexta coniugatione. Archigenes in magno dolore ventris venam secat, extrema ligat, cucurbitulas circa stomachum affigit, lenientibus fomentis vtitur, glande aluum subducit potiùs, quàm clystere, quia à clysteribus metuit, ne inde sublatus vapor dolorem augeat. Secanda autem interna, & perseverante malo, vtriusque brachij, & hoc magis, si grauis dolor est, si repentinus, si difficilis ructus & spiritus, si febris est, si dolor in dorsum & scapulas extenditur. Historia est apud Hippocratem lib. Epidemiõ de muliere quadam, quæ in vehementissimo dolore stomachi nullis adiuta est remediis: ducto tandem sanguine ex vtrâque manu seruata est. Cucurbitule, vt Archigenes, circa stomachum, vel vt alij, vmbilico, vel ad latera vmbilici affigendæ: dextra quidem parte, si ab hepate: sinistra, si à liene in ventriculum fluxio est. Sunt qui affigant ad 12. vertebra[m] dorsi. Purgationis vsus est, si ab acri sanie, aut humorum prauitate dolor est excitatus. Atq; omninò in affectio-



# AD LIB. VIII. DE COMPOS. MEDIC.

*Ventriculo  
malè affecto  
quæ purgatio  
conueniat.*

nibus stomachi & ventriculi vbi purgandum est vtendum purgatione omninò leui, & quæ non attrahat à reliquo corpore, nisi confluente ad ventriculum materia ab vniuerso corpore dolor moueatur. Post hæc topicis & sumptis per os leniendus dolor est, alimentis quidem ea qualitate præditis, quæ faciat cōtra causam morbi. Similibus quoque medicamentis, sed odoris & aromaticis. Stomachus enim gaudet odore, subuertitur contrariis. Vtemur verò fomentis ex chamæmelino, meliloto, aneto, antho, rosis, mentha, absynthio, cypero, mixtis simul anodinis, & iis, quæ corroborant. Modus autem fouendi est, vt coquantur aqua, adiecta vini parte, & inculcatis in decocto lintheis pars foueatur. Alioqui vesica impletur ad dimidiū, & stomacho adhibetur: in æstu, frigida: in frigore, calida: oleis quoque prius cōmemoratis. Sed vbi ardor coniunctus est, folia vitis, papaueris, hyoscyami, mādragoræ, flores inde & semina concoquenda. Aliquando vbi à doloris vehementia periculum imminet, narcoticis vtendū, opij grano vno, leuiter feruefacto, in syrupi rosarū & absynthij an. sesquuntia. Sit autē tantū vna ebullitio, quæ deinde misceatur ʒ. 3. iuris pulli. Detur in potu. Alioqui Philonij in causa frigida, in causa calida. Reiqui descriptione Nicolai, drachma semis in vnciis duabus vini odoriferi.

*Ad vomitum.*

**V**OMITUS subuersio quædā est copia vel qualitate materiæ: alioqui incitatur vētriculi imbecillitate. Vacuanda copia: purganda praua materia: imbecillitas, vt prius, corrigenda. Ac ferè vomitus excitatur, qui perseueret, imbecilliore stomacho.

Nam si quid excludendum robusto quidem stomacho, sed imbecillo ventre per deiectionem excluditur. Contra verò re habente, per vomitum. Vehemēter cohibet vomitiones ceratum priùs descriptum ex partibus æqualibus mastiches, cydoniari & cerati stomachici Galeni, iunctis cum oleo cydoniorum, rosarum, mastichino. Efficacissimum remedium contra perseverantes vomitiones est similiter vini odoriferi potus, & in calore iulep rosatū, adiecta parte octava vini granatorū, berberiorum, & similium, quæ tantillo cinamomo condienda sunt. Plurimum quoque conferet syrupus de agresta, vel omphacomeli veterum.

*De Singultu.*

**S**ingultus ab acri & rodente, vel materia, vel fame, à repletionem, inanitionem, frigiditate excitatur, aut, vt breuius Hipp. ab inanitione & repletionem. Itaque vbi repletio, vel acris materia est, purgare conuenit. Galenus vehementer probat vsum hieræ picræ. Arabes proprietatem quandam ascribunt rhabbarbo in edendo singultu. Post purgationem corporis vino odorifero cum tantillo cinamomi & galangæ vtendum est fomentis, quæ incendant, calefaciant, abstergeant, ex materia in dolore frigido præscripta. In inanitione, vnde singultus, etiam si desperata res videatur, iuuandi tamen distillatis, colatitiis, iusculis expressis, gelatina, sorbilibus ouis, inungendus stomachus & deorsum ad 12. vertebra hydrelæo, ex æquis partibus aquæ & olei violati. Neque tum adstringentibus vtendum, sed rarefacientibus, vt materia transpiret. Conueniunt & quæ antea commemorata sunt, dia-

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

galanga, dianisum, & similia. Anisum peculiari ratione singultui medetur, propterea & anisum sæpè imperant, & oleo anethino ventriculorum fouent.

*De ulcere ventriculi, vel œsophagi.*

*Ventriculi  
ulcerati si-  
gna.*

**E**Xulceratur à causâ externa & manifesta, vel etiam à causâ interna, humore acris, pharmaco acuto, & aliis rebus acutis: tum etiam præcedente abscessu. Signa sunt, quia dolor fit ulcerata parte, sed præcipuè si quid acre, ut sinapi, si quid calidius aut frigidius deglutitur, & inde factò dolore intelligimus qua parte vlcus sit. Pure etiam vel vomitu, vel deiectione exeunte. Ardor quoque in ea parte percipitur. Lingua sæpè inficitur: sapor redit in os, angustia est spiritus & ferè fastidium: sed ubi in orificio ventriculi grauiora symptomata commoueri solent, animi deliquia, extremorum frigus, dolor crudelior. Cap. 4. lib. 5. locorum affectorum Galenus scribit omnes ferè interire, nisi ætatis beneficio feruentur. Ad hæc legenda quæ scribuntur 4. Method. Utendum est alimentis, quæ medicamento- sam qualitatem habeant, detergentibus, incarnantibus, & cicatricem ducètib, quæ seligenda sunt ex 2. lib. de materia Chirurgica. Abstine dum omnibus acris acerbis, falsis, acidis, quæ scilicet vlcus exasperant: mitigantibus utendum, quæ etiam detergeant, glutinent, incarnent, cicatricem ducant. Atq; in gula paulatim deglutendum, adiungendumque aliquid viscidum, ut vis medicamenti obiter inhæreat. Lac itaque tepidum conditum saccharo, diatragacantho frigido, lac amigdalârû, hordeatum, limaces, cochleæ, gelatina. Sed maximè oua sorbilia, aut paulò magis cocta concipiendis medicamentis ido-

nea sunt. Potus quoque, hydromel, vel hydrosaccarum, syrup. viol. iuiubarum: deinde etiam myrtillorum & rosarum de siccis. Vtimur quoque saccharo rosato, mastiche, tragacantho, & aliis id genus, farina fabarum, hordei tosti, admixto pulvere balaustiorum, malicorij, sanguinis draconis. Exercitatio & frictio partiũ inferiorum. Sed aliquando non vlcus, sed tuberculum in œsophago nascitur, à quo defluens potus aut cibus resistit in via sine dolore. Rarum est, quod tamen post 4. mensem accidit. *Historia.* Puella quædam deuorato multo pulmone veruecino, & inde grauato ventriculo post nauseã vomuit frustũ pulmonis. In œsophago restitit parte superiore, vnde grauiter cõflictata & periclitata conualuit successu, cucurbitulis affixis, & ferramētis in œsophagum inditis. Nihil deglutiebat intercepta via. Ex antecedente de malo cõiectura facta est. Inflata eius pulmonis portio œsophagum obsederat.

*De Voulimo.*

**V**oulimum quãsi πολὺ λιμός appellatur: βῆ enim particula in hac voce, vt aliis multis, πολὺ multũ, aut magnum significat. Est autem genus quod ab ingente fame nomen habet. Vocatur & phagedæna ab insatiabili edendi cupiditate. Sub hoc genere continetur canina appetentia, affectio appetitricis facultatis, id est, stomachi in quo affectu repletus affatim ventriculus paulò post omne reuomit, aut deiicit, virtute non sustinente. De hac canina appetentia lege 5. & 6. de locis affectis, 4. de sympto. causis. Causa est cum os stomachi penuria, imbecillitate, & refrigeratione afficitur, 5. de simplicibus, à frigiditate & siccitate,

*Canina appetentia.*

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

vnde curari putat calfacientibus & humectantibus balneis & alimētis. A fame inchoat, quæ postea definit. De quo lege Aphorismum 21. lib. 2. Galenus de vsu respirationis refrigeratis partibus thoracis, & quæ vicinæ sunt, lib. verò de Theriacâ, helminthi vermi, hoc aliquândo attribuit nobili historia de virgine quadâ: quæ cùm multū comederet, perpetuo tabescebat, verme illo perpetuo exugente chylū & alimentum, quod deberet distribui corpori. Legendus commentarius aphorismi, *Famem thorexis & vini potio soluit*. Elenij vini vsus plurimum laudatur à Galeno: sed neque vacuo ventriculo, sed modico pastu, neque multū semel, nisi vehementer sitiunt, sed breuibis interuallis. Archigenes eos, qui ingenti fame in viis delinquant, reuocat odoremētis aceti, pulegij, terræ aceto maceratæ, pomis, malis, piris, & alijs, quæ ad manū sunt. Dat panem intinctū vino, postea suillam affatam, & ea quæ multum nutriunt, & odore sunt bono. In paroxysmo extremæ partes constringantur, maxillæ pungantur, pili vellantur, & aures. Reuocatis, ab animi deliquiis, panem dat imbutum vino diluto. Alimenta, quæ affatim nutriunt, oua forbilia, bulbos, cochleas & similia.

## De Hepaticis:

*Hepatici Galeno qui sint.*

**H**ēpaticos definit Galenus, qui ex imbecillitate hepatis aliquo vitio laborant, etiam si neque febris, neque inflammatio, & sine hac imbecillitas esse potest. Nascitur imbecillitas ab intemperie. Intemperies est vel visceris, vel humorum, qui venis & arteriis continentur: vnde vel alteratrix, vel retentrix, concoctrix, vel excretrix male suo munere fungitur. Sed hoc quomodo distin-

guendum, intelligendum ex libr. 6. de symptomatis, & morbis, itémque ex cap. 6. lib. 5. de locis affectis, vbi malum insistet. Galenus in vitio alteratricis, cùm scilicet hepar attrahit, sed quod attrahit, nō sanguificat, ait egeri similia loturæ carniū, vt, in historia illa Siculi Medici, cuius meminit libr. 5. de Locis malè affectis. In calida intemperie humores visceris, deinde viscus eliquatur, vacuatúrque per aluum bilis olida admodum, crassa, insigniter tincta, mordax, & spumans in frigida. Neque frequēs, neq; copiosa deiectio, sed longior affectus est, color pallidus, tardus pulsus, vrina tenuis, vbi siccitas contracta, spissa, vbi humiditas ac paulatim retenta materia calorem succendit & febriculam, quæ vix apparet, & Medicum fallit, nisi diligenter obseruet, tum quæ crassiores, fæculentæ & limosæ excretiones fæci sanguinis, vel limo similes. In calida intemperie leuibus pharmacis vtendum est, non vt intemperiem cures, sed vt vacues excrementa, quæ per intemperiem collecta sunt. Vtêris ergò cassia, catholico, syrupo violato, recenti rosato laxatiuo, quibus dilutum rhabarbari misceri potest, sed non ita magna quantitate dilutum: vt 3. i. sufficiet. In calida intemperie refrigerâtibus modicè, roborantibus vtendū, cichorio, endiuia, scariola, adiantho, capillis vener. fumaria & aliis id genus. Mellitis rebus non ita vtendum, quia in calida intemperie mel exsiccat, & talia promptè amarescunt. Iraque in decocto harū rerum sufficiet decima pars sacchari, alioqui dissolues decimam partem syrupi de portulaca, de limonibus, de acetositate citri, de granatis, oxysaccarē simp. & similiū. Acetose magna vis inest

*Hepatis ca.  
lida intem-  
peries leuio-  
ra petit ca-  
thartica.*

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

refrigerando hepatis, similiter & lactucae. Itaque altera vel utraq; plurima incoquitur iusculis. Ius acetosae exprimitur, in quo carnes intingantur, panis hordeatus, aqua hordei, hordeatū. Huic malo maxime cōueniunt aestiui quoque fructus, cerasa, ribes & similia. Vino non nisi diluto plurimum utendum est, elixis potius, quàm assis. In frigida verò plurimum laudatur electariū de vino Arabum, quod in hoc libro Gal. ex Andromacho describit, paululum variante formula, & syphoïdes appellat. Passularū mundatarum vncie tres, croci 3. 1. calami aromatici 3. 2. β. bdellij 3. β. cassiæ lignae drachmę duæ semis: cinamomi 3. β. spicæ 3. 3. myrrhæ, terebinthinæ ana 3. 4. iunci odorati, schœnuanthi 3. 2. β. filiquarum, vel carubiarū 3. 2. mellis 3. 2. vini tenuis, odoriferi, quantum sufficit, fiat electarium. Sed quia difficilis est hæc compositio, melius fuerit passulas mundatas ad lb. semissem incoquere vino subtili, odorifero, donec sit crassitudo: deinde admiscere conseruę anthos 3. 2. cinamomi 3. 2. cassiæ, spicæ, ligni aloës ana 3. β. croci scrupuli dimidium. Concorporare omnia, & exhibere semunciam pondere cum vino tenui & odorifero. Materia ferè cōuenit, quæ penetrat, propter angustias viarum seu venarum, cyperus, schœnuanthum, crocus, iris florentiæ: quæ aperiat, marrubium, absynthium, pistacia, radix petroselinii: quæ concoquat & leniat, passulæ, ficus, vinum granatorum dulcium, vinum dulce: quæ abstergeat, mel, saccharum: quæ roboret, eupatorium, schœnuanthum, absynthium, rosa, spica: quæ præseruet à putredine, cinamomum, cassia lignea: quæ siccet, spodium: rasura cornu cerui, eboris, à

*Electuarium  
de vino A-  
rabum.*

proprietate cōuenit, velut rhabarbarum, quod inde vitam hepatis appellant, spica, lupinum iecur cochlearum carnes & limacum, atque inde distillatæ aquæ, passulæ, quas tota substātia familiares hepati etiam Galenus agnoscit. Tantū adstringūt, quantum opus est visceri, concoquunt, roborant, malignitatem corrigunt, nec facilè corrumpuntur, vino quoque magna vis tribuitur: roborat, coquit, putredinem prohibet, intemperiem frigidam & humidam hepatis emendat. Contra virulentam materiam cinamomum primas tenet: deinde cassia lignea, tum aromatum omne genus, nardus, iuncus odoratus, calamus aromaticus, myrrha, electrum, crocus, aspalathus. Ex eiusmodi materia in puluerē trita ad 3.2. electaria fiunt cum saccharo, vel melle quadruplo, quintuplo: alioqui in passulato melle incorporantur. Mel passulatum fit coctis prius passulis ad crassitudinē syrupi, coctis, inquam, in vino, adiecto saccharo. Exteriora verò sunt oleum rosaceum, aliquando adiecto chamæmelino, vbi calida intemperies est. Nam in calida intemperie abstinendum iis, quæ nimium refrigerant, & leuiter refrigerando laxanda cutis est, vt transpiret vapor. Licet quoque vti vngueto rosato, cerato santalino in rosaceo dissoluto, vel cum eodem pisto & admoto. Alioqui cerato refrigerante Galeni, subacto cum succo cichorij & tantillo aceti albi. In frigida oleū de absynthio, de spica, de maiorana, & quæ in frigidiorē ventriculo descripta sunt. Nam in hoc conuenit hepar cum ventriculo, quod vtrūque eget, iis, quæ adstringendo corroborant, nisi quod magis adstringendum in ventriculo è chamæpythi.

*Mellis passulati præparatio.*



# AD LIB. VIII. DE COMPO. MEDIC.

Medium fit medicamentum similiter ex radicibus graminis sileris. Ad quantitatem decocti opus est  $\frac{3}{10}$ . &  $\frac{3}{1}$ . sacchari. Duo sunt reliqui affectus, quorum meminit Galenus hoc libro, humiditas hepatis & scirrhus. Itaque immodica humiditas vires hepatis dissoluit, quomodo vincula & neruacea corpora nimio humore imbuta dissolui solent. Signa humidi hepatis & humidioris ex arte parua Gale. petenda.

*Hepatis minus adstringentia, quam ventriculo conueniunt.*

Curatur autem adstringentibus, & ea materia, quae prius in humidioris ventriculo descripta est. Hoc tamen differt hepar, quia minus adstringentia considerat. Humiditati aliquando frigiditas, aliquando caliditas coniuncta est. Itaque in frigidityte, aromata, plantas, & materiam, quae adstringendo corroboret & calefaciat, miscere oportet: quale, exempli gratia, fuerit cydoniatum cum speciebus. In frigidityte & humiditate plurimum conuenire scribit Gal. vinum: sed hoc sit tenue, odoriferum & natura calidum. Vteris fotu de absynthio, irino, de spica, & aliis, in frigidiore & humidioris ventriculo memoratis, eisdem oleis malaxatis. Emplastrum de meliloto, diachylum ireatum, mixto cydoniato cum speciebus, dabis in potu, dianison, diacuminum, diagalanga, diatrionpipereon. Institues assas carnes confixas caryophyllis, & omnino ea alimenta, quae siccent & calefaciant: caliditate vero iuncta fovebis oleo rosarum, de cydoniis, myrtillorum, aceto addito, santalis, spodio, succo earum herbarum, quae hepar refrigerant, senecionis, hepaticae, cichorij, intyborum & similium. Atque iisdem herbis pistis ex eisdem oleis, puluere rosarum, santalorum, spodij, addito, finges veluti cataplasmata. In potu conue-

niet electarium diarhodon Abbatis, rosæ, santalis & spodio additis. Videndum tamen, ut ne nimium refrigeremus. Nimium refrigeratibus læditur hepar. Cerato santalino plurimum utuntur, quod addita parte cydoniati sine speciebus melius fiet. Malaxabuntur cum oleis prædictis, paucò aceto albo addito. In omni humiditate hepatis & totius ventris vehementer laudatur cochlearum caro & limacum: sed si coniuncta est caliditas, frigidis condimentis & aceto temperatur. Contrà verò in frigidityte. Contrahit schirrum hepar propter venarum angustias. Schirrus tumor est durus, dolens: initio curabilis est: cuius materia humor crassus, viscidus, frigidus, à quo nisi curetur, periculum imminet hydro-pisis. Morbi regij fiunt, & longæ febres, & tabes corporis. Itaque summa diligentia curari debet, & quia durus, molliētibus eget: ratione materiæ crassæ, incidentibus: frigidæ, calefaciētibus: viscidæ, detergentibus. Itaque mixtio medicamentorum contra schirros hepatis molliat, incidat, tergeat, calfaciat, sitque tenuium partium. Verum ratione partis affectæ in mollientibus eligentur ea, quæ id moderatè faciunt, ne nimium mollientibus substantia visceris dissoluatur: ac rursus oportet propellere, quæ tenuium partium calfaciant, & incendant: à quibus tamen periculum est, ne parte schirri dissoluta reliquum lapidosum & incurabile relinquat. Propterea, ut dictum est, mollientia misceantur, foueantur schirrus ex oleis malacticis, deinde superponantur emplastra malactica de meliloto, ceratum æsypi, diachylum ireatum, & similia, aceto mixto, aromatis, ad ʒ. i. emplastri ʒ. 2. aut sesquidrachma:

tritorum aromatum misceri potest. Acetum additur vt penetret, vt incidat. Materiam scriptam inuenies cap. de malacticis, nisi quòd ea seruanda ratio malacticorum & incidentium, quæ perscripta est. Hoc enim habet peculiare schirrus hepatis. Veteres plurimùm utebantur caticis pinguibus, ol. irino, vel simili, inunctis & tepidis admotis in fotu. Hoc aduertendum, ne nimium frequens, nève longiùs adhibeatur. Nam inde periculum imminet relaxationis visceris. In potu eadem ratio seruanda est, vt scilicet, aliquid malacticum misceatur iis, quæ incidunt & tenuent. In malacticis esculentis efficacissimum est decoctum ficuum pinguium & similium, passularum, recentis quoque camæpytheos. In eiusmodi decoctis miscebuntur ea, quæ in morbo regio & hydropisi describentur. Consensus veterum & recentiorum, ammoniacum tum foris adhibitur, tum in catapotiis deuoratum plurimùm facere ad schirros & oppilationes viscerum. Itaque ex ammoniaco & pul. hieræ, cuius vis magna est calefaciendo, incidendo, pilulæ fingi possunt, non quæ tam purgent, quàm quæ schirro curando conueniunt: è terebinthina quoque & eodem puluere utilia catapotia formari. Alimenta, partim quæ molliant, partim quæ incidunt, tenuent & tergeant, propterea condimenta sicca erunt ex usu. Acetum passulatū misceatur, aut in quo diu insolato ficus, vux passæ, caryophyllum, cinamomum aliquoties commutata maduerint.

*De morbo Regio.*

**M**Orbum Regium vocant, quia lasciuiis, cantu, delitiis, mulsa, vita soluta curis, & vt ait Serenus,

tenus, Molliter hic quoniam celsa curetur in aula. Causæ sunt obstructio, inflammatio, intemperies hepatis, aliquando lienis, vesicæ fellis, pororum, per quos flaua bilis ad ieiunum descendit, aut per quos fæx sanguinis ab hepate ad lienem fertur. Oportet itaq; interrogare ægros qua parte vel dolorem, vel grauitatem, vel tensionem sentiant. Aliquando criticus est hic morbus, flaua bile è vasis diffusa in corpus: aliquando venena hunc morbum faciunt. Sed in inflammatione necessariò febris est, & alia accidentia, quæ se proferunt in inflammatione. Quæ est citra febrim & inflammationem, tensio est, & grauitas in dextro ferè hypochondrio, excrementa albicât, cineritia sunt, & argillofa: vrina specie crassa admodum, crocea, aut nigra, cum spuma eiusmodi coloris. Pulsus neque celer, neque languidus, crebrior tamen, minor, & durior. Galenus morbum Regium citra febrim cum grauitate in dextro hypochondrio hac ratione curat. Primum cibus & pharmacis aperiētibus obstructiones vtitur: deinde medicamentis purgantibus. Atque hîc meminisse oportet, in grauib; obstructionibus, quales sunt in morbo regio, periculosas esse validas purgationes, nisi prius medicamentis obstructa liberātibus vias aperuerint. Propterea Hippocrates, corpora cum quis purgare voluerit, oportet fluida facere. Intelliges medicamenta aperientia & purgantia aliquid effecisse, cum iam pro albicâtibus & cineritiis excrementis alui, cœrulea & admodum flaua deiciuntur, cumque vrinæ ad colorem naturalem propius accedunt. Aperiant oxalidis folia & radix gramen, asparagus, cichorium, eupatorium, apium

*Purgationes  
ra'entiores  
in obstructis  
periculosa.*

# AD LIB. VIII. DE COMPOS. MEDIC.

adanthum, herbæ capillares, calamentum, calamintha, ancusa, fœniculū, gētiana, iris, aristolochia, cinamomum & aromata, melanthium, securidaca, fumaria, chamæpythis, rosmarinus, serpillū, marrubium, asarum, anisum, hyssopus, petroselinum, absinthium, cappares, radix tamarisci, asparagi, rusci, capparis. Cōcoquantur hęc vel per se, vel cum aliis, vt inde fiat oxymel conditū cinamomo. Hinc quoque syrapi fiunt: quanquā plurimū vtuntur syrapi de endiuia, de cichorio, capill. veneris, de bizantiis, de duabus vel quinque radicibus. Vtuntur quoque vermibus terrenis, asellis, musco, qui in tegulis nascitur, & vocatis ardesiis, rasura eboris, cornu cerui, pudendo viueræ, vulgò de Furet. Sed vehementer laudāt, & iusta quidem ratione, ammoniacum, cui ad miraculum vsque vim inesse volunt liberandi obstructiones, vt certò euadant, quibus iam à morbo Regio imminet hydropisis. Teritur ammoniacum, datur in hydromelite, vel oxymelite. Soluitur oleis chamæmelino, amygdalarū amararum, de fraxino, & similibus, aut Alcumistarum arte oleū inde distillatur, quod illinitur, & bibitur.

Potiones plurimū probant à balneo, iubentque ægrum epoto medicamento decumbere in latus dolens. E materia quoque descripta fiunt puluisculi, qui cōditi aromate & saccharo exhibentur in potu, alioqui inde fiunt electaria, aut pars miscetur electario diarrhodo. Sunt & aquæ distillatæ, quæ conueniant, endiuia, cichorij, lupulorum, cuscutæ, fumarie, capillarium, acetosæ, terebinthinæ, graminis, raphani, apij fœniculi, lappæ, rubæ, rinctorū, tribuli, lybistici, rusci, asparagi & similiū.

In alimentis sæpè vtetur radicibus esculentis vt acetosæ, petroselinis, graminis, cichorio toto, cicerum decocto, capparibus, asparagis, lupulorum extremis, stipulis articaulis, quas vocant Luteriæ Cardes, vino tenui, quod vel aquis memoratis, vel decocto rosmarini dilui potest. Quod ad phlebotomiam attinet, vbi videbitur sanguis redundare, aut fuerit suppressa aliqua vacuatio, liberiùs detrahes sanguinem è basilica dextra, aut venis extremæ manus. Resistentes menses, aut hæmorrhoidas excitabit. Galenus vsu eiusmodi aperientium & pharmaco purgante sæpè vno die curauit ægros. Quòd si contumax videbatur malum, vtebatur validiùs tum aperientibus, tum purgantibus. Constat experientia decoctum ligni sancti multis profuisse. Color *Color fædus* fædus relictus frequenti balneo curatur, vbi iam *frequentib. balneo curadus.* causa interior sublata est. Galenus vtebatur dacrydio. Vtemur agarico, puluere hieræ diacolocynthidos, rhabarbari, mistis & diaphænico & diapruno: in intemperie, aut morbo regio, qui est à crisi, neque purgantibus, vacuantibus aut aperientibus vtendum est. Redeundum verò ad ea remedia, quæ descripta sunt in imbecillitate hepatis. Ab intemperie calida in crisi res est committenda naturæ, nisi quod balneis laxantibus & detergentibus cutem, humidiorè victu & diluente vtendum est. In primo genere quidem ab obstructione clysteres acres plurimùm possunt, qui, scilicet, naturam trahunt, vt iam non effundat bilem in corpus, sed ad intestina mittat. Aliquando est hîc redeundum contra schirrum hepatis. In venenis initio quidem vomitus, si eò vertit natura: si ad intestina,

AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.  
clystere acri. In habitum corporis, cucurbitulæ cum  
flamma & scarificatu. Danda autem per os, quæ  
contra genus veneni faciant.

*De Splenicis.*

**S**plenicos vocant, quibus lien induruit: addunt  
alii ab humore melancholico. Multa sunt in-  
dicia, quæ splenicos arguunt: grauitas & circum-  
scriptus tumor in sinistro hypochondrio, difficultas  
spiritus, sitis, siccitas oris, pedum & pudendorum  
inflatio, color malus, plumbeus, decubitus in sini-  
strum latus, grauis dolor ad iugulum sinistrum ten-  
dit, vbi grauior tumor. Quibusdam scitent pe-  
diculi, noctu sudor grauis, halitus fœtet, erumpit  
sanguis è naribus, & aliis partibus, gingiuarum & den-  
tes corrumpuntur magis parte sinistra, venæ ad  
lienem nigricant, scaldior cutis est, maximè ea par-  
te vlcera maligna, in cruribus cicatrices nigræ, aluus  
adstringitur. Horum aliqua, vel omnia splenicos  
ostendunt.

Imprimis leui pharmaco, vel clystere mollienda  
aluus, detrahendus sanguis, repetita bis vacuatione  
in duos dies (inquit Galen.) è basilica sinistra, satis  
amplo foramine: alioqui è vena medij digiti, vel  
minimi. Alij venam post aures diuidunt, voluntque  
plurimum prodesse, si eo sanguine, qui effluit, sta-  
tim illinatur regio lienis. Constat quoque raro qui-  
dem experimento venas apertas, quæ ad lienem  
turgent & nigricant, splenicis plurimum profuisse.  
Distinguendum quoque qua parte visceris tumor  
constiterit. Nam si superiori parte, pharmacis pur-  
gantibus per interualla vtendum erit: si inferiori,  
clysteribus acribus vti conueniet.

*Lienis tu-  
mor superiori  
parte consti-  
tens purgā-  
tia pharma-  
ca, inferiori,  
enemata po-  
stulat.*

Sed pharmaca & clysteres per interualla imperantur : quibus interuallis, medicamentis aperientibus, incidentibus, mollientibus vtendum erit, vt præparata materia meliùs sequatur. Itaque & ea, quæ priùs descripta in scirrho hepatis, & hæc peculiariter conuenient, & cortex radicis capparis, radix tamarisci, polypodium quernum, scolopendrium, & omnes capillares, rosmarinus, semen agni casti, endiuia, scariolæ, portulacæ, acetosæ, cuscutæ, semina frigida maiora & minora, cortex & radix salicis, fraxini, genestæ, flores hyperici, rosmarini. Abstinentum deinde iis, quæ nimium calfaciunt, nisi frigidis temperentur.

Ex omnibus in aqua coctis oxymel comparetur. Purgationes ex epithymo, cuscuta, foliis sennæ, polypodio, diasenna, catholico, agarico, diapruno, confectione hamech, electario Indo, syrupo de fumo terræ, in oxymelite, sero lactis: decocto scolopendrij, vt melancholicâ purges & pituitam. Laudatur aqua fabrorum consumendo scirrho, in qua ferrum fuerit sæpius extinctum: præterea aqua depurata, & bene colata, quæ collibus defluit in alueolos eorum, qui acuunt gladios & enses, lixiuium sarmentorum, oxymel, acetum scylliticum, syrupus acetosus, capillorum veneris, de duabus & quinque radicibus, de fumo terræ, de scolopendria, de pomis, de epithymo.

Diluuntur syrupi in oxymelite simplici, vel Galeni: in sero lactis, in aqua cuscutæ, acetosæ, borraginis, fumiterræ. Conuenit frequēs capparum vsus, asparagorum, extremitatum lupuli conditarum, florum genestæ & violarum, cardorum: sunt autem



AD LIB. VIII. DE COMPOS. MEDIC.  
cardi, caules cynaræ, qui per hyemem eduntur. A  
proprietas conueniunt lien bouis, asini syluestris,  
vespertilio decolatus & siccatus, splen asini dome-  
stici, pulli egurini cremantur in testa, puluis drach-  
mæ pondere, potionibus, quæ conueniant, insper-  
gatur. Laudant poculum & fraxini ligno. Quod au-  
tem ad topica remedia attinet, ea arte fient in mol-  
liendo & resoluendo scirrhum, quam inuenies ca-  
pite de Malacticis. Peculiariter conuenit ammo-  
niacum dissolutum aceto, deinde pistum cum oleo  
de capparibus, vel liliorum, quo quidem ammo-  
niaco eo modo vtendum, qui dictus est in scirrho  
hepatis.

Vteris similiter emplastro de meliloto, dialthæas,  
æsyphi cerato, diachylo descriptione Philagrij. So-  
let conspergi puluis ceterach, corticis radicis cappa-  
ris, limaturæ chalybis leniter remollito scirrho. Ve-  
niendum ad vsum aceti descriptum capite de ma-  
lacticis, ad vehementem dolorem splenis, tumo-  
rem, punctionem, duritiem. Mirabilis puluis dia-  
capparum ℥. corticis radicis capparidis ℥. 1. feminis  
acetosæ ℥. 6. corticis radicis tamarisci ℥. 3. terantur  
in puluerem. Datur media nocte, & inter pastus  
cum oxymelite. Oportet ægrum in sinistrum la-  
tus decumbere, quemadmodum in aliis potioni-  
bus spleniticis, tres horas à medicamento sumpto  
ieiunare. Conueniunt & trochisci de eupatorio, &  
de capparibus. Quod si videbitur rugitus quidam  
& flatus, intermiscendum quæ flatus discutiunt,  
piper, cuminum, ruta, daucus, anisum, apium, ca-  
ruum, petroselinum, lybisticum, galanga, & alia id  
genus.

*De colicis remediis.*

**Q**Uæ hîc scribuntur vel anodyna sunt vel ad dolores colicos à frigore & flatibus referuntur. In narcoticis plurimus est vsus Philonij, quod antea descriptum est capite de sputo sanguinis. Vtîmur quoque pilulis de cynoglossa, quæ contra omnes istiusmodi morbos valere dicuntur. Ad hæc floccis suspensis de filo, & immixtis recto intestino, glandibus seu suppositoriis. In phlegmatica materia vtendum incidentibus, detergentibus, & calfacientibus, qualia descripta sunt in frigidiore ventriculo & hepate. Plurimum laudatur quod sequitur parabile. ℞. piperis grana 3. salis 1. trita dētur cum vino in iure veteris galli. Allia coquuntur, & adiecto pipere sorbetur ius. Sunt qui vel capum, vel pîpionem, vel alaudas, nucleis alijs infarciant, & ita iubeant edendas aues. Alexandrinus tres bulbos alijs vespere sumptos flatibus discutere, & phlegma deducere scribit. Sunt qui plurimum tribuant vino maluaticio diluto aqua maioranæ aut nepithæ, additis 3. 2. castorei. Alij lauri baccas nouem aut vndecim terunt, & cum vini tenuis & odoriferi 3. 4. 8. facto experimento propinant. Item folia raphani cum septem granis piperis decoquunt, & inde melicratum parant, quod mirabiliter facit nephriticis, colicis, & quibus vrinales viæ obstructæ sunt. Ol. ruta. nardino, laurino, de cado, raphanino, napino, de piperibus, lanas inculcant, & calidas admouent ventri: alioqui in eisdem ol. quartā partem galbani dissoluunt, adduntq; aliquid ciuetæ & croci, & ita illinunt. In flatuosa eadem remedia conueniunt, & affixæ cucurbitulæ vmbilico. In calida, & biliosa,

# AD LIB. VIII. DE COMPO. MEDIC.

inedia , quæ alios colicos iuuat , vehementer lædit , vbi narcoticis potissimum vtendum est , clysteribus mollibus ex radice althææ & foliis , malua , violaria , mucaginibus seminis lini , althææ , psyllij , cydoniorum , adiectis capitibus papaueris , vitel. oui , violato , vnguento rosato . Aliquando clyster iniicitur ex hordeato liquidiore , adiecto syrupo violato , de papauere , nenuphare . In horum colico dolore cataplasma conuenit Alexandrini . ℞ . farinæ lini & hordei , vel fabar. ana M. 2. coquantur in ol. chamæmel. fiat cataplasma . Alioqui .

℞ . ol. chamæmelini & ros. ana ℥ . i . ceræ ℥ . β . fiat ceratum . Muccaginis seminis lini ℥ . i . cum farina fabarum subacta ex vitellis oui fiat cataplasma . Sunt qui experimento laudant hanc portionem . Seminis viol. ꝑ . 4 . dantur ex vino diluto . Physica remedia sunt coralli triti cochleare , dandum ieiunis per triduum cum vino : item stercus lupi cum aqua tepida , cornu cerui vstum , particula incisi vmbilici infantis nuper nati , aurea vel argentea armilla includitur & circumfertur , cingulum è corio lupi gestatum , masculi maribus , fœminæ fœminis , stragulæ quoque lectorum inde fiunt . Alij pellem gestant , aut eiusdem lupi stercus nucula includunt , suspendunt è collo , vt ad ventrem perueniat . Suspendunt autem ligula è corio ceruino aut filo texto ex ouilla lana , sed ouem volunt interfectam à lupo . Alij verò euasisse à lupo . Laudatur & anguillæ sanguis , & cristatum alaudæ genus , stercus gallinæ , quæ exerceatur & nutritur pabulo sicciore , tunica interna ventriculi erinacei : masculi quidem in viris : fœminæ in fœminis & mulieribus . Hæc quidem scripta à

Græcis & Arabibus trita in puluere aliis miscentur, quæ aperta qualitate iuuant, piperi, castoreo, & aliis id genus. Dantur ex melicrato.

*De Priapismo.*

**P**riapismus, qui & Satyriasis dicitur, affectio est, cum minusculum pudendum inuito tumet & inflatur: vel vt 6. de locis affectis, cum colis in longum & circuitum augetur, nullo desyderio veneris stimulante. Addit Galenus, oportere inflationem eiusmodi esse stabilem. Quibusdam enim supinè decumbentibus, aut aliter concalfactis renibus, inflatur colis, sed affectio non est permanens. Nomen ductum à Priapo deo hortorum, cuius colis ita fingeretur. Causa mali spiritus insinuatus fistuloso neruo, qui penem constituit. Addit quoque 6. de locis affectis amplas & patentes arterias, quæ ad pudendum perueniunt, concepto multo spiritu hoc symptoma efficere. Alijs locis Galenus generationem huius ita describit. Materiam facit humorem crassum & viscidum, qui à calore languido motu resoluitur in crassum spiritum: licet aliquando tam crassus, & viscidus humor sit, vt vel à calore naturali incrassum spiritum non resoluatur: initium huius mali præcedente palpitatione intelligitur. At vbi ab arteriis amplioribus malum est, nõ præcedit palpitatione. Sed vsu alimentorum acrium, longa abstinentia veneris assuetis, diutiùs præcinctis, tentigo frequēs mouetur, & hinc flatibus deorsum motis arteriæ ampliantur. Idem accidit acrimoniâ humorum, sed præcipuè iis, qui multum sanguinis & seminis colligunt, atque imaginationibus veneris indulgent. Sic iis, qui iam à pubertate veneri in-

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

dulgent, & sæpiùs imaginantur, frigidior colis esse solet: contrà verò robustis athleticis. Rarò aut nunquam coëuntibus, vel venerem imaginantibus rugosus & exiguus colis esse consuevit. De priapismo 14. Methodi, 6. de symptom. & morbis, 6. de locis affectis, & hoc libro. Initio sanguinem detrahes præsertim iuuenibus, quibus hoc malum familiarius. In humorum acrimonia purgabis. Utêris clysteribus, ad hæc frictionibus, inedia, balneis, vomitionibus, quas præfert Galenus purgationibus: ac breuiter eo genere vacuationis vteris, quod & morbo & naturæ ægri magis conuenire videatur. Iubebis ægrum defugere omninò imagines veneris, & quæ venerem excitant. Initio non oportet membra calfacere, sed leuiter refrigerare, primùm quidem cerato rosaceo in aqua soluto, vnguento rosato, cerato cõparato ex cera, oleo nenupharino & chamæmelino. Ex quo tum lumbis, tum pudêdis illini debent, & perinæo. Institues tenuantem victum citra caliditatem manifestam, & ea quæ incidunt materiam crassam, & viscidam detergent: quale est oxymel, & alia iam multis locis descripta: imperabisque ea, quæ à proprietate contra morbum faciunt, nympheam, eius semen vel radicem, semen viticis, id est, agni casti, & post aliorum vsum, rutham.

*De hæmorrhoidibus excitandis.*

**H**Æmorrhoidibus non est assuescendum, nisi ad curationem, vel cautionem grauioris mali, epilepsiæ, melancholiæ, incubi, quartanæ & morborum id genus. Si quando tamen excitandæ sunt, sanguifugis benè purgatis & electis facilè irritantur, exasperantibus medicamētis, vt folio ficulneo,

*Priapismi  
remedia.*

pumice, medicamentis acribus, cæpa rubra, præsertim pipere, nitroſis, ſale torrefacto, alumine: vel tergentibus & acribus, felle taurino, ſtaphiſagria, abſynthio, centauiio, ciclamino, athanaſia, matricaria & aliis id genus. Talia teruntur in puluerem, alia teruntur & exſiccantur, pulueres ſuccis permifcentur ad craſſitudinem iuſtam luti, aut melle concorporantur, & circulo ſedis illinuntur.

*De vitiis ſedis & pudendorum.*

**V**Lcera harum partium iifdem medicamentis ferè egent, ſed in ſede difficilis curatio: & quia vegetiore ſenſu prædita eſt, non fert, quæ vel auſteritate vel acrimonia exaſperant, quia humida & calida facilè putreſcit: deinde quia eo peruenientes venæ multæ ſunt, quæ illic deſinunt, fluxiones retinet, vnde humidiora vlcera, calloſa & fiſtuloſa ſiūt. Præter hæc naturalibus excrementis ſæpiùs eæ partes madefcunt, propterea que illita excrementa detergent, vnde omnino difficilis curatio. Commune eſt auxilium ſedis & pudendi vlceribus à medicamentis quæ ſiccant citra morſum. Ea materia iam deſcripta in ocularibus medicamentis, & quæ peculiariter conueniat, cap. de ſarcoticis & epuloticis. At in vlceribus malignis partim ad ea, quæ ſupradictis capitibus, decurrendum contra maligna, depaſcentia, & putrida vlcera, partim ad ea, quæ iam vſitata ſunt, ad ægyptiacum, puluerem mercurij, vnguentum de Vigo, miſta parte vel ægyptiaci, vel pulueris mercurij: ſimiliter ad aquas fortes, ad illitum quoque in ſine ſpinæ & inguinibus ex vnguentis mercurialibus.

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

*De iis, qui noctu permungunt stragulas.*

**A**B infirmitate musculi, qui vesicam claudit, mollitie neruorum, accidit pueris, vt noctu permungant stragulas. In quibus remedia sunt, partim quæ qualitate muscolum corroborant, partim quæ occulta proprietate morbum tollunt. Itaque & perinæum, & spinæ extremum, & radix colis decocto earum rerum, quæ corroborant, fouenda sunt. Deinde vnguentis & emplastris, quæ id efficiant, vtendum. Itaque decocto menthæ, rosarum, absynthij, calamynthæ, saluiæ, stæchados, lauendulæ, maioranæ, rosmarini, pulegij, polij, chamæmeli & similibus fouendæ partes. Decoquantur vino ex eadem materia, vino & ol. cocta ad vini consumptionem. Linimenta comparantur ex oleis: addita cera subquadrupla, mastiche, thure, suboctuplis, cerata fiunt. Iisdem oleis molliuntur emplastra de meliloto, diachylum, iride adiecta: & mollia in aluta prædictis locis affiguntur. Proprietate conueniunt eritij caro, cerebrum aquilæ, renes & testiculi leporis: quæ omnia edi possunt, vel vino incoqui, vt bibatur vinum. Ad hæc pulmo hædi, lingua anseris, guttur galli, vesica tauri, capræ, ouis exsiccata, tritaque in puluerem. Dantur ex vino dormituri. Probant & enulam, & calamintham, thus, ben, cyperum, coriandrum præparatum, myrrham, menthâ, galbanum, castoreum, seseli, lac ouillum & caprinum. Vulgare remedium est esus murium. Sunt & qui cinamomum, lignum aloës, spicam, saccharum rosatum, rosas, pulueribus à proprietate iuantibus permisceant.

*De præfocatione vteri.*

**P**Ræfocatio vteri grauiſſimum malum eſt & pe- *Vteri præfa-*  
 riculoſum, naſciturq; ferè tribus de cauſis, quæ *catio tribus*  
 in vnã coeunt, hoc eſt, vehementem refrigeratio- *ſuſcitatur ex*  
 nem totius corporis. Primaria cauſa ſuppreſſio *cauſis.*  
 menſium: altera ſuppreſſio ſeminis, iis præſertim,  
 quæ priùs omnino veneri indulgebant: tertia cauſa,  
 quum quæ antè concipiebant, iam non concipiunt.  
 De præfocatione vteri lege cap. 5. lib. 6. de locis affe-  
 ctis. Senſu motuque priuari ſolent & reſpiratione,  
 aut certè tam obſcura eſt reſpiratio, vt non appa-  
 reat: vox quoque deficit. In leuiore malo motus,  
 ſenſus ratio, vox, & reſpiratio ſeruantur. In paro-  
 xyſmo extremorum vincula & frictiones maximè  
 crurum, cucurbitulæ inguinibus affixæ, odorata v-  
 tero, grauitè olentia naribus admoventur, vt ca-  
 ſtoreum, galbanum, gagates lapis, bitumen, pix li-  
 quida, pili combuſti, cremati panniculi, cornua uſta,  
 plumæ crematæ, euphorbium, quo ferè vulgus vti-  
 tur, veteres ſoleæ calceorum crematæ, quas & po-  
 tui dare ſolent: frequenti experimento rutham, na-  
 ribus admovent, quam & Galenus probat, cæpam  
 & allium. Odorata verò, quæ vtero adhibentur, ci-  
 ueta, goſſipium moſchatum, ol. de ſpica, de coſto,  
 caryophyll. gallia moſchata, alipta moſchata. Hæc  
 in puluerem trita oleis dictis permifcentur, vt fiat  
 luti craſſitudo, & ita ſinui pudoris illinuntur. In ſup-  
 preſſis menſibus ſanguis detrahi poteſt. In potioni-  
 bus poſt paroxyſmum veteres probant agaricum  
 ex vino. Datur & terebinthina & pulvis hieræ dia-  
 colocynthidos. Laudantur ſemen & ſuccus planta-  
 ginis, ſemen agni caſti, rutha, radix nimphææ, in iis,



## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

quæ nimio semine abundant. Præterea vomitiones imperant, sternutationes, cucurbitulas inguinibus, coxis, ilibus, deinceps affixas cum multa flamma. Hypochondria fasciis ligant, & constringunt, globuli filii inculcati oleo anethino calido alternatim pectini apponuntur, propinant pulverem blattæ bizantiæ. Post alia quoque remedia dropaces & sinapismi extremæ spinæ appositi, balnea naturalia, frequens coitus.

### *Ad Rhagadas.*

**R**hagades vlcera sunt vteri & sedis diducta in fissuras. Sed alia humida & saniosa, alia callosa, quædam cancrofa sunt. Saniosa abluuntur sero lactis, mulsâ, deinde tetrapharmaco dissoluto in rosaceo illinuntur. Postea medicamentis consolidantibus, quæ parantur è lithargyro. Callosa egent mollientibus, æsypo, radice lilij, terebinthina, admista parte iridis florētis, alioqui vitellum oui assum cum lacte muliebri pistum appones. In suspitione cancri diapompholygo Nicolai mollito, liquido cerato, rosaceo illines. Quòd si callus est coniunctus, adicias aliquid mollientium, butyri, adipum, & mucaginum: vbi calor, vitellus oui permiscetur: vnguento quoque de cerusa, de plumbo, tuthia, & aliis, quæ contra canculos scripta sunt, vtêris.

### *De Nephriticis.*

**N**ephriticos propriè vocant, quibus calculus in renibus concreuit. Galenus hoc loco extendit nomen ad eos, quibus renes inflamman-  
tur, aut exulcerati sunt. Dicemus primùm de calculo: atque vt distingatur nephriticus dolor à colico, legēdus est liber de locis affectis, caput primum

& secundum sexti libri eiusdem operis. Sæpè enim fallit colicis dolor, ut putetur esse nephriticus, & contrà, propter connexionem communem renum & coli per peritonæum Itaque ex dictis locis distinguere oportet. Calculi signa & curationem, breuiter describit Hippocrates 6. Epidim. his verbis *In renem dolor grauis, cum cibo, hoc est stercore, repletur. Stercus enim resistens in cæco intestino & colo renes opprimit. Sequitur, vomuntque pituitam, exasperatis doloribus æruginosa pituita primùm euomitur, quæ in ventriculo generatur, & ad primos impetus educitur: deinde dolore commotis humoribus non solum æruginosa, sed & biliosa. Subdit Hippocrates, facilioreſque fiunt, subducta, scilicet parte materiæ, quæ ad dolentem locum confluebat. Sequitur, soluuntur, cum cibo vacuantur, hoc est, stercore, iam non oppressis renibus, ut priùs: arenulæ fuluæ subsident, sanguinolentum mingunt. Eiusmodi arenulæ ferè rufæ ac rubentes, certissimum signum faciunt calculi. Mingunt sanguinolentum, iam renum facultate retentrice imbecilliore, vel renibus exulceratis: femoribus, quod è directo est, stupor per consensum, non neuorum, ut quidam voluerunt, sed venæ cauæ, & propterea dolor stupidus. Subiicit curationem Hippocrates. *Quiescere non confert, sed exerceri, mediocriter, scilicet, ut materia, quæ calculum cogit, & concoquatur, & celerius vacuetur. Non repleri, repleto enim corpore cruditas ad dolentem locum confluit. Iuuenes elleboro purgare, nunc non helleboro, sed leuioribus medicamentis & clysteribus purgamus. Poplitis venam secare repleto corpore, basilicam priùs secamus, &**

*Calculi  
signa.*

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

maximè vbi magna imbecillitas renuſm eſt. *Cienti-*  
*bz urinam purgare,* non perpetuò, ſed iam benè pur-  
gato corpore, & vbi nulla inflammationis ſuſpicio  
eſt. *Attenuare craſſam, viſcidam, & coactam materiam*  
*emollire,* hoc eſt, mollia & laxa reddere tum renes,  
tum corpora, per quæ calculus deducatur foras : ſic  
enim laxatis viis & mollitis, faciliùs, & nulla vi, vel  
minore, exhibit calculus : atque in iis duobus tenuân-  
do materiam calculi, molliendo corpora, per quæ  
excludatur, non ſolùm efficies vt exeat calculus,  
ſed vt ne poſtea regeneretur. Hæc ex Hippocratis  
& Galeni ſententia, qui poſt Hippocratem molli-  
bus & anodynis clyſteribus leniunt dolores, &  
aluum ſubducunt. Phlebotomia ſimiliter & purga-  
tionibus vtuntur, nunc caſſia, catholico, rhabarba-  
ro interim addito : ſimiliter tenuantibus, inciden-  
tibus, detergentibus & mollientibus medicamentis  
vtuntur, balneis quoque vias molliūt, cucurbitulis  
detrahunt calculum, quas ilibus affigunt. Ad hæc  
omnia ſyrupis vtuntur, potionibus & pulueribus,  
qui tenuant, incidant, & molliant, in quibus pluri-  
mum conuenit ſyrupus comparatus ex floribus, fo-  
liis, ſeminibus & radicibus althææ, additis radicibus  
graminis, acetosæ, ſeminibus cucumeris, ſaccharo,  
& melle. Laudatur & cōſerua ex iisdem floribus &  
foliis comparata, oxymel, decoctū glycyrrhiæ, be-  
tonicæ, lupulorum, capparis, ſcolopendriæ, herba-  
rum capillarium, quibus fortiora ſunt, quæ paran-  
tur è ſcylla, iride, enula, ariſtolochia. A proprietate  
conueniant à  
*proprietate.* iuuât ſanguis draconis, lapis hæmatites, ol. de ſcor-  
pionibus, beſtiolæ, quæ in lapidariis fodinīs, quaſi  
verrucæ, lapidibus hærent, pellis leporis cremata,  
lepus,

lepus, vel decolatus, vel integer crematus, eiusdem  
 renes cremati, cinis vngulæ equi, testa cochleæ &  
 cancrorum, terreni vermes, aselli, auis quæ cauda  
 tremula dicitur, calculus, quem quis primum exclu-  
 sit, vrina capræ montanæ, lac excornis & nigræ ca-  
 præ, cicadæ aridæ, decoctum galli lassati. Hæc à  
 proprietate conueniunt. Qualitate verò manifesta, *Calculo quæ*  
 parietaria, valeriana, succus portulacæ siccatus, cu- *conferant ma-*  
 curbitæ semen, perforatæ, lini, cûcumeris, maluæ, *nif. sta quæ-*  
 fœnugræci, apiij, feseleos, radix damazonij, cyperi, *lit aie.*  
 asari, rusci, asparagi, capparis, tamarisci, cynosbati  
 fructus detracta interiori lanugine, fenellæ vocatæ,  
 gummi & nuclei ceraforum, persicorum, cortex  
 viridis corili, testa auellana, sarmenta vitis vsta, ex-  
 trincta in oxymelite, vt colatura bibatur, electrum  
 lapis spongiæ, saxifragium, & alia propè infinita.  
 Ex decocto aliorum paratur oxymel, hydromel,  
 sacchar, allia trita in puluerem. Addantur decoctis,  
 vel per se bibantur ex ol. de scorpionibus, & cuni-  
 culorum adipe: lumbi, perinæum, ilia, pubes illi-  
 nuntur: conueniunt aquæ chamæmeli, betonicae,  
 genistæ, parietariæ, fabaceorum, raphani, &  
 ex materia commemorata. Aqua & ole. è tere-  
 binthina, è ciceribus & bis malua. Et hæc quoque  
 pilulæ laudantur. ℞. lapidis Iudaici, lyncis, spōgiæ  
 ana. ʒ. i. nucleor. mespilorum ʒ. ss. tragacanthæ, gū-  
 mi ceraforum & persicorum tantundem. Teruntur  
 omnia & incorporantur in ʒ. i. terebinthinæ, pro  
 tribus dosibus. Conuenit & lithontribō vocatum,  
 & Iustinianū, alkekengi semina, baccæ lauri & iu-  
 niperi. Coguntur hæc cum glycyrrhizæ & radicis  
 enulæ decocto, ex melle vel saccharo propinantur.

## AD LIB. VIII. DE COMPOS. MEDIC.

*De inflammatione & exulceratione renum.*

**I**N inflammatione renum clysteribus potiùs, quàm medicamentis purgantibus vtendum. Parantur autem initiò ex remollientibus, scilicet, decoctione remollitiua: deinde etiam mistis lenientibus, vt chamæmelo & similibus. Olea sint violaceum, nenupharinum, papauerinum: postea quoque butyrum recens. Oportet autem modum clysteris esse ad quartaria tria, aut lb. i. Mollita aluo detrahendus sanguis è basilica, quæ inflammato reni respondeat, atque aliquando procedente malo, phlebotome iteranda est. Arabes iterant è cephalica, vel poplite. Cataplasmatibus primùm vtendum è decocto maluë, bismaluë, rosarum, violarië, in quo postea coquatur farina hordei ad crassitudinem: deinde cum ol. rosaceo, oui albumine & vitellis ouorum, tantillo aceto adiecto, fiat cataplasma. Procedente morbo puluis chamæmeli, farina lini & fœnugræci, puluis absynthij & alia, quæ leniunt, coquunt, discutiunt, miscere conuenit. Postea quoque cucurbitulæ affiguntur lumbis & ilibus cum scarificatu. Vtendum foris è vesica hidrelæo plena, quod hydrelæum ex decocto & ol. conueniëntibus paratum est: initio quidem iis, quæ circa initia conuenire dicta sunt: postea verò mutata, vt priùs, materia. Initiò abstinendum vino & mellitis, quales sunt syrapi, hydromel, oxymel, &c. Atque diureticis nutriemus iusculis è pullastro, lactuca, acetosa, portulaca, borragine & hordeatis. Bibet aquam hordei. Postea apparëtibus iam vrinis crassis & sedimenti boni, quæ priùs tenues, aquosæ vel rubentes apparuerint, diureticis vtemur: applicabi-

mus emplastrum de muscillaginibus , pistum ol. chamæmelino vel irino : postea quoque emplastro de meliloto. In exacerbationibus dolorum, incessionibus ex decocto bismalux, malux, violariæ, chamæmeli, anethi, meliloti, fœniculi: atque vrgentibus doloribus nimium & vigiliis decocto papaueris, cuius semen miscebitur hordeatis : philonio item & aliis potionibus narcoticis vtendum erit. Sed aliquando non coquitur, per vrinas scilicet, sed suppurat. Itaque signis apparentibus suppurationis, fotu, incessione, emplastris, cataplasmatibus, clysteribus vtemur ex materia suppurante institutis, quam scriptam inuenies capite de suppurantibus. Atque contingit aliquando suppurationem resistere, vbi acrius clysteribus irritare oportet, dandumque in potu hydromel comparatum ex decocto fœnugræci, parietariæ, althææ, semine cucumeris. Quod si dolor vrget, incessionibus vtendum ex materia mitigante, hordeatis, lacte vel emulsione amygdalarum. Iam eunte pure animaduertendum, quale pus sit. Nam si liuidum & grauitè olens, pauca spes est : alioqui benè sperandum, vtendumque syrupo de althæa, de iuiubis, lacte asinino, melle, diatragacantho frigido, diaireo simplici, alphenic, & similibus, vt vel dolor, vel necessitas vrget, lacte amygdalino cum multo saccharo, tum purioribus vrinis euntibus, lacte bubulo & ouillo potius, quàm aliis, vtendum est, atque aliquando asinino, equino, caprillo. Bubulo quidem vtendum est, sed adiecta quarta parte feri. Conueniunt quoque sorbitiones vsitatæ ex lacte & vitellis ouorum, atque omninò multus sit vsus lactis, nisi corrumpatur.

AD LIB. VIII. DE COMPOS. MEDIC  
 Vbi sanguis fluit, iis quæ sanguinem sistunt & ad-  
 stringunt, vtendum erit. Resistente alio pilulis ex  
 aloë, & rabarbar. terebinthina, cassia, cū multo dia-  
 tragacantho vtendum. Et quia dolores sæpe vrgerit,  
 semicupia, id est, incessiones, comparanda ex deco-  
 cto rerum, quæ leniant. Simili fotu & sacculis vti  
 oportet. Pulueres quoque, quos cordiales vocant,  
 alimenta boni succi omninò instituenda sunt, quia  
 animi deliquiis sæpe capiuntur, & plurimùm ema-  
 ciantur. Itaque ad animi deliquia, morbum & ma-  
 ciem plurimùm faciet decoctum ex passulis, adie-  
 ctis aliquot iuiubis, ficibus, glycyrrhiza, semine cu-  
 cumeris. Coquantur autem ad crassitudinem syru-  
 pi. Deinde misceatur diatragacanthum frigidum,  
 diaris simplex, tabulæ vtriùsque diamargariti,  
 de gemmis, lætitia Galeni, & similia: eoque vtatur  
 sæpius è cochleari. Quòd si vrgetur siti, optimum  
 hordeum coquatur ad putrilaginem: deinde emul-  
 sio aliquot tritarum amygdalarum, adiecta parte  
 eius aquæ, decocto misceatur. Condientur omnia  
 saccharo & diatragacantho frigido. Poterit vis au-  
 geri adiecto nodulo ex seminibus cucumeris, me-  
 dulla feminis cucurbitæ. In remissione mollibusfri-  
 ctionibus vtendum mollibus stragulis, & omninò  
 alimentis boni succi.

*De Arthritide.*

*Arthritidis  
 causa.*

**N**Omne Arthritidis podagram, chiragam  
 & morbum coxarium includimus. Nam ali-  
 quando hæreditaria. Ferè autem eius causæ in-  
 temperies, imbecillitas partium, & affluxus hu-

morum. Itaque in vacuando & roborando curationis summa posita est: ac præcedit quidem vacuatio totius corporis, in plenitudine per phlebotomiam: quæ in coxario morbo, primum in cubito: deinde in malleolo fieri debet. Arabes initio coxarij morbi phlebotomiam laudant, & interuallo annularis & parui digiti. In podagra & chiragra opposito membro è directo vena secanda est. In cacochymia purgationibus vtendum, vomitionibus, clysteribus, deinde etiam sudorificis & diureticis. In topicis, initio repellentibus vtendum. In coxario morbo abstinendum iis, & statim mitigantibus vtendum, quæ neque multum calfaciant, neque refrigerent. Repellunt ceratum rosaceum, nutritum solum rosaceo, vnguentum rosatum, ceratum de psyllio, & alia quæ scripta inuenies cap. de repellentibus: quemadmodum & quæ mitigant dolores, fofus, ol. cerata, acopa, myracopa, capite de dolore. Aliquando narcoticis vtimur, primum quidem leuioribus: deinde fortioribus eadem ratione, quæ eodem capite de dolore præscripta est. Celebratissimum epirhema Asclepiadis, quod illuc scriptum inuenies. Sed quia humor in iis morbis ferè crassus est & crudus, viscidus, paulatim mitigando, incidendo, attenuando, discutiendo, & in coxendice etiam attrahendo, malum euincendum est. Vacuato vniuerso corpore, præparata materia, plurimum confert commotus sudor, præsertim ex ea parte, ex qua malum est. Facile repleto vase mouebitur aqua calida & vino pleno, in quib. ea coxeris, quæ sudores moueant, discutiendi & roborandi vim habeant, chamæmelum, melilotum, anethum, ebulus, cha-



# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

mæpytis, hyssopus, saluia, rosmarinus, origanum, calaminta, absynthium, folia & bacca lauri & iuniperi, semen anisi & fœniculi. Materia cocta cum oleis anodynis & discutientibus contundi potest, & linteo composita, calidâque admoueri parti. Decoctum autem inclusum vase bene clauso & constricto orificio plantæ pedis, vbi in crure vel ischio dolor est, volæ manus, vbi in brachio, admoueri debet, donec inde commotus vapor attingat partem, & moueat sudorem. Detergendus sudor diligenter, & locus affectus lanis sordidis inculcatis ol. mitigante, resolvente, corroborante contegendus est. Vacuata materia, corroborare conuenit emplastro diachylo ireato, thure addito, mastiche, sanguine draconis, pistis & vnitis omnibus cum ol. anethino, laurino, de absynthio, & aliis id genus. In inueteratis, vbi iam dolor quietus est, saluia, sal, vino austero & ol. chamæmelino incoquenda sunt, fiat fortis expressio, seruetur ol. quo sæpè articulus infirmus affricetur. Multi longa abstinentia vini curati sunt. Sunt, qui plurimum probant decoctum baccarum iuniperi, glycyrrhizæ, vocatarum fenellarum, radicis enulæ & ebuli. Decoctum guaiaci incidendo, mouendo sudores, atque ita vacuando conferre potest. Pellis lanina benè macerata & comparata cum materia adstringente, galla, alumine, & aliis, quæ coriariis vsitata sunt, gestata, plurimum facit ad præcautionem. Græci & Arabes plurimum tribuunt hermodactylis, ac varias pilulas inde cōficiunt mistis seminibus anisi, fœniculi, zinzibere. Apud Nicolaum maiores sunt in frigida causa: minores, in causa calida. Utendum erit descriptionibus adiectis

*Arthritici  
multi vini  
abstinentia  
curati.*

iis, quæ conuenire videantur, vt agarico, maioribus, rhabarbaro, minoribus. Contingit curatione malè instituta tophos concrefcere in articulis: quib' cōueniunt, quæ incidunt, tenuant, molliunt. Emplastrū de Vigo, de meliloto, de muscillaginibus, mista parte cerati œsypi descriptione Philagrij, galbano pingui & aliis, quæ scripta sunt cap. de malaëticis, de vitiis ossium, de pyroticis. Sciendum tamen eiusmodi tophos aliquando ita induruisse, vt nullis remediis cedant: aliquando quoq; figuram membri commutare in ὀρθόκυλον καὶ ἀσχυλον: quorum affectuum remedia inuenias capite de vitiis ossium & neruorum. Sciēdum quoque, quod scripsit Hippocrates, dolores eiusmodi sæpe protrahi ad diem 40. vt nihil sit mirum aliquando, adhibitis conuenientibus remediis, tardius curari.

FINIS.





IACOBI HOLLERII  
STEMPANI, MEDICI

PARISIENSIS CELE-

berrimi de Materia

Chirurgica.

LIBER I.

P R Æ F A T I O.

**D**E materia remediorum, quæ ad Chirurgum pertinent, plurima quidem Hippocrates, Galenus, & ante hunc Anazarbæus Dioscorides memoriæ tradiderunt. Quædam posteritas addidit non fraudanda laude: sua enim veterum, sua posterorum gloria est. Atque iniquum decreti genus est, quod omnem fructum laudis & gloriæ huius disciplinæ vni Græciæ detulit, ut Arabum ac posteritatis studia perpetuis tenebris opprimantur. Illaudato solo laudatæ fruges sæpenumerò proveniunt: Vixerunt Græci in media luce literarum. Ex-  
titerunt Arabes, & inde ductæ familiæ, iam desertis ac sepultis melioribus disciplinis, digna tamen luce, æternâque memoria nobis reliquerunt. E viuis fontibus Græcorum remedia primùm petēda sunt: sed

*Interpretes  
materiæ chi-  
rurgorum.*

*Laus aliqua  
Arabum &  
posterorum.*

*Vnde peten-  
da materia.*

ita, vt nec Arabū riuos, nec poſteritatis ingenia con-  
tēnamus. In his hauriēdū quod ſaluū & incolume:  
repudiādū, quicquid fecerit cœnū, & diſciplinæ ve-  
terū malè cōuenerit. Atq; omninò hac parte perlu-  
ſtrāda nobis naturæ fertilitas, à qua omnis vbertas,  
& quaſi ſylua remediorum ducta primū eſt. Nuſ-  
quam natura magis luxuriat, nulla in re pariter, at-  
que his chirurgiæ opibus ambitioſa eſt, in quibus  
tam prolixè numen ſuum explicat, vt *περίβοια* illa  
nō tam Epicurea, quod quidā ait, quàm *χρῆστος*  
fuiſſe videatur. Plurima quidem ad voluptatem &  
delicias hominis: omnia verò ad ſalutem eius &  
conſeruationem chirurgus comparauit. Nam quæ-  
cunque tota rerum facie expoſita, quæcunque ca-  
uernis terræ ac viſceribus latent, quicquid eſt aqua-  
rum, ſtirpium, animalium, terra, ignis, maria, chirurgus  
inferuiunt. In facie rerum & excrementis, in ca-  
rie, in rebus minimis, obſoletis, ac propè nullis, re-  
media condita ſunt. In re vna multiplex natura va-  
rio genere remediorum fœta eſt. In apicula quam  
variè luſit, quàm multas diuitias chirurgus condidit,  
mella, ceram, metyn, ſandarachā, fauos, propolim,  
quicquid denique locuples illa alueorū reſpublica  
continet. Quin & apes ipſas ad auxilia tranſtulit.  
Et in homine multa ſunt, quæ proſunt homini, vt  
quocunque animum aduertat, quocunque oculos  
coniicias, remediorū turba ſeſe offerat. In quo ſum-  
mopere probanda eſt maiorum diligentia, multò-  
que magis imitanda ſtudia, qui in ea vaſtitate re-  
rum nihil intentatū, nihil inexpertum reliquerunt:  
omnia elaborata & ſummo iure exiſtimata, literis  
conſignarunt, quibus iam perfrui datum eſt, alienis

*Naturæ fer-  
tilitas in ma-  
teria chirur-  
gorum.*

*Pronæ chi-  
rurgos potius  
quàm Epicu-  
rea.*

scilicet bonis. Primum ergo consuetudine, natura,  
 & maiorum historia, infinita nobis materia com-  
 parata est, quæ iam deserta ac suppressa iacet, quia ne-  
 glecta. Satis est capsula pauculis alueis distincta: sa-  
 tis pyxidicula: hic vno atque altero remedio con-  
 tentus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec ulli reue-  
 landa putat. Sed ego sic arbitror, optima esse reme-  
 dia, quæ plurimis cognita, plurimis probata sunt.  
 Alteri elementa sordent, & quicquid elementare est.  
 Hinc noua elementorum soboles, hinc æther & cœ-  
 lum ipsum ad remedia exprimenda sunt. Vernacu-  
 læ sunt nobis atque domesticæ naturæ opes, quibus  
 vulnera coniungas, repurges sordida, sinus impleas  
 & cicatrice tegas, cæteraque præstes omnia, quæ  
 chirurgi opere continentur. Verum suis cuique stu-  
 diis frui liceat. Nos ex immensa, omnibusque expo-  
 sita naturæ sylua & maiorum historia, quæ iam pu-  
 blica vel multorum fide constent, remedia transfe-  
 remus, exhibebimusque rudimentum operis, suis  
 quidem lineis descriptum, quod alius impleat, in-  
 formet, suis denique numeris absoluat. Nos speciē  
 aliquam & formam argumenti adumbrabimus, se-  
 quuti Cosinographos, qui totius orbis ambitum  
 angusta tabula contrahunt. Idem enim condonan-  
 dum nobis, cum non alios fines imperij, alios ma-  
 teriæ, de qua præsens instituta oratio, natura po-  
 fuerit. Genera quædam rerum & præcepta artis pri-  
 mum explicabimus, vtendi methodum, & leges  
 aliquas instituemus, ex quo censebitur patricularis  
 materia, & formulæ describentur, quas partim ars  
 ipsa reperit, partim optimorum medicorum vsus  
 atque experientia comprobauit. Antidotarium in-

*Taxantur  
nostris homi-  
nes.*

*Argumen-  
tum liori ex-  
plicatur.*

*Antidota-  
rium.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

scribunt hoc genus argumenti, nulla ratione aut  
 vſu veterum, ſed, vt fuit annorum licentia, è Græca  
 voce Latina analogia nomen detorſerunt. Multa  
 nobis, plurima aliis reliquimus, ne volumen, quod  
 quinque libris Ioannis Tagaultij, & hoc de mate-  
 ria chirurgica commétario cogendum erat, in ma-  
 iorem molem accreſceret : deinde non plus operæ  
 hac in re licuit collocare nobis, quàm à quotidia-  
 nis ſtudiis, ſtatâque interpretandi cura relictum  
 fuit, idque breuiori tempore, quàm hoc inſtitutum  
 noſtrum breue quidem, ſed varium, expoſtulet.  
 Ideoque dignum venia, ſi contracto ambitu ver-  
 borum, preſſâque periodo, quædam deſcribentur:  
 & in tam numeroſa medelarum turba potior eſt  
 verborum moderatio, breuibûſque ſententiis res  
 premenda eſt. Ad hæc ponimus idoneos eſſe huic  
 doctrinæ, qui iam intinſi fuerint præceptis artis,  
 quam Ioannes Tagaultius ſingulari ingenio atque  
 incredibili ſtudio informauit. In qua genera mor-  
 borum diuiſa ſint, circumſcriptæ formæ, deſignata  
 indicia, notata præſagia, inſtitutæ leges, ſcriptæ me-  
 delæ plurimæ : in qua quæcunq; collabebantur in  
 diſciplina vetere, conſtituta, quæ vitium fecerant,  
 reformata : tota denique ars, quaſi rediuiuo lapide  
 inſtaurata eſt. Vnicam hanc partem operis inter-  
 ceptus negotiis in nos tranſtulit, quam ideò recepi-  
 mus, ne & publica ratio deſeri à nobis, & officium  
 neceſſitudinis repudiari videretur. Multa igitur è  
 Græcis, quædam ex aliis tranſtulimus. Quæ à Gui-  
 done, eiûſque notæ ſcriptoribus rudiùs tradita  
 ſunt, paulò puriùs reddere contendimus, etiamſi  
 intelligamus vitia corporum nō curari eloquentia.

*Læus operis  
 Ioannis Ta-  
 gaultii.*

Sed nec barbarismo depelli possunt. Probamus quidem omnem orationem, modò sententiis rerum, quasi suo succo & sanguine condita sit. Melior tamen hæc, si neque neglecta, neque ambitiosa, sed mediocriter culta est. Adde quòd barbarissimus ille multas sæpe tenebras rebus attulit, & optima quæque sordescunt plurimis, quæ sordidis, nec ita puris vocibus describuntur. In damnandis quibusdam rebus, authores Græcos adhibui: in remediis ea selegi, quæ præceptis artis congruerent magis, quæque ut res præsto sunt, facilius comparentur. Atque hæc præfati, ad institutum opus veniamus.

*De repellentibus.*

CAP. I.

**A** Πονηρικὰ Græci vocant, quibus & initiis *Utilitas*  
fluxionum, & post initia utendum est, quan- *repell.*  
diu videlicet humor affluit: hinc enim phlegmones ortus atque incrementa, hinc vomica, maligna ulcera, febrium, dolorumque causas, alia denique permulta vitia corporum declinamus. Ideoque principiis obsta. Sed vacuandum prius corpus *Vacuatio.*  
est, si quidem postulat casus, ac ferè postulat: quia in plethora & cacochymia, rheumatismi plurimum commouentur, quanquàm etiam in mediocri vitio humorum & copia, ubi phlebotomo vel pharmaco natura leuanda est. Idem remedium sæpe *Modus.*  
prius innouandum, si quidem metus est, ne cum incaluerit morâ, affecta inde pars nimium recalescat. *Repellentia*  
Vis quoque remedij vitio conferenda. Leuius enim *cur sepius*  
pharmacum ut lactuca, in graui ardore frustra est: *innouanda.*  
fortius, qualis est succus è pomo Mandragoræ, liuore inficit, indurat scirrhum, & aliquando ita



*Repellentia  
vt cōuenien-  
ter adhibeā-  
tur quæ ad  
consilium ad-  
hibenda.*

*Conuersæ re-  
pellentium  
natura.*

*De repellen-  
tibus Græ-  
corum senten-  
tia.*

*Frigidorum  
medicaminū  
alia natura  
aquea Et  
mollī, alia ter-  
rea & dura.*

reprimat, vt in viscera fluxionis impetus rapiatur. Ad consilium adhibenda hæc omnia, natura, situs, figura, sensus, robur partium, humoris copia, qualitas, corpus, viæ prætereà per quas is illabatur. Neq; perpetuò satis est infirmo loco repellens auxilium adhiberi: aliquando enim superius collocandum: vt veluti præmissa manus vias intercipiat, nequid transfluat, vbi venarum ductus atque cōiugia animaduertenda. Cæterum reprimentium natura admodum controuersa est. Arabibus repellunt quæ influxum prohibent, refrenāt, crassant, illinunt, oppilant, quæ denique robur partium confirmant. In Græcorum libris astringētium materia cum repellentibus ferè cōmiscetur. Apud Latinos Cor. Cels. scripta reliquit, quæ simul repellant atque refrigerent, & rursus quæ sine frigore repellāt. Aurelianus in Chronicis alia scribit vnà astringere atque reprimere, alia astringere quæ non reprimāt. Sed vtriūque, vt aliquot locis Arabum, in censenda materia non sine vitio est oratio. Iustissima Græcorum sententia, eaque nobis explicāda est Repellit perpetuò quod frigidum est: frigidum aliud aqueum natura molli ac soluta, aliud terrenum crassiore materia, quod quia astringit & magis contrahit partes, efficacius reprimat: aut certè solum id efficit, si quidem ab actionis vehementia repellentibus nomen inditum est. Ac certè in rheumatibus præstātissima medicamenta sunt, quæ cum quadam astrictione vehementer siccant, vt non mordeant: qualia terrena sunt. Quanquàm & alterum genus, quod aqueum est, vtcunque reprimat, & ex æquo frigidum vel terreno frigidius est, ac refrigerio magis conuenit. Ve-

rùm præterquàm quòd humor frigore reperi-  
 tur, si quidem accessit constringendi vis, quod iam *Cautio in a-*  
 coit, loco exstringitur, magis etiam si tenue est : & *stringenti-*  
*bus.*  
 si quid reliquum sit, sæpenuerò resiccatur : con-  
 firmatur pars, vt sine pharmacorum ope quod po-  
 steà influat, possit retundere. Verùm hac parte pro-  
 uidendum, ne quid nimis, ne cutis grauius contra-  
 hatur, crassescat humor, dolor exasperetur, fluxio  
 increascat: grauius denique incendium irritetur. At-  
 que vt initio quidem te iuuisse putes, reliquum ta-  
 men & scirrholes & contumax persistit, quod in-  
 posterum ægerimè discutias. Ac grauior metus, si  
 quid viscerum infirmius est. Excipit enim celeriter  
 quicquid retunditur: vbi omnia firma sunt, in ma-  
 gnas venas & viscera circa periculū aliquid refluat.  
 Videndum quoque ne vltra modum contrahas in  
 materiæ copia, crassitie, vitio, molli vigeróque sensu  
 corpore, dolore graui pariter & calore. Vbi laxan-  
 da potius via est, vt diffluat calor, ac dolor tempe-  
 retur: qui, vbi cruciat vehementius, ad laxantia & a-  
 nodyna omninò confugiendum est. Adstringenti  
 simul atque repellenti auxilio vis efficacior est, si  
 quid tenuium partium vel natura insitum, vel arte  
 cōmixtum est: modò non mordeat. Iusto enim ca-  
 lore temperari potest, multò magis, si (quòd ferè  
 fit) ab infirmitate fluxio, à frigore infirmitas orta  
 est. Pestiferæ materiæ non occurrimus, vbi in su- *Vbi non re-*  
 perficiem diuertit: sed potius illicimus, atque rapi- *pellendum.*  
 mus vi maiore, si tardius mota resistit. Neque dissi-  
 milis ratio est in criticis apostematibus, coxariis, lue  
 venerea: vbi non repellenda in corpus, sed foras po-  
 tius materia trahenda est. Iam verò quæ illinunt, *Oppillantia,*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

oppilant, offarciunt, alias quidem dolorem leniunt, alias acrimoniam hebetant, viásque intercipiūt. Ex quibus si vis, reprimant: ac reuera nonnunquam reprimunt, oleum rosaceum, omphacinum, myrtinū, oui candidum, aliáque id genus. At gummi genera, resina, gluten, farina pistrinalis, gyrus tritici, hydre-læo, oxelæo, Rhodino, repellente succo, austero vino dissoluto, non tam spōte sua, quàm aduentitia vi reprimunt. Adstringunt calida, folium, casia, cinnamomum, spica, aloë, crocus, cyperus, calamus aromaticus, myrrha, absynthium, marrubium, polium, saluia, centaurium, vina quidem austera, & aromata plurima. Reliqua verò tum austera, tum acerbiora in proximum ordinem referemus. Leniter repellunt aqua, vinū, lactuca, intyba, polygonum trifoliū, auricula muris, lenticula palustris, psylliū, liquor oui, vmbilicus veneris, semperuiū, portulaca. In summa, quæcunque frigida aqueo elemēto soluta sunt. Omphacium adstringendo efficax: Solanum ambigit. Hoc potētior rubus est immaturo fructu & floribus: mollioribus autem foliis & asparagus plurimum aquæ continet, ideóque leuius contrahit. Adstringunt vitium folia, & capreoli, plantago, sorborum, cornorū, mespilorum, pirastorū, cydoniorū, myrtorum, spinorum fructus & folia, rhodonia, rosarum capita, obelisci: deinde, sed minùs, semina, flores, & folia: oxyacantha mediocriter, malicorum magis, cytinus, balauſtia, rhus, acacia, bolus Armena, terra sigillata, quercus, cupressi folia, germina, & nuces. Vehementer refrigerant pomi mandragoræ, hyoscyami & papaueris succus: quæ reliquis interdum temperari possunt, vbi acrior inflammatio est;

*Quæ calida  
adstringunt.*

*Materia re-  
pellentium.  
Aquea.*

*Omphaciū  
Rubus.*

*Quæ rebe-  
menter refri-  
gerant.*

sed priùs auferenda,quàm inde partes liuorem ducant. Spongia è frigida expressa partim contrahit, fluxum inhibet, dissipátque in viciniam,quod iam coit. Eodem modo lana succida & splenia austero vino insuccata. Magis etiam, si aqua priùs, galla & similia incoxerint. Vinum aquæ præferendû, & maximè austerrum, vbi reprimendum est. In deligationibus fasciæ vino insuccantur. Acetum repellit, adstringítque vehemèter. Caphura repellit, & tenuitate partium facilè permeat. Oculis populi veteribus Græcis calfacit. Repellit gypsum oxycrato maceratum. Olei rosacei frequens vsus est, sed sit ex oleo omphacino, in quo rosæ sæpiùs mutatę maduerint. Quod annum superat, exoletum est. Oleum omphacinû si defit, recenti oleo & vuæ acerbæ succo vnà coctis, dum succus omninò exhalauerit, fingito, & ad ignem saligno ramo, vel simili assiduè cõmoueto. Oleum verò nec sit cõditum sale, nec ætate rancidum: in myrtino, melino, lentiscino, & similibus eadē vitia fugienda sunt, vetustas, rancor, salugo. Mastichinum, nardinû, constinum, adstringendo roborant, & calfaciunt. Vitiosum oleû, cùm integrû defit, tandiu eluatur, dum virus exuat. Eluatur aqua vel simplici, vel rosacea. Descriptæ materiæ oleum vim cõbiber, si vel materia ipsa, vel succus eius oleo incoquatur. Plátaginem, gratia exempli, oleo recenti & pari aqua aut vino coques dum solum oleum reliquum sit. In ardore nimio periculosus olei vsus est, quia calore incenditur & frigit. Expressis succis meliùs vtimur in lana succida, panniculis, ac spleniis. Portulaca, sèperuiuû, vmbilicus Veneris, ægrè succum reddunt: nisi in mortario tri-

*Aqua.  
Vinum.*

*Acetum.*

*Rosaceum,  
Rõ in oleis.*

*Olea saluti-  
tia.*

*Cautio.*

*Succorum  
vsus.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

tis aliquid omphacij, velli liquoris similis affundatur.

*Cataplasmata & cerota qui fiant.* Cataplasmata fiunt farina in succo pista. Ex oleis cerota coëunt, & succis imbuuntur. Remedia neq; dura sint, neque graua, ne presso loco dolores augeant. Cerusa cichorii succo & aceto leniter diluitur.

*Ceratum è psyllio.* Ceratum à psyllio, psyllij vnc. quatuor in aquæ lib. quatuor macerentur percoquanturque, expresso succo, adde rosacei libram vnā: ceræ vnc. sex,

*Ceratum rosaceum.* contra articulorum rheumata. Non absimile ceratum rosaceum. Duplice vase cera cum oleo liquefit:

vbi refrixerint, conspersa aqua commouentur, aqua reiicitur, succus plantaginis affunditur, vt quantum fieri potest, absorbeant. Inflammationes, sinus vlcera genitaliū quæ serpunt, adiuuat. In teneris corporibus idem ceratum coriandri succum imbibat.

*E coriandro.* Coriandrum leniter adstringit, aliis refrigerat, Galeno calfacit: vt ere incrementis. Ceratum myrtinum

*Cerata magis adstringentia.* & melinum magis adstringunt. Herpetibus, & nimio humore flaccidis vlceribus conuenit, Myrtini lib. vna: ceræ vnc. duæ: pollinis myrtorum vnc. vna.

In ceratis vtendum cera, quam adolescentior apum populus confecerit: ceram virgineam apiarij nominant, eaque è nouis fauis separanda. Alioqui cera alba vtendum erit, non sponte quidem nata, sed factitia, qualis olim Tyrrhenica, quia suauior est, & acrimonia hoc genus remediorum carere debet ideoque præferenda cera è dulci ac diluto melle. In coagulato lacte & inde nascēte inflāmatione farina fabacea hydrelæo vel rhodino pista, māmīs imponitur. Idem opitulatur testibus inflāmmatis. Διαχαλνίτεως contra rheumata hoc modo. tēperari debet: Adipis suilli recēti, exemptis fibrīs: vnc. duæ:

olei recentis, lithargyri, ana vnc. tres: chalcitidis vnc. dimid. Conficiendum arte medicamentū: vsus tempore, vnc. duas medicamenti, olei rosacei vnc. tres colliquabis: vbi refrixerint, aqua frigida, succo portulacæ, psyllij, lactucæ, vino austero, vt res postulat, subiges, animaduertens quantum repellendum, adstringendum, refrigerandum, siccandum, leniendū, vt modò rhodini loco myrteum aut melinum misceas: oxycratum hunc vel illum succum aliis præferas. Quod sequitur, exprimit vlceribus quod influxit: & quod influat, repellit. Lithargyri vnc. quatuor olei dulcis vel rhodini vnc. quatuor: aquæ vnc. tres: lithargyrum die vno hydrelæo coquitur, difficilius enim illiquefcit: teneris corporib. & paruis vlcerib. cōuenit. Defensiuæ vocant è boli Armeniæ parte vna, terræ sigillatæ dimidio, rosacei triplo, aceti vel succi repellentis dimid. Liquidis reliqua infriata commiscentur, vel è bolo Armena liquore oui conleuata: deinde affuso succo è capreolis vitium, aut omphacij. Fasciæ ritè conuolutæ in repellentibus censerī possunt: quales in fracturis, & qui ab vlcere sursum adducuntur: vt adstricta parte, & ita ductis orbibus paulatim laxes. Similiter cum altero membro atrophia intabescēte, alterum deligamus. Vincula quoque superioribus partibus iniecta, quā videlicet materiæ cursus est. Aliquando etiam inferiores illaqueamus, vt cū è cruce exhalat virus quod viscera appetat, ex quo & epilepsiæ & syncopæ causa præciditur. Sed in vlceribus plurimū & fracturis, vias laqueo comprehendere oportet, ne si quid transfluat, dolor, phlegmone, putredo, syderatio, aliæque id genus concitentur.

*De lithar  
& hydrelæo.*

*Defensiuæ.*

*Deligatio.*

*Attrahentiū materia.*

*Attrahentiū vsus multiplex.*

**E**Λκτικὰ & ἐπισπαστικὰ Græcis appellata, vsu quidem repellentibus conferri possunt, sed natura plurimum dissident calida, tenui substantia, quæque vi quadam rapiant, quæ in alto corpore posita sunt. Ideoque viscera, internūmque corpus exonerant, foras translata materia: venena in cutim euocant. Criticos abscessus accelerant, desperatos pleuriticos & fortasse attonitos releuāt: inguinum tumores amplificant: quodque vel pestiferum, vel nimis vitiosum medio corpore conceptum est, aliò pertrahunt. Tabidas ac velut syderatas partes vitæ restituunt: perfrigeratas spiritu refouent: vitiosam faniem exhauriunt, quæ neruis & cuniculosis vlceribus latet: squammas ossium detrahunt, coxarios iuuant: hydropicos exugunt: paxillos, clauos, spinas, sagittas reuocant: multò magis, si locus vlceris periculo inciditur, nec patitur æger angustio rem plagam ferro ampliari. Quod in vomicis, strumis, panis, ægilope, oculis, auribus, reliquisque partib.

*Differentia attrahentiū.*

altiùs decedit, eliciunt. Multiplex ergo attrahentiū vsus, sed nihilominus varia materia est. Aliis ea vis à natura insita est: atq; in his modò manifesta qualitas elementaris: modò occulta quædā proprietas & naturæ familiaritas attrahit. Aliud genus hoc habet aduentitia qualitatū ex putredine cōtracta acrimonia. Calor Galeno omninò attrahit, sed quod attrahit, non protinus calidū est. Aphrodisæus aliud sensit. Attrahunt curcubitulæ, sanguisugæ, pyulcus, suctus, dolor, vincula, frictio, cauteria. In attrahentium vsu aliquādo quod fuerit attractum, corpore excludimus: sed hic modus est, ne cum vitio

partem frugi materiæ eripias. Nonnunquã tantum attrahimus, non etiam discutimus: vt quum in partem emortuam calor & spiritus attrahitur. Argenti spumam, ceram, resinam, picem, oleum, epispasticis veteres miscuerunt, vt & temperarēt, & magis emplasticum pharmacum efficerent. Quidam etiam adstringente materia obtundi voluerunt. In primo genere sunt dictamnus, propolis, ceram virgineam vertit Scribonius. Rudis est & crassa materia in apum officinis, nondum cera: odore graui, vt qua pro galbano veteres vterentur. Ea mellatione verna, separari potest fauorum pars quæ cellas obstitat. Sed iam exemptis fauis, posteaquam mella diffluxerunt, quicquid est in fauis, vnà confundunt, vt nihil syncerum haberi possit. Magna verò synceræ propoleos virtus est: spiritus crassos & vitiosam materiã ex alto elicit. Recēs per se satis est mollis & pinguis. Sic in puncto neruo agricolę Galenus vsus est: quę ætate induruit, oleo veteri molliiri debet. In mollioribus corporib. oleo illiquatur. In duris lacte multo tithymali: cū terebinthina satis attrahit.

*Quæ miscenda attrahentibus.*

*Particularis materia. Propolis quid sit scribonio.*

*Propoleos vsu punctum neruum curauit Gal.*

Thapsia recens utilis: bimula & verustior exolefcit. Cerato misceri solet: quæ quia, vt viscum, plurimum aquæ continet, quatuor & quinque horas insistere oportet. Radix arundinis cum melle. Sagapenum, galbanū, ammoniacum, opopanax, calx viua, cinis è facie vini vel aceti, quæ loco nitri est, struthion, aristolochia longa, quæ & spicula, & squammas extrahit, lepidium, sinapi, nasturtium, tithymallus, dracontium, pyrethrum, ranunculus, sales, tum qui edi possunt, tum ammoniaci. Quædam infriata affricatur, aut gummi & resinis concorpo-

*Thapsia & viscum.*

*Loco nitri sex cremata vini vel aceti.*



rantur. Lixiuum in subtili calidâque materia extil-  
latum: ex eadem cinis Anemonæ, calamintha, nar-  
cissi radix, cyclaminus. Sparthi quo vites alligant  
fructus, & è foliis succus. Acetum, sed hoc suspectum,  
vbi siccitas, dolor, inflâmatio, vulcus, adstrictio, &  
à neruis dolor est. Cantharides ex polenta & melle  
pistæ. Medullæ & adipēs ætate acrimoniam contra-  
hūt: vrsinus adeps, hyæninus, pardalinus, leoninus,  
& alij, sed hi maximè. In alopeciis & profluuiis ca-  
pillorum vitium discutiunt, attrahuntque quod ad  
capillitium vtile sit. Oleo & oleæ flore, tela sibi re-  
figere elephantos, testis est Ælianus. vetus sit oleum  
tenue & calidum. Sulphur infriatum melle, oleo, te-  
rebinthina, salua hominis, axungia. Idem in œno-  
stagnate feruefit dum enatet lentor quidâ (oleum  
appellant) quem cõcha excipere oportet aliquoties  
commutēda aqua, dum satis olei collectum sit, quo  
demersum corpore hydrargyron foras elici volue-  
runt statim illito à balneis. Euphorbiū recens acrius  
est: binum trimumque paulatim remittitur, quin-  
to & sexto anno exolefcit. Cerato tēperatur, quod  
vel decuplum vel duodecuplum oleum habeat, &  
tripulam ceram. Modus est vt tantum erubescat lo-  
cus, & pruriat, non vratur, nec vlcus contrahat, nisi  
& hoc etiam necesse sit. Cerato largiore dilui po-  
test quod est acrius, quod verò languidius pharma-  
cum, aucto euphorbio, cerato imminuto augeri de-  
bet. Eadem lex in reliquis eiusmodi seruanda est.  
Ardor affusa aqua, aceto (quod vim thapsiæ effica-  
cissimè diluit) cerusa è rhodostagnate lota extin-  
guitur. Succus Cyrenaicus medicus, opobalsamum  
& alia, quæ partim exoleta sunt, partim vsui esse

*Acetum vbi  
suspectum.*

*Medulla &  
adeps.*

*Oleum.  
Sulphur.*

*Euphorbiū.*

*Modus eu-  
phorbiū &  
similium.*

possunt, ex 3. de comp. pharmacorum  $\text{Ϟ}^1$  γένη, & aliis Græcorum libris repetenda. Aduentitio calore *Attrahentia aduēitio calore quæ.* trahunt, fermentum, stercus anserinum, gallinaceū, columbinum, arietinum, humanum, & quæcunque talia sunt. Scatebat quidam è grege mendicabulorum lue venerea, aliquot diebus vniuersum corpus equino fimo obruit, vt tantum esset quàm respiraret. *Lue venerea curatur mendicæ, vniuerso corpore equino fimo obruto.* Erat stercus stabularium, equino lotio sæpius perfusum, quodque iam computruerat. Effecit ille hac arte, vt totum virus exprimeret: addidit aliquoties enchryston ex axungia, larigna, & hydrargyro. Nec alia vitæ lex seruata est, quàm matica offerebat: atque his remediis curatus est. Fermentum oleo incoquitur: fundit, liquat, surculos trahit, pedes cōtufos sanat, mollit, discutit. Axungia veteri, larigna, terbinthina & resinis liquidis pistū efficacissimū est. Aliàs cum cepa cocta subigitur: coquit, trahit, discutit, aperit. Coagulū quod vetustius, eò efficacius. *Coagulum quo vetustius eo efficacius.* Ex echino animalium ( quæ πολύκοιλα ) lepore & vitulo marino colligitur. Lac est in lactētiū animalium vētriculo, vel omaso ita concoctū. Aristoteles ad alui profluvia vtile facit magis leporinū: equinū Diosc. Arabes & quidā è Græcis astringens frigidū, ac reprimens auxilium faciunt. Alij acrimoniā elementis, reliqua occultæ qualitati attribuūt. Hoc certò habet, q̃ dissipata cogit, & coacta dissoluit. Magnes ferrū attrahit: repellit Theamenes. Succinū illicit festucas ignorata vi. Cácer fluuiatilis tritus tela extrahit: lacertæ caput: rana summis partib, resectis. *Que qualitate occulta.* Cochlearum & limacum carnes, aliàs per se, aliàs *Cochlea.* cum suis volutis tritæ, ac mixto interdum coagulo, tela rapiunt, atque hydropicis aquam exugunt: non

prius soluere oportet, quā totus humor exudauerit.

*Ostrea viua*

Ostrea viua pestiferos bubones loco transferunt, & ad se trahunt. Scorpio tritus & impositus, quod

*Scorpio.*

infixit virus, retrahit. Oleum quod ex eo fit, idem efficit, & calculos educit illitum glandi, si in cole restiterint vel pubi, ac perineo, si superius inhæserint. Cucurbitula summavi rapit. Hirudines superficiem sugunt. Pus, vrinas, calculos, suctus elicit. ore

mundo, ac prius loto fit, qui exugit. Pyulcus, catheter iisdem vtilia sunt: vincula, frictio, phænigmus, dropax, sinapismus, ferrum candens, vel admotum, vel impressum, calore trahunt. Sed hoc violentum

remedium est. Verū quæ non sanant pharmaca, sanat ferrum: quæ nec ferrum, sanat ignis: quod Hippocratē in Aphorismis scripsisse volunt. Mixta remedia sunt theriaca. Pforicum dupla chalcite &

*Pforicum.*

lithargyro, aut æquis partibus cadmiæ & chalciteos: vel duabus chalciteos, & tribus cadmiæ: fortius est quod cadmiam, quā quod lithargyrum

recipit: minus acre locis metallicis. Ex acerrimo aceto trita & fictili clausa sepeliuntur fimo. Hac arte

*Quomodo tenuiora metallica excipiantur.*

macerata, triplo, duplōue cerato excipiuntur. Ceratum sesquialtera ratione dupla, tripla olei, ad ceram

cōficitur. Ea metallicorum cura pharmaca tenuiora fiunt, facilius penetrant, & inde trahunt. Oleum

*Olea comoda.*

fit verus, ricininum, sinapinum, sicyonium. Raphaninum, è terebinthina, larigna, strobilina, pinea, picea, abietina, arte chymica, si vis efficacius distillatū:

quæ resinæ etiam è profundo trahunt, sed in primis terebinthina, deinde strobilina: in quibus non

modò calor, sed tenuitas partium in attrahendo spectari debet. Formulæ sunt, ℥. cerati ℥. iiij. tere-

binthinæ

*Formula ex Gal. Orib. Aet.*

binthina. ℥. β. liquatis immisce puluisculi eupho-  
bij. ℥. iij. interioris fermenti ℥. j. terebinthinae liqui-  
dæ ℥. j. concorporata plurimum valent in punctis  
neruis. Propoleos acris & pinguis (nam cera virgi-  
nea abutendum non est) ℥. ij. olei veteris ℥. iij. gal-  
bani ℥. β. coëant ad ignem. ℥. picis liquidæ, picis  
aridæ, propoleos, partes æquales: lithargyri, ce-  
russæ, salis, ana ℥. x. seorsum tusa, & cum olei quant.  
suff. in mortatio pista, ad ignem diu versentur, pau-  
latimque decoquantur. Lithargyri, cerussæ, nitri,  
ceræ Colophonæ, ammoniaci, ana vnc. vna: olei  
veteris vnc. sex: reliqua vnciis sex lixiuij ficulnei,  
dum non inquinent, concoquuntur. Deinde cera  
Colophonia, ammoniacum, deinceps quidem ac  
paulatim adiiciantur.

*Punctis ner-  
uis mistio  
utilis.*

Nucleorum è dactylis crematorum, nitri rubri,  
salis ammoniaci, vel gemmæ, aristolochiæ rotun-  
dæ, radicis cucumeris agrestis, terebinthinae ana ℥.  
20. piperis nigri & albi, ammoniaci, amomi, xylo-  
balsami, myrrhæ, resinæ siccæ, capitū lacertæ, lactei  
succī mori, ceræ, ana ℥. 10, adipis caprini ℥. 15. olei  
irini quod sufficit ad emplastrum. Vix parari potest,  
nisi ad vocata ἀντιβλαστώμενα confugias. Quod se-  
quitur admirandum ad strumas, ramicem guttu-  
ris, parotidas, omnem duritiem, & œdemata. Cu-  
pressi folia neque teneriora, neque duriora in pul-  
uerem comminues: tortiuo viño consperges, atque  
ita volutabis, dum in fēcis corpus coëant. Inde stru-  
ma vel ramex inducitur, tertio primū die soluitur  
medicamentum: contractum locum inuenies, qui  
digitis exprimi debet. Rursus ad tres dies idē phar-  
macum applicabis, eodēque modo solves & ex-

*Relatum ad  
Androma-  
chum.*

*Necepsionis  
è cupressō.  
Admirandum  
ad strumas  
remedium.*

primes : septimo die, vel ad summum nono, strumē  
 velut miraculo abolebuntur. Exugit hoc saniem  
 per poros affectæ partis. Olei antiqui ℥. 22. ceræ  
 albæ ℥. 15. nitri vel salis torrefacti, aut fæcis crema-  
 tæ vini ℥. iij. tereb. ℥. 12. lixiuij querni, vel ficulnei  
 ℥. 18. cera cum oleo liquatur : terebinthina adici-  
 tur, refrigeratis nitrum conspergitur, lixiuium pau-  
 latim affunditur: omnia pistilo conuoluuntur. Plu-  
 rima ex tertio & sexto de compositione pharmaco-  
 rum κατὰ γένη, & 13. Aet. repetenda. De sinapifino,  
 dropace, phœnygmo, & aliis alio loco. Addūt Apo-  
 stolicon Nicolai, Oxycroceum, & alia.

*De resoluētibus.*

*CAP. 3.*

**I**ncrementis rheumatum discutiens materia cum  
 repellente misceri debet. Inclinate vitio dia-  
 phoretica pura sint, & horum vnicum fortasse ge-  
 nus est : sed clarior doctrina fuerit, si duplici dif-  
 ferentia separemus : vt alia quidem leuiora, quæ  
 ἀραιωτικά : alia fortiora, quæ Ἀγροφητικά, si  
 vis, appelles. Aræotica mediæ naturæ vicina sunt  
 eo calore, quem humiditas temperet : ex quo mi-  
 nimè siccant, dolorem leniunt, relaxant cutem, spi-  
 ramenta corporis rarefaciunt, tenuitate partium in-  
 trò penetrant, quòdque inhæsit parti, liquefaciunt.  
 Hinc ex humore vapor fit, qui subinde expirat,  
 dum omninò locus detumeat. Et adhuc quidem  
 satisfaciunt, vbi tumor in superficiem exponitur.  
 Locûsque mollis est ac rarus, materia verò calida,  
 humida, & tenuis est. Quod si in alto corpore hu-  
 mor deponitur : si idem frigidus, crassus, glutino-  
 sus, si dura, densâque cutis : si verò longitudo quædâ  
 est flexus & anfractus, iam vi maiore opus est, vi-

*Consilia in  
 usu resol-  
 uentium.*

dendūque non quale in præsentia, sed quale futurum sit medicamentum, quum eò peruenierit. Ex quo nec acribus quidem parcendum erit. Etenim pars exterior perferet, quæ ægra, dolensque tolerare non potest. Maiora verò remedia in diaphoreticis numerentur, iam vicina epispasticis: quāquā vtræque virtus euocandi atque digerēdi plurimis rebus insita est: sed vt in vnoquōque vis altera superat, ita genera distincta sunt. In hepate, liene, vētriculo, atque id genus partibus, à relaxantibus metus est ne dissoluant vires: ideóq; adstringens materia, qualis est aromatum, misceri debet. Frigida crassaq; materia, incidente auxilio prius comparanda. Mollienda quoque vbi durior cōcreuit, ex quo à leuioribus ad maiora remedia gradus paulatim fiat, vt sine periculo discutias. Alioqui diffabit tenue lapidescet quod crassius est. Cum parte stupida, durius: cum ea quæ vegetiùs sentit, clementiùs agendum est: quāquā stupore partis abutendū non est, vt ea imperes, quæ exulcerent. Sic enim sensile corpus intabescet: contrahetur, non rarescet, cogetur materia, non liquecet: horror, dolor, fluxio, irritabitur: dehiscēt venæ omnia in deterius commutabūtur: multò magis si pharmaca crassiore constent materia, & siccant. In phlegmone quæ vetus est, videndum nunquid affluat: id ferè accidit tumoribus qui inueterascūt, vbi medela quæ reprimat, cōmiscenda est. Posteaquā verò subsedit tumor, ac nihil quod exhalet reliquū est, confirmanda pars, quæ longo vitio elanguit, multò magis si statis periodis, rheumatismo vexati solet. Aræotica sunt, chamæmelū, lini semen: in maioribus efficacissima, althæa: sequitur agrestis, domesti-

*Cautio.**Ab acrioribus quid cōtingat.**Particularis materia.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

cæ vis nimio humore elanguit. Aqua calida vtitur Hippocrates in fracturarû exolutione, quam vocat ὀπίλυσιν : vinum exiccat, reprimit, & digerit : lana sordida bene carminata inebriata vino, & inde pref-  
 fa: ceratum similiter, Butyrum digerit mollium cor-  
 porum parotidas, bubonas, oris phlegmonas, aliâ-  
 que innumera, vt per se satis esse possit. Oleum dul-  
 ce, calens, & in quo illa efferbuerint. Sicyonium è  
 foliis, fructu & radice cucumeris agrestis. Crinelæo  
 intinctum croco, omnes inflammationes discutit.  
 Oleum caryinon efficacius è rancidis Nux rancida  
 per se, vel cum melle trita efficacissimè suggillata ra-  
 pit, inuritur, aut candente ferro premitur, vt reddat  
 oleum, quod optimè discutiat. Omne oleum con-  
 calfactum igne, quale est lucernarû, vel ignito fer-  
 ro extortum, efficacius est. Oleum vetus, ricininum,  
 canabinum, anethinum, quod è rosinarino, maio-  
 rana, zambace, leucoio, hyssopo, aliisq; eiusmodi  
 œnelæo coctis, dum omninò expiret vinum. Rha-  
 phaninum, sinapinum, melanthinum, terebinthinû,  
 hypericinon, potenter digerunt. E radice bryoniæ,  
 & vocati sigilli Mariæ, cnico, grano gnidio, hydro-  
 picis & œdematis olea comparantur. E galbano,  
 hammoniaco, & similibus quæ molliant ac dige-  
 rant. E dauco, caro, cumino, ruta, vt flatus excutias,  
 cui galbaninum vtile est. Si quid incidendum, deter-  
 gendumve, aliquid aceti vel oxymelitis affundi po-  
 test: quo tempore absynthium, polium, cetaurium,  
 iris, aristolochia, gentiana, vrtica, hyssopus, & simi-  
 lia œnelæo incoquantur. Hîc vinum melius non  
 adstringens, giluum, tenue & odorum. In phymati-  
 bus & parotidibus duriorum corporum talia ex v-

*Olea.*

*Oleum lilio-  
rum cum cro-  
co.*

*Nux ranci-  
da.*

fu sunt. Brassica per se, vel cum axungia trita, induratas phlegmonas & vetera erysipelata discutit. Adipe & medullis recentibus laxando, veteribus discutiendo vtendum est. Mastiche, furunculis: Ammoniacum & similia chœradibus & articulorum topis conueniunt. Fermentū oleo pistum, & cum cocta capā mixtum, potenter coquit, mollit, ac digerit. Pellibus animalium recens detractis, in cōtulis verberumque plagis vti conuenit. Fœnugracum duris phlegmonis adhibendum. Acetū achoribus & œdematis vtile est. Agrippa concalfacto acetō pedes immergit, vnde intolerabili pedum cruciatu liberatus est. Oxycrato quoq; tepido & oxymeliti vis inest discutiēdi. Mel in diaphoreticis censetur, magis etiam quod rosmarino & similibus cōditum est. Butyrum mollit ac digerit tenellorū corporum parotidas, bubonas, oris phlegmonas, aliāque innumera, in quibus per se satis esse possit. Melius est initio in aqua rosacea lotum, & modico intinctum croco: conditum melle coquet, detergebit & digeret. Oleum dulce, calens, & in quo diaphoretica illa efferbuerint, spondylium, serpillum, pastinaca, pulegium, calamyntha, menta, & similia, quo genere olei vtēdum erit in crassiore materia, & vbi robur partium firmandum est. Sicyonium ē foliis, fructu, & radice cucumeris agrestis multum digerit, ac ferē loco veteris vsurpatur. Vix enim reperias vetus, quale olim tricenarium, quadragenarium & eo antiquius seruabatur. Crinelæon, id est, oleū liliaceum intinctū croco omnes inflammationes discutit. Efficacius ē nucibus rancidis, & in hoc genere efficacissimum, quod in lucernarū ellychniis cōcā-

*Agrippa acetō libera-*  
*tus.*

*Mel.*

*Butyrum.*

*Olea.*

*Sicyonium.*

*Oleū ē liliis.*  
*Carynon.*



luit, quo gangrēnas, ægilopas, carbunculos quidam perſanant. Nux rancida per ſe efficaciffimè ſugillata delet, leuiter exurit, flamma, aut cādenti ferro exprimitur, vt reddat oleum, quod efficaciffimè diſcutiat. Omne oleum concalſactum igne, quale eſt in ampullis lucernarum, vel ignito ferro extortum, efficacius eſt. Ex quo feruefacto nouo oleo dulci pro veteri vti licebit. E tritico & nuce quā moſchatam vocant, contra lichenas cādentibus laminis exſtrin- gitur. Ex aſſis ouis premente cochleario, in figulari ſartagine cōcalſacta igne, quæ plumbo vel vitro in- cruſtata ſit, contra impetigines, lentigines, & fœdas maculas oris. Alia quoque propè infinita, quorum cōficiendi ratio à Meſue & aliis deſcripta eſt. Oleū vetus, ricininū, canabinū, anethinū, quōdque eſt roſ- marino, maiorana, zambace, leucoio, hyſſopo aliſſi- que eiufmodi conficitur. A qua & oleo, vel hoc & vino materia incoquitur, dum omnino expiret hu- mor, & oleum reliquum ſit. Rhaphaninum, melan- thinum, ſinapinum, terebinthinū eſt reſinis preſſum potenter digerūt. Hypericinum mollius eſt. E radi- ce bryoniæ & vocato ſigillo mariæ, cnico, grano gnidio, hermodactylis, anacardiis, arida vini fæce, calce, hydropicis & œdematis. E galbano, ammo- niaco & ſimilibus quæ molliāt ſimul ac digerant, è dauco, caro, ruta, cumino, lauro, vt flatu diſcu- tias: cui rei & iuniperinum & galbanum vtile eſt. E ſambuco & ebulo iuuat hydropicos, œdemata, podagricos. Si quid incidendum atque detergen- dum, aliquid aceti vel oxymelitis affundi poteſt, qua in re abſynthiū, polium, centaurium, iris, enula, gentiana, ariſtolochia, vrtica, hyſſopus & ſimilia

*Nux ranci-  
da.*

*Oleum lucer-  
narium &  
extortum cā-  
denti ferro.*

*Oleum è tri-  
tico.*

*Ex ouis.*

*Olea alia  
magis dige-  
rentia.*

*Efficaciora  
prioribus.*

*Efficaciſſi-  
ma.*

*Vt mollias.  
Contra fla-  
tus*

*E ſambuco  
& ebulo.*

*Vbi inciden-  
dum & de-  
tergendum.*

œneleo incoquantur. Hic vinum melius, nō astringens, ætate vetus, colore giluum, tenue & odorum. In phymatibus, bubonibus, parotidibus duriorum corporum talia ex vſu ſunt. Ac bubonibus peculiariter è maiorana factū. Chamæpytis in oleo cocta mammarum duritias diſcutit, & articulorum vitia adiuuat. Cypero vtendum, vbi reſoluendum & leniter aſtringendum, cui rei olea croco intingantur: idque curandum magis in viſcerum cauſis, & cum iam propè nullæ reliquæ ſunt tumoris, & hic totus ferè euauit. Braſſica per ſe vel cum axungia trita induratis phlegmonis & eryſipalatibus idonea eſt. Affectas partes oleo fouebis: materiã tuſam, in cataplaſmate foto prius loco faſciis alligabis. Adipe & medullis recentib. quidẽ laxando, veterib. diſcutiẽdo vtendũ erit. Sed de his alio loco. Maſtiche furūculis, ammoniacũ & ſimilia chœradib. & articulorum tophis conueniunt. Muſſa prodeſt, in qua hyſſopus, thymus, origanũ & ſimilia coxerint. Fermentum oleo piſtum, & cum cepa cocta tuſum potẽter coquit, mollit ac digerit. Pellibus animalium recẽs detractis in contuſis, præcipitatis, verberũmq; plagis vti conuenit. Fœnugræcum oleo coctum duris inflammationib. adhibendum. Caricæ acres incoctæ muſſæ idem præſtare poſſunt. Pinguibus autẽ, vt coquas, lenias, & leniter digeras, vtendũ eſt. Mirum eſt quod affirmât. Coluber fluuiatilis funiculo à cauda præligatus ſuſpenditur, ſubiecto vaſe aqua pleno, in quod dehifcat, ore aliquot poſt horis vel diebus lapidẽ eruſtat, qui exceptus vaſe quod ſubiacet, totã aquam ebibat. Alligatur lapis hydropicorum ventri, atq; in totũ exhausta aqua liberat. Fo-

*Vinũ quale.**E maiorana.  
E chamæpyti.**Braſſica.**Adips &  
medulla.**Maſtiche,  
ammoniacum, &c.**Muſſa.  
E fermento  
& cepa.**Pelles animalium recentis detractæ.**Caricæ.**Mirum de lapide colubri.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

*Fomenta.* menta fiunt è mulla, aqua calida, vino, hydrelæo, oxymelite, in quibus, si vis, digerens pharmacû præcoxerit. *Sacculi.* Sacculi similiter è floribus anethi, meliloti, chamæmeli, rosmarini, calendulæ, maluæ, althææ, feminibus lini, fœnugræci, furfure, aliâque id genus materia infarciuntur. In fomentis ex eodem genere remediorum incalescūt, atque inde succum rapiūt, exprimuntur, & calidi adhibētur, vt leniāt, coquāt, laxent, discutiant. E materia sedulò contusa, laxior sacculus & leuior esse debet, ne quid grauitate lædant, & exasperent, idque multò maximè in molli parte, & vbi dolor est. Modus est quū inde quiescit dolor, & minuitur moles. Nimiū est, si quod resoluas, in pus vertitur: quod discutias, in scirrhum cogitur: si denique robur partis immoderato vsu dissoluitur. *Cerata.* Cerata simplicia oleo minùs digerunt, sed firmiùs hæret. E cera fulua, triplo vel quadruplo oleo digerente, x. vel xij. resinæ parte, & reliqua materia, quæ digerat, infinita cerata conficiēs. In superficiali vitio & materia tenui fons ex oleo satis esse potest: vbi cōtumacior humor est, & altiùs latet, nō modò cêratis crassioribus, sed malagmatis & emplastris vti oportebit. Idq; plurimū fit in querelis articulorum, vbi in ceratis, acopis, malagmatibus, emplastris seligenda olea quæ conueniant, qualia & antè multa notata sunt, & nunc dicētur. E resinosis feminibus & assulis abietis, pini, picæ, tenax & vnguinosum oleum elicitur. Conueniēte oleo & vino erinaceus coquitur dum putrescat, putrilago capta rariore linteo in ollam, quæ reliquum oleum habet, magno conatu exprimitur, & oleo mista articulis vitiis seruatur. Idem è vulpe, lutra, meli, cygno:

*Olea arthritica.*

*Oleum ex erinaceis.*

rum pullis, testudine, ranis, cato veteri & emascu-  
 to fieri potest. Quæ animalia digerenti materia, si  
 vis, infarcias, & ita coquas. Possunt etiam eo modo  
 facta & in veru fixa exassari. Excipitur pingue quod *Oleum è li-  
 gno sancto.*  
 diffluat. Lignum sanctum pingue ac succosum, non  
 obductum situ, aut cariosum, in fragmenta diuides,  
 vt inde hac arte exprimatur oleum, qua & ex aliorû  
 lignorû assulis ac rametis, omnique materia, in qua  
 sit pingue aliquid & vnguinosum, olea deducas.  
 Duas figulares ollas satis amplas, quæ interiore v- *Ars deducendi  
 olei è rebus  
 pinguibus.*  
 tre plumbo vel vitro inductæ sint, ita cõparabis, vt  
 vtræq; ore respondeât, & planis labris non promi-  
 nentibus, neque rotundis, exactè committi possint.  
 Atque cõueniet alterius vasis margines intrò proii-  
 ci, easq; rectas, nõ decliues, nõ elatas: his ergo mar-  
 ginibus craticula ænea, vel reticulû incumbat. Erit  
 hoc ad escariæ lancis imaginẽ conformatû, & con-  
 nexo gibbo deorsum spectabit, caua parte vertetur  
 sursum, extremo ambitu rotûdo, rectis labris vasis,  
 quæ intrò prominent, insidebit. Assulæ lignorum  
 ita struetur, vt craticulæ marginibus extrema parte  
 nixæ quasi parallelos fingât: ac rursus aliæ trãsuer-  
 sò, aliæ in decussim superdabuntur, & ita attolletur  
 materię moles. Alterum vas, quod est reliquum, ore  
 & labris subiecti vasis marginibus aprabitur: vtrû-  
 que argilla vel chymicorum luto compingetur. Ita  
 cõpositis fictilibus reticulo & assulis, totum vas in-  
 ferius terra defodi debet, vt extrema facie solo ad-  
 æquetur. Alioqui edificiû aliquod luto, calce, gypso  
 & tegulis extruendû in ambitu iusto pede latû area  
 æquabili, in cuius meditullio quasi labellû sit, quod  
 deorsum hiet, in quod vas inferius deponi possit:

# INSTIT. CHIRVRGIC.

atque tam cauum sit, quantū videlicet altitudo vasis est. In area ædificij mollis ignis è puro carbone paulatim succenditur, vnde superior olla, quæ tota extra fornacem eminet, cōcalescat, & ex eo materia quæ intus latet, exudabit liquor pinguis, qui per craticulæ meatus in vas subiectū diffluet, isque sedulo colligendus, & vsui seruandus est. At ignem paulatim augeri necesse est, qui vbi senescere videatur, noua iniecta pruna foueri debet. Qua ratione veteres *καπνιστὸν* suum exprimebāt. Ex lini semine oleū trusatili mola exprimitur, cū sarmētutio lixiuio subigitur, modicum terebinthinæ ad lentorē additur: mollit, lenit, digerit. Panis cibarius cōditus sale è ricinino pinfitur, sugillata delet. Cataplasmata è farina fabacea, hordeacea, è panico, milio, lupino, orobō, cicere, lolio, fœnugræco, lini semine: in putrescētibus & contusis ex oxymelite & lixiuio, in aliis ex oleo farinæ subiguntur. In putrescēti articulo cōtusq; neruo circa initia fabacea & hordeacea ex lixiuio: postea eruina ex eodē Galenus vsus est. Aliquādo etiam cōtusis simul & vulneratis neruis fabaceā oxymelite iunctā vsurpauit. In cataplasmatibus, quæ discutiāt aliquid misceri cōueuit, vt ne lēto offarciant, multo magis si quid pestilēs ac malignū, vt in bubonibus & carbunculis pestilentibus, ex quo Gal.

*Ex lini oleo  
& lixiuio.*

*Cataplasmata.*

*Farinæ.*

puriores panes in carbunculis reiicit. Orobi farina diluto oxycrato cocta, & in calido cataplasmate adhibita crassa viscidāq; secat & discutit. Eodē modo vsurpatur è lupinis, ciceribus & lolio: mitior est è fœnugræco & lino spermate. Miliū agrè infriatur, & cataplasmata fingit, atque hoc, vt panico, siccādo magis quàm digerēdo vtendū est: vtrūq; refrigerat,

& in oleo coctum discutiendo leniter facit. Cata-  
 plasmatis. miscetur pulvisculi è spica, vocata lauā-  
 dula, chamæmelo, meliloto & aliis. Modus ferè est,  
 vt farina ad pulvisculos dupla sit, quāquā & tripla  
 & quadrupla, æqualis etiā, vt corpus & viriū exigit:  
 Fauos mellis è vino friget cū farina loliacea vel si-  
 mili, butyro & terebinthina vel larigna subiges.  
 Bdellium cū melle teritur: calx cum veteri axungia:  
 laserpitiū cum sulphure, molliunt, terget, discutiūt. *Sales.*  
 In durioribus phlegmonis sales cōmiscetur. Astring-  
 unt marini & digerunt, sed vstura tenuiora fiunt,  
 & vim astringēdi deponunt. Cineribus ostreorum, *Cineres dia-*  
 buccinorū, crematis cochlearū canis & testulis pe- *phorctica.*  
 Etunculorū vtimur inueteratis in scirrhum vergen-  
 tibus inflammationib. & parotidibus: triplo butyro,  
 æsypo, adipe concorporatur, cera interdum addita,  
 aut in ceratis adhibentur: quale fuerit butyri, æsypi,  
 ceræ, cinerū ostreorum ana semuncia. Eodem mo-  
 do salibus, sulphure, pyrethro, cardamomo & aliis  
 id genus vti oportebit: vel caricis in marina coctis,  
 tusiſq;, ea commiscenda. Caprillum stercus ex aceto *Caprillum*  
 tusum inueteratas parotidas discutit. Sed his omni- *stercus.*  
 bus vtendū iam sedatis dolorib. & quieto fluxu, sa-  
 tis deniq; purgatis corporibus. Sulphur cū oleo ve- *Sulphur.*  
 teri, axungia, molli terebinthina, salua mistum, vel  
 in vrina & lixiuio maceratū venenatis morſibus cō-  
 uenit, terget, attrahit, discutit, nōnunquā aceto prius  
 conspergitur. Calx lota in recenti axungia tenellis  
 corporib. adhibetur. Lapis calaminaris & quęcūque  
 metallica acria sunt, vsta discutiūt, cruda mordicāt.  
 Sinapism<sup>9</sup> vulgaris discutit. Sapo soluitur oleo. Sed  
 acribus nō vtendū, siquid doloris & caloris reliquū  
 est. Ac tumoribus, qui in scirrhum abeunt, adhibetur.

# INSTIT. CHIRVRGIC.

Manè & vesperè commutantur, videndumque, vt ne nimiū calfaciant. Διὰ χαλκίτεως neque vino, neque astringente succo pistum subduplo oleo veteri, ricinino, raphanino diluitur, vt sit liquidi cerati corpus. Atq; aliquādo modum olei superare oportet, vt sint pharmaci ℥.x. olei xij. In teneris corporibus & lacunis vlcerū oleum paulò vincere melius est. In vigore & ante declinationē oleo dulci ætate medio dissoluitur: in declinatione vetus oleum idoneum est. In contumaci vitio & minus calente, olei chamæmeli ℥. 3. ceræ ℥. 3. adipis anatis & gallinæ ana ℥.1. chamæmeli & anethi ana ℥. 2. omnia lento igne cocta percolentur, vt fiat vnguentum. Al. Olei sicyonij ℥. 3. ceræ ℥. 2. In frigidiorē materia seminis fœniculi, anisi, anethi ana ℥. 2. farinæ lupinorum, farinarum fœnugræci & seminis lini ana ℥.1. coquuntur vino, contunduntur affuso oxelæo, & ita applicantur. Papaueris cornuti folia, propoli pingui, vel pice molli strumas, bubonas, & similia emolliunt atque discutunt. Loco propoleos, pice liquida vel arida, sed soluta oleo, vt discutiat, vti licebit. Aliud. Colophonie ℔.1. ceræ sesquilibrā, olei ℔.3. simul liquatis addito salis torrefacti subtilissimè triti ℥.6. vbi refrixerint, manibus cōuoluito, cylindros quas

*In contumaci vitio.*

*Aliud.  
In frigida materia.*

Græci vocant μαγδαλίας, nostri magdaleones, fingito: in vsu alutæ intendito, & adhibitum dolenti loco finito. Pus exugit emulgetque quasi miraculo: quod cum emplastro hæres deraferis, deintegro pharmacum induces: idque aliquoties repetendum. Medicamentum hoc durius dolor non sustinet. Idem præstat picis aridæ, ceræ nouæ ana lib.1. olei lib.2. blando igne fusa coniungantur. Al.

*Pus exugēs.*

Picis, ceræ nouæ, axungia suillæ, saponis nigri ana *Ad hydropis-*  
 ʒ. 2. liquata transcolato: hydropismos vacuat, & do- *mos & do-*  
 thienibus medetur. Al. quod vehementer discutit. *thienas.*  
 ʒ. galbani, castorei ana ʒ. 1. liquefiât in olei ricinini *Vehementer*  
 scsquilibra, expresso & colato pharmaco adde picis *discutiens.*  
 terebin. ana ʒ. 4. ceræ quod sufficit, vt fiat solidum  
 pharmacum. Hæc autem pertinacibus vitiis & in-  
 duratis phlegmonis imperanda sunt, in quibus est  
 quod molliat, coquat, trahat, discutiat. Inflamma- *Chalasticis*  
 tionum reliquiis si quidē nihil durum habeât, satis *quāto vien-*  
 sunt chalastica. Rhodiaceum Asclepiadis curans & *dum solus.*  
 discutiens mammas induratas. ʒ. lithargyri, ceræ *Asclepiadis*  
 amaræ. ana. lb. ʒ. ʒ. axungia benè purgatæ, cerusæ ana *mammæ &*  
 ʒ. 3. myrrhæ ʒ. 2. olei ʒ. 7. Lythargyrius oleo coqui- *sed conue-*  
 tur, axungia colliquatur, & cera, ex quo cerusa im- *nens reme-*  
 mittitur, sublatis igne myrrha inspergitur: translatis *dium.*  
 omnibus in mortarium vitellus oui affatus commi-  
 scetur, vsus tempore conueniente oleo diluitur. In  
 sedis vitiis rhodino vel myrtino dissoluendum est.  
 Plura. 6. & 7. de compositione medicamentorum  
 Ϟ γένν, & 15. Aët. Et quæ vehementer trahunt, dia-  
 phoretica redduntur cerato, dulci oleo, vel adipe, *Ratio vñdi.*  
 ac breuiter paregoricis temperata, & mediæ naturæ  
 medicamentis. Partem chalasticis fouebis, quæ re-  
 laxent, & spiracula rarefaciât, fundantque materiâ:  
 ex quo diaphoreticon induces, liquidum quidem  
 & molle initiis vbi dolor aliquis est: lenius etiam  
 & sistenti pharmaco mistum, atque hinc ad paulò  
 fortiora, nec tam liquida transeat. Postremò vt  
 mitescit dolor, & fluxio minor est, ita ad efficacissi-  
 ma, si fuerit opus, & emplastri forma compacta  
 paulatim veniatur.



*Malactica  
qua.*

**M**Αλακτικὰ sunt quæ modicè calida nulla vi  
siccandi vel humectandi manifesta indurata  
corpora emolliunt, quanquam vt omnia ferè mul-  
tiplici natura coierunt, in malacticis censentur plu-  
rima, quæ primo ordine calfaciant, secundo siccant  
ac tertio. Sed quà malactica sunt, humido calidò-  
que elemento temperari necesse est. Plurimus vsus  
est in tumoribus quos σκῆρρῳθῆεις medici appel-  
lant. Hi in musculorum finibus ferè concrefcunt:  
aliquando in mediis musculis, glandibus, visceri-  
bus, vlcerum labris: ex materia crassa, lenta & frigi-  
da, qualis est pituita, & melancholicus succus. Sed è  
melancholico succo omninò cancrofi sunt, & ma-  
lagmatis exasperantur. Inflammationes in scyrrhū  
cogi contingit, si materia crassa & lenta est, si adhi-  
bita pharmaca quæ nimium siccant & calfaciant,  
qualia sunt ἐπισπαστικὰ & ἐξίππωσικὰ. Hinc enim  
tenue exprimitur, reliquum occallescit. Sic enim  
tophi in articulis, & calculi in renibus lapidescunt.  
In tenui serosaque materia nō ita metuitur scirrhus,  
tota enim facilè exhalat: in crassa & viscida omni-  
no declinanda, quæ siccant, discutunt, astringunt,  
siquidem sola molliēdi cura est. Atque omnino tum  
phlegmonæ, tum erysipelata quæ cum duritie de-  
clinant, malacticis curanda sunt, quæ citra hanc la-  
xantibus remediis & diaphoreticis vacuentur, Ma-  
lacticis quod clementer digerat interim commif-  
cemus, sed quo iam tempore tumor durior cape-  
rit edomari: phlegmone & erysipelata in scirrhum  
degenerant refrigerante nimisque astringente ma-  
teria, sed à phlegmone scirrhus amplior est. In

*Vfus.  
Scyrrhi ge-  
nera.*

*Vnde inflā-  
matio in scir-  
rhum trāste.*

*Alia genera  
scyrrhi.*

vsu malagmatum certæ sunt leges. Primùm enim *Leges in vsu malagmatũ.*  
 cognoscendum, quantum pars ægra à sua symmetria recesserit, quantum seipsa siccior atque humidior euaserit, quantum denique vitiũ increuerit: ex quo æstimandæ remedium vites. Tum naturas partium distinguere oportet: postremò artificiosè colligendum qua ratione emollias, nunquid admisceas quod detergeat, incidat, discutiat. In quorũ omnium *Desperatus scirrhus.*  
 vsu modum & occasionem animaduertas. Desperatur scirrhus, qui sic occalluit, vt iam nõ sentiat, & inde glabrescat locus: desperari dico, quia nullo malagmate domari possit. Etenim rescindi ferro, & sepius exedi potest, nisi à subiectis neruis, venis arteriis metus est. Scirrhus cui sensus aliquis vel obscurus, vt magis minúsve induruit, ita lenius aut efficacius auxiliũ requirit. Mulieribus, pueris, eunuchis, vrbani hominibus, ociosam atque vmbatilem vitam degentibus lenior medela: nautis, messoribus, fossoribus, duris omninò & laboriosis corporibus fortiora malagmata conueniunt. In lenta & contumaci materia miscendum aliquid, quod incidat atque detergeat: id in chordis & tendonibus fieri consuevit. Tale est acetum mulsũ: aut si ab aceto metus est, melicratum, in quo hyssopum, thymum, pulegium aut calamintha præcoxerint. Est & hoc animaduertendum. Scirrhus quidam simplex, alius *Differentia scirrhũ.*  
 φλεγμονώδης, vt quædam inflammatio σκληρόδης est. Scirrhum malleicis & diaphoreticis excuties: phlegmonem lenies, concoques, & in halitum vacuabis. Vbi vtrunque coit, vt hoc vel illud superat, ita remedia temperabis. Malagmata in cerati crassioris formã & corpus compingantur, quæ inde *Consistentia malagmatũ.*

κηρατομαλάσματα appellant : quanquam aliquādo cerelæi, aut cerati liquidi, nonnunquam emplastri compage permiscuntur, vt videlicet molle ac tenerum, squalens, durumque corpus est, & vitium habet. Cataplasmata fiunt è farinis hydrelæo coctis. Quòd si hydrelæo lini semen, althææ radices & liliorum, ficus pingues, aliáque id genus prius incoxeris, deinde in expressâ mucagine farinas subegeris, magis emolliet. Cataplasmata ita consistere oportet, vt mollia quidem sint, sed non diffuant. Adduntur cataplasmatibus, oleum, resina, quæ quasi vinculo pharmacû retineant : adduntur pistæ herbæ & semina, quæ vim malagmatis inaugeant. Sed modus sit, ne inde durius euadat, aut contrà soluitur corpus cataplasmatibus. Integrum enim permanere, & compage iusta necesse est. In calore, phlegmone, parua duritie & natura molli paulò liquidius cõfingi potest, & rursus crassius, vbi omnia contraria sese offerûnt. Ac diutiùs insistere pharmaca vtile est, neq; vno die sepius absolueri oportet, nisi exaruisse videantur : ac ne exarescât celerius, oleo, adipe, mucagine ferè coniunguntur. Leniter emolliunt butyrum, æsypus & lana succida : hæc oleo inculcanda,

*Particula-  
rit materia.* amygdalino, lirino, chamæmelino, oleo, in quo semen lini, althææ, fœnugræci, in quo maluæ, althææ, cucumeris agrestis, & liliorum radix, tenella maluæ agrestis, & liliorû folia, vel viridis anethi cacumina præcoxerint : in quo aliquid illiquatum fuerit galbani, ammoniaci, bdellij. Molliunt & hæc, lentiscinum, terebint'inum, mastichinum : quæ tum peculiariter vsurpantur, quum præterea digerendum ac  
*Vide: modus.* leniter repellendum. Hyosciamino, violaceo, nenupharino

pharino locus est in ea inflammatione, quæ iam videatur indurescere, hæc ergo olea in lana sordida molliter apprimuntur, ex quo malaëticum impingitur. Omnia verò prius intepescât. Etenim frigida omnino vitanda sunt. Expressa oleorum materia & *Frigida vitanda.* cū adipe pista aut cataplasmatibus concorporata, malagma finges, ut liliorū radice cum adipe anserino mista. Olea quæ tenuitate partiū celerius permeant, ex emplastris mollientibus Chymicorum arte educuntur. In malagmatis censenda sunt vitellus oui, crocus, cera vnguifera, caricæ pingues. *Κηρέλαιον* è duplo oleo ut sit liquidissimum, æquali, ut sit medium. Iam crassum est, quod ceræ partes quatuor & olei tres continet: magis emolliet quod è cera pingui, dulci oleo, lirino vel simili tēperatum sit. Cera *In scirrhis hepatis & lienis.* alba recens, mollis, cum æquali pōdere buryri, resinæ liquidæ vel colophonæ pulchrè emollit. Caricæ pingues cū irino, lirino, capparino, tritæ scirrhis hepatis & lienis opitulantur. Id habet peculiariter scirrhus hepatis, quod leniter mollientia desiderat mistis aromatibus, quæ calefaciāt & tenuent. Sed hæc vincere oportet. Siræon è pinguibus caricis ad meliginem coctis, molliet, terget, digerit. Adeps & sebū *Siræon. Adeps & sebū.* utrunque coquit, laxat, & molliet quæ quia materia vnde generatur, genere animalium & loco ubi con- crescūt, natura deniq; (adeps enim mollior est) differunt: cum Aristotele distinguas licet, ut in natura molli, adipe: in dura, sebo potius utendū putes. Rursus quia minimū est quod dissidēt, misceri possunt. Utrunque genus natura & specie animalium, ratione *Ex quibus adipēs & sebū genera distinguas.* vitæ & pabulatione, sexu & ætate, deinde quia hæc recentia, illa vetusta: alia syncera, alia condita sale &

# INSTIT. CHIRVURGIC.

aromate vel externa imbuta qualitate, distinguendum est. Lenissimus suillus adeps (axungia vocant) in qua mirum est, & experimento constare veteres scripserunt, quod eâ genibus alligata redit in os sapor, vt etiam expui videatur. Ex quo fortasse non vnus hydrargyri qualitate, sed totius misturæ ex eo & axungia illitis in lue venerea os grauius exhalat, & salinâ madet. A suillo sunt vitulinus, hædinus, caprinus, bubulus, quib. si lubet, vulpinum & leporinum adiicies: atque hi leniunt magis & cōcoquunt. Efficacissimus est leoninus, cui proximi sed inusitati, hyæninus, pardalinus, deinde vrsinus: & hi duriora corpora molliunt. In medio sunt taurinus, hircinus, ceruinus, quibus ascribi possunt arietinus, equinus, asininus: caninus admodum efficax est. Taurinum sebum omnium domesticorum animalium pingua, siccando superat: tenuitate partium à leonino, pardalino, & hyænino superatur. In volatilium genere efficax anserinus adeps, anatinus, olorinus: siccior è gruibus & prædatoriis aibus suavis gallinaceus, calidior colubinus. Ex anguillis & fluuiatibus piscibus, lāguet: è marinis ferè siccior & calidior est. Humanus mediocriter habet ad omnia. Domesticorum animalium pingua humidiora sunt, vt suum quàm apro: è maribus sicciora & calidiora. Castrati mares fœminis respōdēt: ideoque veruecinus adeps arietino languidior est. E iuuenibus animalibus humidior est vnguedo, è senioribus siccior. Adipes oleo magis emolliūt: ætate calefaciūt magis, tenuiores fiūt, acrimoniam contrahunt. Purgatur adeps exemptis venis, quas fibras vocāt. Salsus vel cōditus aromatē siccior est. At cōstat pepticiis & malecticiis aduer-

*Tres ordines  
adipum.  
Pus.  
Efficacissimi  
adipes.  
Medij.*

*Taurinum  
sebum.*

*Volatiliū  
adipes.  
E piscibus.*

*Salsus adeps  
& quæ sic-  
cant.*

fari, quæ nimium siccant, quanquã Plinius conuenire scribit falfam axungia mollire magis. Id in fuillo adipe fortasse concedi potest, qui alioqui parum emolliat. Recens adeps si defit, & verus ad curã re-  
*e vetere adipe quomodo recens paratur.*  
 uocandus est, liquefieri prius oportet & purgari si-  
 bris mox frigida sæpius lauari, postremo etiã vino quã odoratissimo. Eo modo sæpius liquatur, cogitur, lauatur aqua & vino, dum omne virus exuat. Quod grauitè olet ferè odiosum est: ex quo odoratis aquis arte chymica illectis (*σαλάγματα* vocant) sæpius lauatur, aut ex odoro vino subigitur. Infumatur etiã iisdem aquis, quæ momentũ moschi, vel ambaris cõceperint. Medulla i sebalibus, in adiposissimis animalibus adipi responderet: viscera, chordas, tendines, musculos emollit: ex ossibus humidior, è spina siccior est. Prima laus ceruinæ quæ nullis malacticis inferior est. Vitulina sequitur, tum ouilla & caprina. Acrior taurina est, quàm vt emolliat. Atq; hæc leuiores sunt. Iam verò durioribus corporibus conueniunt: ammoniacũ, quod aceto liquari potest, leniter decoquendũ ne efferuescat, id si metuitur, ex aceto leuigatur in mortario: & reliquis in cacabo coctis permiscetur. Bdellium molle & pingue  
*Bdellium: Styra.*  
 salua hominis subigitur, mollit, coquit, modicè digerit. Styra idem efficit, verũ liquido, aut melliginoso vtendũ est. Nam neque styra aridus, qualis est, quam calamitẽ vocant, neque ammoniacũ, neque denique quicquã generis eiusdẽ malacticon est, vbi iam exuccũ inaruit, & discutiendo vsurpandum est. Galbanum præterquã quod mollit, coquit, discutit,  
*Galbanum.*  
 etiã septicon est, & dolorem lenit: purgatur sordibus hoc modo. Mundo linteo raroque cõuoluitur,

# INSTIT. CHIRVRGIC.

& ita feruidæ immergitur, vt pendeat quidem, ne fundum attingat. Nā per raritatē linteī colatur galbanū: fordes in linteō retinentur. Liquefit vino vel aceto, aliisque modis, & coctionē non sustinet. Efficacior opopanax. Ladanū mollit ac repellit. Propolis ammoniaco vicina est, & qua (vt antè dictum est) pro galbano veteres utebātur. Sint hæc omnia mollia & pingua, pro sua quæque natura: quæ si ætate inaruerint, nec ad magnum fuerint molliora, pingui oleo instaurare oportet. Malaëticis, quæ amplastica esse conuenit, resinæ cōiunguntur. Resinæ sint quæ acrimonia careāt, chia mastiche, larigna, picea, abietina, terebinthina. Pineæ nemiū siccant, strobilina acrior est, bitumē & pix aridiora sunt. In summa, quæ nemiū siccant, quæque acria sunt, reiicere oportet. Neque enim iuuare possunt, nisi aliis tēperantur. Pix mollis & bene pinguis, qualis olim Brutia, utilis est. Neque verò pix, neque resina molliēdo idonea est, nisi vel liquida, vel ita mollis, vt tracta faciliē sequatur visco similis vel ceræ, quæ vt paulò firmior sit, q̃ vt sequatur, pressa tamen digito cōcedit. Acrior & siccior repudianda est: quæ liquidior videatur cera, ceratis & magis corpulentis malaëticis colligatur. Durior pingui & oleo macerari debet. Butyrū, pingua, atq; omnino liquabilia, vesica suis includūtur: demergitur hæc aqua calida vase cōcepta, in quo coxerint quæ emolliēt. Sic illa paulatim eliquātur, & ascititiam vim transpirante halitu per vesicā combibunt. Succedit his miraculosum ex aceto remediū, quod nō temerè, sed summa ratione adhibendū est. Scirrhus malaëtico oleo fouetur, ex quo inducitur malagmate: hoc diebus aliquot per-

*Opopanax.  
Ladanum.  
Propolis.*

*Malagma-  
ta emplasti-  
ca sunt.  
Resina.*

*Pix.*

*Aceti vsus.*

mittendum loco, neque priùs reuellendum, quàm exuccum solutúmque videatur: hîc ergo detrahi potest. Quod cû feceris partim oleo, vt priùs, fouebis, malagma nouû & bene succosum impinges, quod priore paulò sit efficacius. Morâ igitur dierum aliquot interposita pharmachû reuelles, animaduertens, quantum emollierit, vt si lenius videatur, vim eius inaugeas, ex quo gradatim ad ea quæ acetû cõbiberint, peruenias. Quæ omnia posteaquâ profecisse animaduerteteris, & mollior tumor extiterit, pyritem lapidê molarem, aut silicê, vnde scintilla decutitur, candentê igne, acerrimo aceto merges. Exhalabit plurimus vapor, quo scirrhus aptè infumâdus est circûsepta parte, ne dissipetur fumus, sed totus in scirrhû coëat. Locû iam satis infumatû oleo tepido fouebis, & reuocata prima illa curandi via malagma applicabis. atque ita bidui vel etiâ tridui interiecta mora aceti vsum & igniariû lapidem reuocabis, vt sit aceti vicissitudo & remediorum quæ molliunt. Verûm, neque diutiùs, neque sæpiùs halitu aceti, pars vexanda est, ne in lapidem cõcrescat, & nervosum genus grauius laceffatur. Sed vt molliendo profeceris, ita acetû & effumantem lapidem repetes. In malacticis quoque vsus aliquis interpellari debet, primûm enim (gratia exépli) è pinguibus caricis, medullis, adipibus, cera & oleo exigua resina mista, malagma conficies, aut parygron vsurpabis. Tum vt res succedet, ad ammoniacû & similia veniendum, ac primûm quidê hæc citra acetû, deinde cum aceto lenioribus cõmisceris, quibus quû vno vel altero die fueris vsus, ad ea quæ leniora, quæque sine aceto fiunt, curam reuocabis: vt veluti circulo

*Infumatio  
ex pyrite  
& aceto.*



# INSTIT. CHIRVURGIC.

quodam & è re nata auxilia transmutètur. In musculis & liene tutior aceti cōsuetudo est : in chordis & tendonibus, neque diutius, neque frequentius vtendum erit, vbi scirrhi magna ex parte coalescūt.

*Remedia  
composita.*

*Ex ammoniac  
co splenicis.*

*Ex fermento  
hepaticis.*

Atque hæc de aceti vsu breuiter dicta sint. Ammoniacum aceto fusum manibus diducitur, vt sit luti crassitudo : tum ex irino, lirino, capparino pinsitur, terebinthinæ sextula coniungitur, puluerentur ora cumino trito, aniso, sale torrefacto : & in alutā explicata splenicis affiguntur. fermentū coquitur aceto, hæpati duro & lieni : potest oleo vel butyro cōdiri,

& terebinthina colligari. Fortius acetum est in quo thymum, hyssopum, pulegium, & similia tusa maderint. Lene malacticum est butyrum, cera, resina æqualiter mista. Eodē modo adeps cum cerato iunctus & resina. Caricę pingues in sapa coctæ, & vino dulci cum lirino tusa. Lini semen hydrelæo coquitur, & cum adipe infringitur. Althææ radix arida in pollinem resoluta, malagmatis inspergitur. Eadem radix qua parte pinguis & quasi medullacea est, eraditur, & resina colligatur. In cōficiendis malagmatis rudicula vtendum est è resinosis arboribus, nec

*Rudicula  
malactica.*

astringētibus, è caule maluaceo, ex assulistede. Alio qui maluæ folia extremæ spathæ alliganda, vt inde verses, volutes, ac deniq; cōficias malagmata. Licet etiā more nostro & exēplo veterū rarum linteum infarcire lini semine, foliis althææ alijsq; id genus, & extremo veruculo velut caput alligare, inde pharmacū circumagere : nodū, caput hoc nostri, veteres *προκυφαίτιον* appellarunt. Quòd si fuso butyro, adipe, oleo intingas, idque sæpius repetas, dum medicamentum in cacabo vel mortario conuoluitur,

μαλακτικώτερον hoc est magis emolliēs pharmacu relinques. Atque hoc semel quasi exemplū positū sit, vt in aliis pharmacis, spatha, veruculo, capite, asferculo, aliisque id genus instinmētis conuenienter vti possis. Parygron Heræ & veteribus laudatū re- πάρυγρον.  
 cens dolorem lenit, phlegmonas mitigat, paruis inflammationibus medetur, id quod lenioribus malagmatis omnibus cōmune est. Parua vlcera cicatrice claudit, si coctis prius metallicis comparetur: recens liquidum est, vnde nomen habet, ætate verò cōcrescit: recētis vsus in paruis inflāmationibus quæ doleāt: concreti & vetusti in phlegmone declinate non dolente quidē, sed iam durescente, quæ vt magis minúsve induruit, ita vel vetustius, vel minus vetustū parygron requirit, quanquām eò vsque occallisse contingit, vt ne vetustissimo quidem parygro iuari possit, tūmq̃ maioribus auxiliis certandum erit. Itaque vt mollias, parygro vtendū nō ita liquido, nisi fortasse in mollioribus naturis, neque concreto, nisi in callosis corporibus: omninò verò modice durū sit quod emolliat. Vetustius oleo, butyro, adipe dissolui potest. Est autem mistura hæc ℥. adipis suilli recentis & bene purgati ℥. 44. ceræ pinguis ℥. 24. cerusæ litharg. ana ℥. 6. liquabilibus confusis metallica trita colliguntur. Al. mediocriter emolliēs Perniones  
 callosas rimas calcaneorum & perniones adiuuans humans.  
 ℥. litharg. cerus. ana ℥. 3. succi seminis lini, olei ana ℥. 20. ceræ ℥. 8. adipis suilli ℥. 14. colophonie ℥. 18. Similiter priori comparetur διαλθαίων clauis, carbunculis, furunculis ℥. litharg. olei ana lb. 1. galbani lb. semiss. ceræ terebint. ana lb. 1. radicum althææ fasciculos 4. lithargyrus ex oleo diu teritur in mor-

# INSTIT. CHIRVURGIC.

rario: cera & terebinthina fusa cōmiscantur, galbanum purgatum & vt antè, fufum colatūque adiungitur, postremo radices tusæ ligneo pistillo incorporantur. Aliud *διαλθαίων*. ℥. radices altheæ & liliorum ana ℥. 2. coquantur in hydrelæo ad aquæ consumptionem, ex quo in olei expressi lib. 1. lithargyri lib. 1. coques, dum non inquinet, & adipis suilli lib. 1. commiscebis. In his omnibus vis efficacior est oleo & adipe veteribus: aucta & magis cocta lithargyro: vtrisque pingui & oleo recentibus mitior est. Media verò altero recenti, altero veteri. Mediocriter mollit. ℥. colophonix purissimæ ℥. 2. ceræ albæ ℥. 4. mastic. ℥. 1. olei quod sufficit. Al. terebinth. ceræ ana ℥. 9. galbani nitri ana ℥. 1. thuris pinguis sesquūcia, medullæ cerui ℥. 2. propolis pinguis sesquuncia, olei laurini, sepi vitulini ana ℥. 2. vel eo plus vehementer mollit & discutit. Violentū quod sequitur rusticis corporibus accommodatum, inueteratis nec iam dolentibus scirrhis, tētatisque prius lenioribus remediis adhibetur desperatis splenicis & parotiribus. *διακοπραιγίαρ* vocant. Caprillum sterqus aceto solves, vel vt ne tam acre sit, oxycrato: mitius etiam si dilutum pharmacum polentæ iunges, & effuso oleo cataplasma finges. Aliud. ℥. stercoreis caprilli ℥. 2. radices cucumeris agrestis, ficuum immaturarum ana ℥. 1. herbæ pedicularis, bdellij, farinæ fabarum, amygdalarum amararum ana ℥. 8. fæcis olei antiqui quod sit satis ad amplastrum: tussis omnibus medicamētum in mortario conficies. Est & hoc potentissimum. Subigitur caseus putris & vermiculosus è iure in quo suilla perna diutius coxerit. Arthriticis tophorum particulas sine ferro

detrahit & sanat. Eadem præstat quasi miraculo  
 coccum cnidum cum myrrha & aceto tritum. Sed  
 horum multa non tam mollire, quàm secare, & vi  
 discutere, videri possint. Celebre iam olim ac veluti  
 per manus traditum Menecratis emplastrum, quod  
 Democrates metro reddidit, & διαχυλῶν ex au-  
 thoris instituto appellauit, quod nomē leuiter mu-  
 tata voce ætas nostra retinet. Recentia vulnera in-  
 flammatione vindicat, vel (vt alij) νευρότρωτα ner-  
 uorum vulnera: sæpè enim νεότρωτα & νευρότρωτα  
 alterum pro altero in Galeni libris, vbi medicamē-  
 tum hoc describitur, supponi solet. Diuisa glutinat,  
 & quæ inflammātur curat: optimè pessis adhibetur,  
 diuturnis & recentibus vteri inflāmationibus: im-  
 plet cauernas vlcerū pistum rosaceo vel bono myr-  
 teo, & cicatrice tegit. Olei æstate lb. 7. aliàs lib. 7. &  
 femiss. hyeme libr. 9. axungiae recentis lib. 7. lithar.  
 subtilissimè triti lib. 6. fœnugræci heminam vnam,  
 aliàs vncias 9. feminis lini vsti tantundem, radicis  
 agrestis maluae recentis & succosae vel althæae lib. 3.  
 Habeatur olla amplo orificio, in quam fundantur  
 aquæ sextarij octo. Sic enim notatur Græcè per li-  
 teram η. quanquam fortasse substituendum κ. quæ  
 viginti significat. Ac viginti sextarij mensura Pari-  
 siensi, 15. pintas implent, sextarij octo sex pintas. In  
 aqua, purgata radix & cōcisa coquitur, semina im-  
 mittuntur, exprimitur succus in linteo, eius succis li-  
 bræ quatuor cum oleo coquuntur. Maiores primū  
 bullæ existent, deinde minores & crebriores: hîc  
 lithargyrum insperge, coque omnia molli carbo-  
 ne, dum succus omnino confectus videatur, ac me-  
 linum & bene coloratum fuerit emplastrum, non

# INSTIT. CHIRVURGIC.

inquinans, neque nimis durū. Sic enim apud Gal. 7. de comp. pharm.  $\chi\tau^{\alpha}$  γένη. Orib. habet aquæ sextarios 12. id est nouem pintas, & radicum lib. 4. & feminis vtriūſque sextarium vnum, vel  $\zeta$ . 13. & lithar. lib. 2. Radices alij purgant, tundunt, & prius quàm coquant, diem integrum macerant in aqua, postridie fœnugræcum lotum fideliter & purgatum adiiciunt, tertio die lini semen similiter lotum eadem aqua, vbi reliqua etiam dum madent, immergunt, quarto die coquuntur omnia ad crassitiem, expressus & colo traiectus succus vsui seruetur, vt videlicet cum oleo, vt prius, coquatur, & addita lithargyro pharmacum conficiatur: quod deinde conuoluitur rude, subigatur manu, & in pastillos conformetur. In vsu capiunt pastilli  $\zeta$ . 2. ceræ, olei ana  $\zeta$ . i. & omnia colliquant. Ex eadem materia magdaliæ officinarum emplastri diachylon fiunt, sed non eadem ratione, iam remollita parte vbi discutiendum, ireos tritæ pars duodecima plus minúsve adiicitur: si sedandus dolor est, mucago è meliloto: si etiam calor adest, è psyllio: potest etiam intingi croco. Potest diachylon aliis malacticis commisceri, tam efficax, vt vnum sine aliis chæurgis satis esse possit. Superficialia vlcera glutinat solutum rosaceo vel myrteo. Liquatum chamæmelino vulnera nervorum inflammatione prohibet. Podagricis quouis tempore opitulatur, veteres vteri phlegmonas persanat inditum pessario. Pōtest & alia præstare: quæ vt intelligas, describendum pharmacum, quod antè diachylon Democrates memorauit, vt obseſſa inflammatione liberes musculos, nervos, periostiō membranam punctam (vnde dolor, inflammatio,

febris, sitis, vigilia, atque id genus accidentia) vindices: vt podagricos quouis tempore adiuues, & prohibeas collas. Accipe litharg. auri in pollinem triti lib. 2. axungę vetustissimę lib. 4. libram verò & vncias quaternas olei veteris & crassissimi, non fœtidi, non nigri, non asperi. Axungia liquefcit igni, purgatur fibris, in vas aliud satis amplum transfunditur, adduntur olei  $\mathfrak{z}$ . 10. vt simul ferueant, relinquuntur olei  $\mathfrak{z}$ . 6. quas, si fuerit opus, & medicamentum crassius appareat, postea affundeş. Crasso iam pharmaco lithargyrus inspergitur, coquuntur omnia blando igne, & assiduè versantur spatula è picea: atq; vbi emplastri forma fuerit, auferatur igne, paulò durius æstate: hyeme mollius, sed vt non inquinet. Sublatum igne mouetur, dum refrigescat, atque hîc rursus duriter versatur manu, iungitur atque reponitur. Vfus tempore molliri debet, & aluta intenditur, permagnaque splenia super accommodantur. In neruis crassis & musculis, durioribus mammis, & tumentibus articulis radicis althęę purgatę fordibus, & in taleolas cęsę lib. 1. medicamento indes, quo tempore reliqua iam ad focum feruent, priusquam lithargyrus inspergatur. Vtriusque vires tum illius quod sine althęę radice, tum huius quod cum ea radice fit, emplastrum illud diachylon continere scripsit inuentor Menecrates, quod & alij aliter conficiunt. Aliud diachylon, vt Oribas. è semine lini, fœnugręci, hordei, radice althęę, vt prius maceratis, coctisque succus exprimitur: libris duabus succi adduntur lithargyri olei ana lib. 2. cerę vnc. 8. Lithargyrus cum oleo diu teritur, & cum cera leniter incoquitur affuso oleo,

*Emplastrum  
Democraſis.*

*Aliud dia-  
chylon.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

postremò succus adiicitur : versantur omnia , & sedulò permiscuntur. Sunt & alia *Ἀλαχυλῶν* malagmata, vt Alexandri è psyllio quod Aërius describit, & magnum Mesuæ sine gummi, & cum gummi factum, quòdque album, paruum & magnum conficitur. Paruo vtendum in duris inflammationibus:album mediocres scirrhus adiuuat:magnum reliquis efficacius est. Giluum Haliei cruētis vulneribus, præcisis neruis & nudis remedio est, inueterata vlcera cicatrice tegit, digerit, venenatis hominū & animalium moribus medetur: duritias maximè mammarū mollit ac discutit, atq; omnino eo veteres vsi sunt, vt optimo & admirabili medicamento. Descriptū est tertio & 5. lib. Gale. de compositione pharmac. *χτ' γένν*, ℥. ceræ, argenti spumæ ana. 3. 100. terebinth. mannæ, galbani, rubricæ sinopidis, terebinthinæ ana 3. 1. ol. sextariū 1. vel lib. 2. Oleū & litharg. dum non inquinent, coquito, hīc ceram, refināque iniicito : sublatis igne rubricam, galbanum, mannā deinceps adiungito: Quidā myrrhæ 3. 1. miscuerunt & ceræ non centum, sed tantū octo denarios scripserunt. In præcordiis tensis, difficili motu articulorum, vetus ac nobile est. Amythaonis emplastrum quod omnem duritiā soluit. ℥. ammoniaci 3. 36. ceræ 3. 36. terebint. 3. 8. bdellij, galbani ana 3. 8. thuris, myrrhæ ana 3. 4. cyprini, vel olei terebinthini, alioqui mastichini heminas quatuor : myrrha, thus, bdellium vino madefiunt, ammoniacum aceto diluitur, omnia contunduntur pistillo, quod oleo inungendum, quousque perfectè dissoluantur. Et hoc etiam fortius est Cathegeræ malacticon ad contractos articulos, & ita occu-

*Giluum admirabile.*

*Halies, seu piscatoris ex synopide.*

*Amythaonis emplastrum.*

patos, vt non moueant, internos abſceſſus, opiſtho-  
tonicos, neruos dolentes, inueteratas & contuma-  
ces duritias. ℥. bdellij ſeui vitulini, ammoniaci, iri-  
dis illyricæ ana ℥. 2. opoponacis, galbani, cāchryos,  
vel baccarum lauri, ſtyracis, thuris ana ℥. 1. piperis  
gran. 160. ceræ, terebint. ana ſelibra. vini & fæculæ,  
irini vnguētī quod ſufficit. loco huius, vel oleo iri-  
no cōdito aromatibus vtēdum erit, vel aliquod ex  
iis quæ apud Meſuem cōpoſita ſunt, ac cōdita aro-  
matibus, vſurpandum. Conficitur vt prius Κοπιῶ  
hæc, quaſi tuſilia, ex conficiendi ratione veteres ap-  
pellabant. Plura ſeprimò de compoſitione pharma-  
χῆ γένη, & ις. Aëtij deſcribuntur. Sed & οἷαυο  
χῆ πόπους malagmata ſunt quæ ſiccāt, contrahūt, *Malagma-*  
indurant, atq; emolliunt: quanquām Aſclepiadi & *ta.*  
Andromacho malagmata appellata, quia videlicet  
non ſolæ vires, ſed & compages, ac corpora medi-  
camentorū in ratione nominum ſpectata ſunt. Ac  
ferè malaſtica corpulenta ſunt & emplaſtica, ſi ne-  
que dolor, neque phlegmone, neque mollities cor-  
poris prohibet. Locus oleo fouendus, ex quo ſubii-  
ciatur malagmata remollitū pingui vel oleo, ne ce-  
leriùs exareſcat. Tunc enim reuellendū eſt, & aliud  
imponendū, alioquin pluribus diebus hæreſe con-  
ueniet. Iam verò in malaſticis, quæ noſtra hac me-  
moriam in vſu ſunt, emplaſtrū de meliloto, aliud ab  
eo quod veteres διαμελιλώτε deſcripſerunt. Eo  
vtendum eſt, in craſſa ac frigida materia: incidit,  
mollit, attenuat, calefacit. Quod de muſcillagini-  
bus appellāt, molliendo magis idoneū eſt, & dolo-  
rem lenit. Dialthæas mollit, lenit, coquit, incidit, di-  
gerit: Ceroneum repellit, coquit, mollit, incarnat, & *Cenſuræ re-*  
*mollientium*  
*quæ nūc vſi-*  
*tata ſunt.*



# INSTIT. CHIRVRGIC.

multiplicis vsus est. Resumptium mollibus corporibus conuenit, optimè mollit ex solis muccaginis. Emplastrum filij Zachariæ parabile est, & mediocriter mollit. Arthanitæ emplastrum strumis & lieni duro conuenit: vnguentum de bdellio mollit, incidit, discutit: diachalciteos soluitur lirino. Oleo è maiorana aliisque id genus molliiri possint, & adiecto galbano, bdellio, ammoniaco & similibus fortiora reddi. Priuatim conueniunt duris inflammationibus mammarum. Violariæ & althææ folia

*Ad mammas duras inflammationibus obfessas. aliud.*

hydrelæo cocta adipe vituli conteruntur, ouorum vitelli duo infecti croco commiscuntur. Hædina capita, veruecini pedes cum althæa & violaria percoquuntur, in expresso succo oryza bene munda & asperiore linteo attrita decoquitur, butyrum recens iniicitur, postremò cum iam corpulenta pulcra est, ouorum vitelli croco intincti commiscuntur. Al. In Caricarum decocto fabacea farina subigitur, adiecto oleo violaceo & aceti inomento cataplasma fingitur. Multa ad mammarum duritias & abscessus. 7. de comp. phar. μαλ. γέν. Cæterum grauius peccatur cum emplastra malactica è galbano, ammoniaco, opopanace, resina & aliis squalidis comparantur, & aceto multo diluuntur. Sic enim tenuant, incidunt, discutunt, non molliunt.

*Cautio obseruanda in malactica.*

*Quando suppurantibus vtendum.*

*De suppurantibus.*

CAP. 5.

*Qua medendi cura ineunda in fracturis capitis contuso pericranio.*

**I**Am hoc genere vtendum nobis, quum ab aliis remediis desperatio est. Verum in fracturis capitis contuso pericranio relicta alia medendi cura, ad suppurationem statim conuertimur, specillo vulneratio perioftion diducimus, labra vlceris in decussem ducta nouacula ampliamus, cõscalpimus

craniū, & abradimus: medicamenta quæ quàm celerimè suppurent, adhibemus, suppurata diligenter repurgamus, siccamusque, vt iusta nascatur caro, neque mollior quàm oportet, neque durior, & quæ non excrescat: vt denique conquassati ossis testula à viuo ossè maturè deducatur. Venereos *In venereis bubonibus & articulis celerius curaturamus.* bubonas, quique abscessus in articulis & ad articulos confederunt, celerius maturamus, ne inclusum virus, aut latens sanies periculum aliquod admoliatur. Alioqui tumor omnis prohibeatur, aut discutiat potius quàm suppuret, nisi iam eò conueriti natura videatur, excessitque tempus, in quo cōuenienter discutias. Ac ferè maiores phlegmonæ suppurant, pulsant, dolent. Dum pus conficitur (inquit Hippocrates) dolores fiunt ac febres. Suppuratis omnia ferè conquiescunt. In suggillatis hæc *Hippocra. aph. 47. li. 2* eadem remedia sæpè conueniunt. Imbecillæ parti, putri vlceri & tumori, cancroso, rheumatico, Telephio, Chironio, atq; omninò maligno frustra maturantia adhibeas: putrescunt enim illa tum malacticis, tum pepticis medicamentis. Ad scarificarum igitur & remedia acria decurrendum, vel quæ plurimùm siccent. Sint autem quæ suppurent, natura *Natura suppurantium quæ sit.* modicè calida & humida, iisdem limitibus circumscripta, quibus temperiem hominis definias. Ideoque eligenda materia, quæ naturæ corporum elementari familiaritate consentiat. Emplastica sunt *Emplastica sunt, quæ suppurent.* Ἀπυπτικά, (sic enim appellant ἐκ πυπτικῆ καὶ πεπτικῆ) vt præclusis inde spiraculis natium calorem inhibeas, in quo concoquētis naturæ robur est. Ita substantia quidem calor augebitur, neque qualitate crescet: solidę partes confirmabuntur: in-

*Ita quomodo generetur.* situs humor saluus persistet, dissipabitur verò qui  
 inanibus spatiis alienus est. Ex quo vitium conco-  
 quetur, & consuetudine partium simularium exal-  
 bescet, fietque tandem pus album, læue & vniforme: quod quia alimento esse non potest, exesa cute  
 vias sibi faciet, atque ita effluet. Non absimili ratio-  
 ne χαλασιχὰ vocata ἐκπυῖτιχὰ fient, si accesserit  
 crassities partium. Eodem modo quæ leniunt, cale-  
 faciunt & adstringunt. Emplastica modicè calida  
 omnia concoquunt. Præit in his quòd est tenue: re-  
 liquum verò vel contracta, vel illita cute vias inter-  
 cipit, ne quid spiritus exhalet. Contrà verò si expi-  
 rat calor, nec emplastica materia est, nihil suppu-  
 rat, & aliquando alienus calor succenditur, vnde  
 putredo. Echecolla, quæque tenaci & viscida ma-  
 teria temperata sunt, per se inhærent: reliqua verò  
 vel gummi, vel resinis mollibus implicanda, alio-  
 qui commodè alliganda sunt. Malactica calidiora  
 sunt, & leniter siccant, insitumque humorem paulo  
 minuunt, quo nomine à pepticis distinguenda,  
 ne similitudine fallant. In pepticis vitanda quæ de-  
 tergunt, & quæ vehemèter calefaciunt. Nihil enim  
 quod validè discutiat, pepticon est: & quod deter-  
 get, poros expurgat, quos illinere oportet. A siccanti-  
 bus metuitur, ne frugi materiam exorbeant, mul-  
 tò magis si prætereà excalfaciant. In summa modi-  
 cè calfaciant, atque adeò emolliant potius, quàm  
 siccant. Neque verò contra nos faciet, quòd in hi-  
 storiis medicorù permulta peptica sunt, quæ mistis  
 diaphoreticis deterforiis atque desiccantibus tem-  
 perentur, quin & simplex pharmacū est, quod con-  
 coquat & discutiat, vt galbanum: maturet, digerat,  
 detergeat,

*Malactica  
 quid differant  
 à pepticis.  
 Vitanda.*

detergeat, vt terebinthina: qualitas enim rerum mixtura retundi potest, & multa vitia eodem tempore interdum cōeunt, vnde varia misceri necesse est, & iis semel vti, quæ πολυχρεῖα veteres appellant. Ac sæpe facit abscissus natura, vt etiā acria misceamus.

Qualis est, qui lenta & contumaci materia concreuit, & eo nomine tardiùs suppurat. Peptica sunt, aqua tēperatè calida affusa parti: modus est, vt inde erubescat locus, ac leniter extumeat. Nimum sit si inde subsideat, aut expalleat. Hydrelæo, oleo pingui ac dulci modicè calido: similiter & butyro vten-

*Aqua tēperatè calida peptica.*

dum est. Butyrum phlegmonas concoquit ac digerit, in iis quæ molli aut certè nō ita dura carne præditi sunt. Et ad parotidas, bubones & oris phlegmonas; aliâque innumera omninò satis est: dentientibus pueris, & inde calentibus gingiuis atque tumentibus medetur. Lingitur per se incoquendis expuitionibus peripneumonicorū, pleuriticorum, & iis omninò quæ in thoracem defluerunt. Vsus est, quo iam tempore fluxio restitit. Infectū crocō nihilominus coquit, & inde pharmacum leniter repellit, & tempestiuum est incrementis. In more fuit veterū tubercula foris enata & contumacia calido pane fouere, vel cera subinde calefacta, sic vt ne sit nimius is calor, sed facilè ea parte sustineatur: cera sit natura pinguis, panis recens & ex optimo tritico comparatus: hac enim ratione tuberculum sæpè discutitur, interdū concoquitur. Tussilago sub cineribus cocta celeriter maturat: idē oxalidis foliis vulgus doctum experientia tribuit. Triticum ore præmansum, saliuâque hominis commolitum, rusticis corporibus cōuenit. Leniora sunt farina tritici per-

*Butyrum.*

*Triticum & inde farina & panis peptica.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

purgata furfure, & inde panis: dissoluitur aqua: oleū vel butyrum additur: coquuntur omnia, vt sit cataplasma quod lenit inflammationes vulnerum, & celeriter maturat. Eadē farina hydrelæo coquitur, coloratur croco. vbi calor aliquis superest: parum cocto pane ac recenti, quem vel hydrelæo, vel pauciore oleo insperferis, vtendum erit. In contumacivito, nec ita calente, panis ficiior, vberiore oleo molliri debet. Panis conditus sale efficacior est. Farina hordeacea per se inutilis est: verū quæ bene purgato grano extunditur, & castratur furfure eodem modo quo triticea, cōparari potest hydrelæo cocta, conspersa oleo, mista butyro, infecta croco: sic enim pus faciet, & calidioribus phlegmonis cōferet, præsertim cocta hydrelæo. Tale fuit cataplasma veterum ὠμήλησις vel ὠμήλυσις ex farina hordei, quod prius tostum nō fuerit: quamquam etiam licentia quadam ad alia farinarum genera nomen transtulerunt. Archigenes hoc modo parotidas celeriter suppurabat, assiduē calida conspergebat, & ὠμήλυσιν imponebat. Est & alia ὠμήλυσις antiquis vsurpata ex farina hordei, fœnugræci, seminis lini in sapa coctis ad glutinis corpus, adiectis interrim duobus vel tribus vitellis. Adeps suillus, phlegmonæ familiarissimus, deinde vitulinus: taurino & caprino in duris, frigidisq̃ue tumoribus vtendum est: leoninus & reliqui eiusmodi inutiles: gallinaeus & hoc paulò acrior anserinus vsurpari potest. Pix & resina in feruenti phlegmone rosaceo: in frigidiore, veteri oleo sicyonio, vel simili colliquanda sunt. Pix arida qualis Coracina & Colophonia, vberiore oleo dissoluitur: pauciore quæ liquida est:

*Farina hordeacea.*

*Ad parotidas Archigenis remediū.*

*Adipes.*

*Pix.*

mediocri quæ natura & ætate mollis, digitis cedit, lentoris est particeps, qualis olim Brytia & Lycia. Picatum ceratum dolorem lenit, & pus generat: *Picatum ce-  
ratum.* ideoque inflammationis ulceribus convenit. Resina utē-  
dum, terebinthina & lentiscina: cera languidior, re-  
sina acrior, confusæ ad suppurandū valent. Eluan-  
tur prius si quid acrimoniæ conceperint: molliantur oleo vel butyro, cum exaruerint. ¶ Oesypum veteres *Oesypus.* in pepticiis consueverunt: similem vim habet atq; butyrū, digeritque leniter. Lana sordida modica aqua maceratur, tertia pars vini dulcis affunditur, coquuntur omnia, quod superfluit pingue, maturandis carnibus cōtulis, colligit Hippocrates. E flore lilij succus exprimitur, suppurationes concoquit, & vulvas mollit, quod mel & syrion veteres appellarunt. Si-  
*Syrion.* *Syrion.* *Decoctione  
caricarum.* rion verò melligo è coctis caricis, detergēdo emolliendōque idoneum est. Decoctū caricarum lenissimum est, quod maximè coquit ac digerit. In aquæ sextariis sex pinguū caricarū libræ quinque decoquendæ, dum sextarij duo reliqui sint: magis maturabis, si inde pista farina triticea, adiecto oleo vel butyro, cataplasma finges: vbi verò digerendū magis ac refrigerandum, hordeacea melior est. Atque omninò carica pinguior coquendo, aciores detergendo atque digerendo magis cōueniunt. Ficus recens digerit & lenit, sed non coquit. Cataplasma è ficu recenti & hordeacea farina in dulci vino coctis lenit & discutit: è carica pingui & triticea oleo iunctis, lenit, coquit, discutit. Ex acri carica & pane deterget, incidit, digerit & contumaciā maturat. Eodem modo althææ decocto & vuæ passæ par-  
*Ex althæa  
& vuæ passæ* tes fouebis, farinas aut panem incoques: cataplas-

*Crocus.*

mata compinges, & si vis, intinges croco. Crocus maturat, leni astrictione confirmat partes, & poros contrahit. Pinguissimas passas exemptis nucleis per noctem aqua macerabis, postridie coques ad melliginem. Id in sapa dulci factum magis concoquet

*Melligo vna  
passæ.*

*Efficaciora  
remedia.*

& leniet, sed aqua potius vtendum, si quid caloris reliquum est. Inueteratis & callosis tumoribus cōueniunt, colla librariorū quæ sit è farina purissima, viscum aucupatoriū, styrax pinguis, ladanum, galbanum. Thus in corporibus tēperatis molle, albū, pingue, dūmq̃ manditur, minimè friabile. Rhodinum & myrtē in calidiori & dolenti phlegmone misceri possunt, vt pix, resina, viscum, colla, & similia, vbi perucax malum, & platysmata diutiùs hærere necesse est. Miscentur quoque stercus suillū, columbinum, caprillum, nitram. Et iam notū mulierculis remedium, pueri stercus calidum, duris & inflammatis mammis aliisque partibus impositum. Sed quum aliis remediis vtiliceat, iis sordibus abstinendum: quanquam certum experimento est breui tempore concoquere, & in fœditate excrementorum certa auxilia inuenta sunt. Furunculos & parotidas mollit ac suppurat cataplasma è ficubus, calce, iridis radice vel nitro, atque omninò, si nitrū defit, quod iam antè dictū est, sale torrefacto in mollioribus: fæce vini, vel aceti in durioribus vtendum

*Cataplasma  
furunculorum  
parotidas  
molliens  
suppurans.*

erit. Fæx sit recens, nam celeriter exolefcit. Vulgò etiam nota est medela, è cæpis cineribus coctis. In pepticis ponenda est cōfectio è cera & resina, quod *ῥηιδόχηρον* appellant. Ex ceræ semuncia, resinæ frictæ sesquuncia, in olei modico liquatis. Aliàs ex æquis omniū partibus, aut vna ceræ, resinæ duabus.

Aliquando etiã ceræ ratio & resinæ conuertitur, vt minor sit resinæ quàm ceræ modus. Hoc peptici miscetur, vt Aniceto celebri medicamêto veterum. Tetrapharmaco primas tribuit mouendo puri non aspernabilis author Cornelius Celsus. Idê remediũ à Græcis suppurâdo vsurpatũ. Constat pice, resina, cera, & adipe: vsus tẽpore, oleo vel butyro subigatur. Pix sit mollior, resina fricta, vel Colophonia, quæ in teneris corporibus oleo molliari potest: cera pinguis, adeps in mollioribus naturis, vel suillus, vel vitulinus: in durioribus, taurinus vel hircinus. E sicciore materia cõparatum mollioribus corporibus sarcoticum est: hoc terrapharmacon Paulus basilicon, quo nomine à Græcis ferè omnibus inscriptũ est. Scribonius emplastrum Aristi nigrum appellauit, & aliud basilicõ descripsit. Tetrapharmaco thus additum facit Macedonicũ, quod & pepticon est. Basilicon minus recentiorum hoc imbecillius, cõmutato adipe in oleum, quantò adeps oleo efficacior est: sic oleum quoque variè commutare licet. Oleo rhodino, myrrino, vel simili tetrapharmacum durius molliatur, vt corpus & affectus natura exigit. Mirabile hoc ad molliendũ ac suppurandũ. ceræ, terebinthinæ, medullæ cerui, adipis vituli, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis optimi, olei rosarum, myrrh. ana ℥. i. Myrrha cum melle subigitur, & prunis leniter incoquitur, ex quo reliqua adiecta sedulo miscentur. Al. picis ℥. i. ceræ ℥. 3. axungia veteris purgatæ ℥. 6. adipis taurini, œsypi ana ℥. 3. resinæ pineæ vel magis picæ ℥. 5. liquatis omnibus vitior. Al. resinæ ℥. 12. ceræ, æruginis rasæ ana ℥. 8. sepi vitulini ℥. 2. aceti, mannæ ana ℥. 1. Manna &

*Tetrapharmacum.*

*Macedonicum.*

*Mirabile ad suppurandum et molliendum.*

*Viride Antidromachi.*



# INSTIT. CHIRVURGIC.

æruſo cum aceto liquatur, & conteruntur: reliqua diſſoluta cōmiſcētur: mollit, coquit, purgat, digerit. *Διά γύψωſ* parotidas emolliens, & in pus eliquans. ℞. farina piftrinalis, quæ è molis & piftrino circūuolitās parietibus & tabulatis hæret, guttæ ammoniac. ana lb. i. refina pini, ceræ, adipis porcini ana libras duas, ſucci ſeminis lini quantum ſufficit: liquatur adeps, cera additur & refina, farina cōiungitur, ammoniacum ſolutū vino vel aceto, & lini ſuccus, tranſlatis aliis in mortarium concorporantur. Fermento, & eo quod *Μεζζύμης* inde medici appellant, in contumacibus vitis veteres uſi ſunt, de quo multa ex Democrito, Meſue, Paulus ſextimo, & Galenus tertio de compoſitione medicamentorum *Χτ' τόπ' 85*. ℞. cœparum & alliorum coctorum in cinere ana lb. i. vitellorum numerū quinarium, radicis lapathi coctæ libr. dimidium, farina fœnugræci uncias 3. fermenti ℥. 2. axungia lb. i. fiat corpus: in frigidis & caſſis humoribus cōuenit. Utuntur quoque diachylo paruo & aliis quæ molliunt. Atque omnino malactica refrigerante oleo, aſtringente pharmaco, viſcida & offarciente materia leniter tēperata, ſuppurare poſſunt. Tale eſt malagma Damocratis, quod eadem poteſt quæ diachylon capite de malacticis deſcriptum, ac præterea cruda, quæque coqui, mutarique nequeunt, edomat: muſculorum, & membranarum vulnera perſanat, punctis medetur, arthriticis dolorem attemperat, & omnino anodynon eſt. ℞. picis quàm ſicciffimæ, ceræ, puræ, terebinthinæ, manna ana libr. 2. thuris probi libram vnā, butyri pinguis ac recentis ſellibrā, vel ℥. 5. Liquabilia funduntur largo igno

*Malagma  
Damocratiſ.*

& affiduo, dum non inquinent, versantur rude; hic cacabus prunis subducitur, manna trita inspergitur, circumagentur omnia asserculo, postremò voluntur manibus, & reponuntur. In vsu, copioso & recenti rosaceo pharmacum diluitur, vt caua carne impleat, inflammationes tendonum abigat, & in pus album cruda & rebellia tubercula conuertat. In vlceribus difficillimis, quæ pus nõ reddunt, mirum quàm efficaciter concoquat. Coloris ambigui quod sequitur. Lithargyri vnciæ tres, olei ricinini vnciæ quatuor, coquantur vnà dum nõ inquinent, deinde miscetur squamæ æris nigri, æruginis, chalcitidis, ana scrupuli quatuor: sed hæc metallica diutius fuisse trita conuenit ex aceti acerrimi vnciis duobus. Vfus tempore diluitur ricinino, & in con-

*Vtendi formula.*

cerpto linteo inseritur cauo. Atque hæc in præsentia sufficiant. Locus oleo dulci, peptico succo, aqua moderatè calida, hydrelæo, & aliis foneatur: sympepticon medicamentum inducatur, mollis stuppa vel lana succida superponatur: omnia decussata fascia colligentur, vt qua parte diuisa fascia est, conus abscessus aduertat, nec affectum locum opprimas: semel in die, vel rariùs, commutari debet, nisi vel dolor vrgeat, vel pharmacum exarescat. Ita verò formari sympeptica oportet, vt neque liquidiora diffuant, neque corpulenta nimis locum opprimant, Iustum corpus est ceratomalagmaton & mollium emplastrorum, ac quod antè dictum est, ἐχέκολλα & glutinosa esse melius est, vt per se, sine vinculis hæreant: quanquam & emplasticis lanam succidam, aut mollicula spleia superdari, & omnia colligari nihil prohibet, idque hyeme magis & frigore.



IACOBI HOLLERII  
STEMPANI, MEDICI PA-  
RISIENSIS CELEBERRIMI  
de Materia Chirurgica  
LIBER II.

*De aperienda vomica.*

CAP. I.

*Argumētum  
1. & 2. libri.*



VO & quali genere remediorum hu-  
mor repellatur, quæ medicamenta  
trahant & discutiant, molliant, matu-  
rent, & pus efficiant, superiore libro,  
quantum arbitror, satis explicatū est.

Ac iam subiiciendū nobis, qua ratione vomica exugi  
pharmacis, aperiiri ferro, igne etiam rescindi possit.  
Tum exponēda materia, quæ sordida repurget, pu-  
ra impleat, plena denique cicatrice claudat. Et quia  
ad hoc institutū nostrum pertinet, de glutinātibus  
auxiliis eodem nobis compendio differendum erit.  
Atque ut hinc initiū capiat oratio, quæ suppuratio  
sponte sua nō rumpitur, ferro, igne, vel medicamen-  
tis aperienda est. Aliò qui serpit fanies, & cuniculos  
agit, venas, arterias, nervos, & vicina corpora depa-  
scitur: hinc etiā atteruntur ossa, & cariem ducunt,  
liuescit cutis, & in rugas quasi senio marcescens cō-  
trahitur: idque metuendum magis in digitis, arti-  
culis, partibus corporis, quæ in decliue patent. Sic  
enim parotides, femorum abscessus in fistulas ca-

*Noxæ à non  
aperta sup-  
puratione.*

uantur, & quæ facilè putrescunt, qualis anus est, ex- *Foras euo-*  
 tremæ partes, & loci genitales. Cùmque ambigat *canda sup-*  
 materiæ cursus, quæ videlicet foras intròq; conuer- *puratio.*  
 ti possit, prouidèdum medico vt in superficiem de-  
 riuet: multò magis si viscerum aliquod in propin-  
 quo est: si intus disperso puri nulla via sit, qua ex-  
 cernatur. Alioqui vitam celeriter eripit, aut cōpres-  
 sum intus putrefaciet partes quibus insidebit. Quo *In vomica*  
 fit vt in vomicis, quas ilia collegerunt, ea curandi *ventris fer-*  
 ratio quæ tentatur ferro, veteri medicinæ probata *ro tentata*  
 sit. Atque decliuem partem, qua ile est, iuxta ingui- *curatio.*  
 na secari iussit: neque à peritonæo membrana me- *Peritonæo.*  
 tuit, vt quæ nullo ferè periculo incidatur, & facilè  
 coalescat. Nec aliter in vulneribus capitis, vbi con-  
 tusum aliquid, fissum, fractum, modò serra, modò  
 terebra caluariæ partes ad diploën vocatam & me-  
 nyngen excindimus. Quare etiam si tumor nòdum  
 satis maturuit, ea pericula ferro anteuertenda sunt,  
 multò magis si virulèta materia vomica includitur,  
 vt pestilente carbunculo & bubone, lue venerea, &  
 aliis generis eiusdem. Cruda ani tubercula metu fi-  
 stulæ secat Hippocrates. Quanquàm animaduertè-  
 dum, vt ne nimis citò: nunquam enim vis naturæ  
 gratis inferèda est, sed semper aliquid beneficij, ni-  
 hil maleficij proponi debet. In vomica quæ tardiùs *Vbi ossa in*  
 erumpit, à subiecto ossè metus est: atq; ideo in con- *propinquo*  
 tusionibus capitis & angustis vulneribus, pericra- *sunt vom-*  
 nium in crucem interfecamus, aut ampliori plaga *carum.*  
 diuidimus. Sed iam aperta vomica, mēbranæ, ner- *Cautio in*  
 uacea corpora, & alia semiputria occurrunt, quæ *membranis*  
 nec intempestiuè rescindenda sunt, molliter priùs *excidendis*  
 vellicare oportet: at si nec sequitur, celerius illiqua- *& nervaceis*  
*corporibus*  
*vomicarum.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

re conuenit, vt vel sponte sua excidant, vel nulla vi & leni tractu reuellantur. Atq; omninò sua est putredini maturitas, eaq; expectanda est. Alioqui noua inflammationis & conuulsionis pericula creari solent. Itaque semiputria illa molliter cōmouenda sunt : matura enim facilè concedunt, cruda restitāt, doléntque si vi maiore pertrahātur. Iam verò perpetuum non est aperire ferro, quod suppuratū est, sed si nullum in mora periculum apparet, diaphoreticon remediū imponendum, quo loco mollior abscessus est, & digito cedit. Sic enim sanies exugipoteest, idque faciendū magis, quum alta parte vomicæ non decliui, suppuratio se colligit. Atque antea pharmaca notata sunt, quæ pus exhauriant, & postea describentur. Neque ignorandum est locis aliquot interdum materiā subesse, quæ sit puri similis, qualis in atheromate, steatomate, meliceride, aliena quædam pituitæ genera : nonnunquā quoq; ad ossa colligitur, eaque discutienda, aut facto vulnere expurganda est. Est cū spiritus flatuosus speciem puris referat, atque aperientem ferro medicū eludat, nullo pure, sed solo spiritu exeunte. Quòd si ferro vel igne semel vtendum est, prius animaduertere oportet, ne quod vas insigne, neruus, tēdo, vinculum, ne quid neruosum (quales membranæ quædam sunt, aut potius lati tendines) conuulnerentur. In musculis fibrarū interstitia cultello ligneo, vel digito diducenda, ne cum fibris nerui, aut vasa præcidantur : idque magis, quum in profundo sanies resedit. Parcendum quibusdam partibus quæ vegetiùs sentiunt, & à quibus vis ignis ad principia celeriùs transilit. Cauteria & ferramenta periculosa

*Suppuratio non necessaria, si non aperientem ferro.*

*Pituita puri similis.*

*Animaduertenda in vfu ferri & ignis.*

occipitio, temporibus, & vbicunque caluaria mollior est, vbicunque vel exitus neruorum, vel aditus *In oculis.* vasorū est: nec ea ipsa citra periculum oculus sustinet. Ac in palpebra quidē transuersum ferrum ducitur. In oculo ne qua vulneretur vena prouidendū, ne pupilla contingatur, vt inde humor profluat, & cicatrix relinquatur, quæ visum intercipiat. Ex *In temporibus.* quo in eam partem, qua extima membrana albicat, scalpellum, acus, & alia id genus ducere solēne est. A vulneratis temporib⁹, & eo loco qui paulò superior est, quaque perreptāt venæ, nerui, arteriæ, hæmorrhagia cōmouetur, & aduersæ partes ferè conuelluntur. In capitis vulneribus animaduertendū, *In capite.* quàm altè vitium descēderit. Pericranium cōtusum discinditur, vt fiat exitus puri: in eodē plaga angustior inciditur, dum satis pateat. Quod si cranij fractura accesserit, curandū sedulò, vt celeriter suppu- *In caluaria fracta.* ret, quod ante vulnus est, vt purū sit & aridum: ex quo agnoscēda fracturæ magnitudo: quæ si superficialis est, rasorio scalpro atteri & cephalicis curari debet. Si ad diploën procedit, modò terebra, modò ferra superior pars ossis eximenda est: sed ita, vt ne vltrà quàm oportet ferramentum prodeat. Cranio verò vsque ad mēbranam fracto, omninò excindendum os est, verūm sæpiùs reuocato ferrò, & frigida merso. Etenim iugiter attritū, incalescit motu, & os elimatū ferra vnà conferuescit. Ac video placuisse multis aliquid ossis relinqui, nec totū semel excindi, quódq; reliquū sit, pharmaco siccare. Sic enim alimenti inopia exarescit, vt vel spōte sua excidat, vel leniter motū statim sequatur. Deinde ea ratione periculum declinatur, quod accidat, si altiùs permeāte

# INSTIT. CHIRVURGIC.

ferro membrana vulneretur. Atque omninò in cranij fracturis, vbi ferra, modiolis, cyclifcis, terebellis via puri fit, crassiori parti ossis ferramenti acies configi debet, & à futuris, fissuris, neruorum radicibus & vasorum cuniculis, postremò quoque molliore ossè, duriore fracto, & tēporibus declinanda vis est.

*In collo.* In strumis & colli abscessibus à carotide arteria, vena sphagitide, vocali neruo abstinēdum: illinc hæmorrhagia, quam ægrè supprimas: hinc vel omnino mutus, vel certè semimutus homo relinquitur. Ex quo (opinor) ceruici omninò parcere quidam è veteribus maluerunt. Adde quòd in totum collum

*In humero.*  
*In thorace.* neruorum propagines à spina disperguntur, quas nō nisi periculose vulneras. Exteriores parte humeri tendo est, qui ignem ferrumque nō sustinet. In empyicis & deploratis pleuriticis scalprum & cauteriū inferiore parte mesopleurij collocamus, quia videlicet superiore vena, arteria, peruus est. Hippocrates, qua parte exauditur materiæ strepitus. Alij scabriorem cutem & prius coloratam ad sectionē annotant. Nonnulli vbi minus carnis est. Paulus inter quartam & tertiam costam: inter quintam & sextam Leonides: multi inter quartam & quintā aperiūt, metu diaphragmatis. Sed aliis thorax breuior, aliis longior est. Sunt qui internam membranam cōmouerent, vt pus effluat. Alij ne attingendū putant: quia sic effluxione spiritus ægri intereant, aut insanabiles fistulas trahant: vtrique se confirmant authore Hippocrate. Per sterna, nerui, vasaque decurrunt: ideòque in vomitis quæ illic coëant, ad latera chirurgia vertenda est. In collectionibus ventris, quæ inter peritonæum & intestina latent, siue

ex iecore, siue ex alia parte diffusæ sint, Erasistrato primùm, deinde aliis medicis placuit detrahi pus sēctis inguinum locis, vbi videlicet illa terminantur: incisa etiam peritonæi membrana, vt quæ sine periculo diuidatur, & facilè cicatricem claudat. Id quæ confirmant, quod in hydropum paracentesi & chirurgia ramicis intestinalis nullo ægri periculo ea sanescat. Sed hoc tentandum magis vbi desperamus, vt ne naturæ possit intrò pus effusum, vel per vrinas, vel per intestina transmittere, id quod integris viribus naturæ aliquando quasi miraculo cōtingere certum est. Hydropicos temerè incidi corrupto hepate rectè scripsit Erasistratus. Et in colo suppurationia tubercula, eodem modo supra inguina aperta via, perpurgantur. In extremis ilibus, quæ in summen vertunt & aqualiculum, multi sunt tendines, multa vasa coeunt, ex quo hac parte manus sedulò temperanda est. Videndūque ne vel laxetur vel disrumpatur is meatus, qui à peritonæo ad testiculos procedit, vnde hernia moueatur. Inurit carnosus podex, & ferrum sustinet: non ita quod illic neruaceum est. Eadem ratio in genitalibus seruari debet: vbi ab arteriis cauendum, quæ illic plurimæ coeunt, hiāntque maioribus clausulis: nam inde hæmorrhagiæ non ita facilè supprimuntur. Sub nati-

*In ilibus.*

*Genitalia.*

*Sub nati-*

*bus.*

*Cautione*

*nudi nerui*

*refrigerē ur*

*In perinaeo.*

tur, aut nudatus violatur frigore, subiectum crus stupidum relinquit. Idem animaduertēdum in vomicis reliquarum partium, ne nudi maneant nerui, & frigore contrahantur. Hinc enim stupor & conuulsio fieri cōsuevit. In perinæi tumoribus qui inciduntur, & calculis summopere cauendum, ne



quid intus vulneres, quod postea agerrimè glutinetur, quaque summo pudore & molestia excrementa diffuant. Itaque vbi fistula medium cuniculum agit inter intestinum & ceruicem vesicæ, fistulam medicamenti quidem exedit: ferro attingi vetat Hippocrates. Sed fit aliquando non modò hac parte, sed aliis, vt neque medicamenta iniicias, quia profundior & obliquior fistula est: neque ferro diuidas, quia altiùs descendit, quia obiter incurrūt vasa magna & nerui, qui certè casus desperationis etiam putandus est. Ac breuiter vbi maior pars est, quæ auferri postulat, & ad partes veniendum, quæ non nisi certo periculo violentur, abstinendum ferro est. In quibus autem aperire licet, magna sectio vitari debet: quia inde cicatrix turpior, pars imbecillior, & ad motum ineptior relinquitur. In bubonibus venæ sunt & nerui, quæ glandibus innituntur, ideoque si quando inurendi loci consilium est, apprehendenda cutis, & à glandibus separanda priùs est. Sectio verò oblonga angusta trāsuersum ducenda est. In vulneribus quæ ferro fiunt, quacūq; parte eiusdem generis glandulæ sunt, eadem ratio seruari debet. In articulis perpetuò suspectus ferri & cauteriorum vsus est: quibus necessariò vtēdum sit, ea parte quidem imprimetur vis, quæ magis carnosæ est, quæque neros articulis, & tendines longiùs relinquit. Ex quo ischiadicis inferiori parte quàm malum est, ignem adhibemus. In genu, lato illi tendini parcendum est. Is ex duobus maximis musculis femoris obneruatus patellam capit, alligatq; vicinis ossibus: qui si vel ferro, vel igne violetur, efficit vt neque sursum trahatur membrum, neque exten-

*In buboni-  
bus.*

*In glāduli.*

*In articuli.  
In ischio.  
In genu.  
Latus tendo  
genu.*

datur, & grauia conuulsionis pericula creare solet. In carpis multiplices tendines, quasi annulo colligantur: atque hinc tota ferè extrema manus neruacea est: eaque interiore parte lato tendine contegitur: extremis digitis, quaque radices vnguiam posite sunt, acriter sentit: ideoque hac tota parte admodum suspecta tum ferramenta, tum cauteria sunt: in toto extremo pede eadem ratio seruari debet. Quo fit, ut in clauis, hoc est, tuberculis duris, clauorum capiti similibus, qui ferè summis digitis manuum, calcaneis pedum & plantis enascuntur, aliis potius utendum auxilium, quam ferro vel igni veteres existimarent. In his omnibus anatomica disciplina opus est: in qua quicumque fuerit exercitatus, ea omnia pericula facile declinet. Contrà verò sæpenumerò aberraret, necesse est Rursus aliud è situ consilium capere oportet. Quædã enim vomicæ in superficiem eminent, quæ ferè sine periculo inciduntur, vitatis scilicet neruis, maioribus venis & arteriis: quædam in alto latent, ut pulmone, renibus, cauis hepatis, cæso-phago, interiore diaphragmate, ventre, intestino, nisi quâ parte in anum definit, posterioribus partibus vesicæ, & vteri, altiore cerebro. In his itaque suppurationibus nullus ferro locus est, neque tractantur cauterio, nisi hoc aduersæ parti, quæ foris est, quæque familiaritate aliqua cõsentit, imprimatur. Tantum hoc vnum reliquum est, ut modicè acribus modò in potu datis, modò linctis, aliàs infusis dirumpantur. Quale hoc est, tussilago mediocriter acris est, quæ citra molestiam thoracis collectiones rumpere credita est. At verò in internis suppurationibus quædã foras se proferunt, quales sunt in gib-

*In carpis.**In extremis  
membris.  
Clauis.**E situ.**In profundis  
vomicis.**Tussilago.  
In his quæ  
ex alto se  
proferunt.*

*In quibus à  
vicinis me-  
tus est.*

bis iecoris, lienis, ventris, vesicæ collo, & parte sub  
pubem eminente, peritonæo, colo, vtero. Sed quæ  
in vtero & vesica suppurationes coierunt, sanescunt  
ægrius: aliæ facilius percurantur. Sunt præter hæc  
genera tum abscessus, tum tubercula quæ non ita  
latent, sed ad quæ via angustior periculum aliquod  
denunciet, ne quum ad partem ægram cauterium  
dirigitur, violet obiter quod sanum est: qualia sunt  
in ore, profundis naribus, intestino recto, & eo si-  
nu, qui pudoris est. Qua in re vel sutilis fistula more  
veterum, vel calamus scriptorius habendus est, aut  
inanis canaliculus, per quem cauterium ad vomica-  
m & partem ægram transuehatur. At si quid in  
profundo rescindendum ferro, lentè quidem & per-  
petuo oculo ducenti culter dirigendus est. Id quod  
in strumis, cancerum radicibus, varicibus, & vbi  
pus altius defedit, facere oportet. Primùm ergo cu-  
tis in crucem secanda est, nudanda caro, si quid va-  
forum aut nerui cultro occurrit, id ipsum digito, li-  
gneo vel osseo veruculo superandum, distinctis fi-  
bris, nec ita momentaneis membranis, quibus illa  
inter se coniugantur. Id quæ sedulò faciendum, do-  
nec secando ad eum locum perueneris, in quo vel  
colluies latet, vel conditum est, quod eximi debet.  
Atque dum hæc fiunt, præsto adesse oportet medi-  
camenta, linamenta, fascias, reliquaq; omnia, quæ-  
cunque ad hæmorrhagias facere videantur, vt si nec  
opinanti sanguis è vena vel arteria profluxerit, ha-  
beas ad manum quod in præsentia opituletur. Ita-  
que quo iam tempore omnia tuta sunt, & locus  
æger nudatus est, opportunè parti gladiolum infi-  
ges, & vomica repurgabis, aut peramputabis quod  
eximi

*Vbi in pro-  
fundo rescin-  
dendum ali-  
quid.*

*Cautio.*

eximi oportet. Videndum quoque in configendis vomicis, ut quantum oporteat culter descēdat: profundius vulnus hæmorrhagias commouet: superficiale sæpenumerò frustra est. Eodem modo cauteria in superficiem transcurrunt, leniter insident, aut altius imprimuntur. Et hæc quidē in molliori corpore, molliora, qualia è subere, spongia, & quibusdam radicibus configi possunt. In metallicis, aureum æneo & ferro clementius est. Sed de his alio loco pluribus. Rectum verò an transuersum, vel obliquum vulnus esse debeat, figura partium, flexus, rugæ, fibræ primùm quidem indicant, deinde consilium iuuāt subiecta vasa & corpora. In collo qua parte eunt vena, arteria & neruus, rectum transuerso præferunt. In fronte, palpebris & vbicunque transuersò ducuntur rugæ, transuerso quoque fer-ramentum duci maluerunt, ne contractis rugis vulnera replicentur. Quibusdam tamē in fronte recta vulnera placuerunt magis, vbi nec ita profunda, nec punctim infligenda sunt, ne quæ à perioestio membrana subest, conuulneretur. In inguinibus è flexu transuerso ducitur duplex, interim angustum & oblongum in myrti folium. In ventre nisi prohibeat flexus & rugæ, ut sunt fibræ musculorum: eodem modo in reliquis: eaq; parte infligenda placida est, cui in motu & corporis flexu, externa corpora minùs occurrant, interiore brachio & crure potiùs, quàm exteriori, & longiùs ab articulis. Simplex vulnus aliquando sufficit, decliui parte, duplici aliquando & trigono opus est, cuius vertex altior, basis inferior describatur. Eadē ratione in lunatis vulneribus, sursum cornua existant, deorsum

alueus abducatur. Atque omnino scalpellus ea parte configatur, quæ mollior est, quæ digitis succumbit, ubi fastigium erigit, qua denique sanies commodius expurgetur. Ὑπόρρουσιν appellant ὑπόρρουσιν & exanitionem, vel (ut alij) exaniationem: in qua ἑπιδαίρεσις est, & ἑκτερίσις, αἰτιδαίρεσις & χαλασία. Nam ubi proclinata parte foramen est, faciliè purgatur sordes: ubi verò in sublimi, ea restituere solet, deorsum subsidet, tandèmq; sinuat, siquidem vomica pars nequeat pro arbitrio commutari. Quale est in trunco corporis, ac ferè capite & parotidibus. In manu & crure etiam si os vlceris altiùs positum est, poterit tamen ita inclinari, ut sanies liberè excurrat: tùmque manus quidem è mitella suspèdi debet, ut carpus gibbero sit altior. Crus autem puluino innitatur, sublato genu, & decliui in coxam femore: in brachio & tibia non ita libera est conuersio: utrùmque membrum ea ratione collocandum, in qua diutiùs sine dolore permaneat. At si cui parti id denegatum est, nec ea potest pro libidine conuerti, aduersæ parti & decliui vulnus inferendum, quod χαλαστίαν vel αἰτιδαίρεσιν appellant. In aliis quoque manu & crure quæ commodè inuerti possunt, quò sinus longior, cuniculosum vlcus, sordes vberior, etià aduersæ parti lanceola immittitur, ut duplici exitu dato, vitiù celerius expurgetur. Adde quod ea ratione liquida medicamenta, quibus in id genus vlceribus ferè opus est, faciliùs infunduntur. Et quum ab ore vlceris ad fundū ducto gladiolo tota cauitas detegitur, ut in fistulis: & ubi suppreffis arteriis gangræna metuitur: ubi denique nulla alia via sanies satis expurgatur. Non-

*Duplex exitus puri.*

nunquam angustius orificium ferro ampliatur, aut quod amplum quidem, sed rotundum aucto vulnere in longum, aut aliter deformatur. Sed hoc non tam purgando, quàm glutinādo fit. Quibusdam locis plurimæ cōcurrunt arteriæ: plurima vitalis spiritus materia est: hîc paruo vulnere contentus eris: ne confertim semelque erumpente sanie, simul magna vis spiritus diffluat, vnde animi deliquia, & nec opinatæ mortes consequantur. Est cum adpressa manu fundo vlceris, & ita ad orificium adducta, interior sordes excluditur. Fasciis quoque alligatis, astrictis, id efficitur. Aliquando in latera materiæ cursus deflectitur nouo factō vlcere, vt inde pars nobilior, in quam vitium decurrat, liberetur. Quibusdam è vomica superiore per angustias quasdam sanies deorsum illabitur, & nouam vomicam gignit, qua aperta superior facilius percuratur. Vitioso dente, & inde gingina purulēta, tumor sub mento colligitur: cōtusa atque inde saniosa maxilla superiore, labrum superius interiore parte purulentū euadit. Hæc atque alia id genus medico obseruanda sunt, ne prius inferiorem sinum claudat, quàm superior fuerit percuratus. Ac temporis ratio quædam est, in quo vomicæ recludātur. In quibus morbis nullus dies vrget, tutius est vere, deinde autumnō & æstate, aut certè calore factō nondum ortis frigoribus. Atque hæc temporis ratio multò magis seruari debet, quò magis necessaria pars est quæ tractatur, & maiori periculo subiecta est, maiórque plaga facienda est. Eodem modo matutino magis & proclinato sole, quàm meridie, quàm feruente cœlo, quàm denique nimium progressa nocte. Et

*Quo tempore  
re aperien-  
da vomica.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

hæc quidem de ferro & cauteriis in aperiendis vom-  
 micis breuiter dicta sint. Reliquū est vt eodē com-  
 pendio de medicamentis, quæ aperiunt, dicamus:  
 postremò addamus quæ sine ferro & vulnere pus  
 exhauriant. Atque utrôque genere, hoc etiam ma-  
 gis vtédum est, quia mollior æger est, quàm qui vel  
 ferrum, vel cauterium sustineat: quia eo loco sanies  
 confedit, è quo, etiam si aperias, non facilè effluat.  
 Et medicamenta quæ aperiunt, cauteria quædam  
 sunt, naturâ certè caustica: ideóque à quibuscūq; ve-  
 terum cauteria frigida vocata, à recentioribus po-  
 tentialia. Cauteria quidem, quòd reuera vrant: fri-  
 gida vt ad ferrum, & similia, quæ rutilēt igne, com-  
 parata. Neque tamen sic vrunt, vt quæ caustica &  
 septica postea describentur, nisi quædam fortasse,  
 quæ diutiùs insistant. Theriaca igitur vomicas ape-  
 rit: vrticæ semē è vino tritum frangit, purgat, incar-  
 nat, cicatrice tegit. Cauliū radices vstæ, tritæ & vete-  
 ri axungia captæ. Eodē modo radices cannæ, ostreo-  
 rum testæ crematæ, adeps ranarum viridium, quæ  
 versantur in arboribus, lac ficulneum, tithymallo-  
 rum succus, puluis è capitibus muscarum & lacerta-  
 rum, puluis cātharidum, erinaceorum corium cum  
 pinnis vstum, batrachium, caninum stercus album,  
 muscerda, arida vini fæx & aceti, magis etiam quæ  
 cremata fuerit, calx viua in sapone, vocatum subli-  
 matū in axungia: trita illa visco quercino, terebin-  
 thina, larigna, abietina, sapone, butyro, æsypo, mel-  
 ligine anacardina, hermodactylorum succo, excipi  
 debent. Ac plura capite de pyroticis. Sed hæc ita in-  
 sistere oportet, vt aperiunt, nec crustam ducant: aut  
 si sic, ea molliter detrahenda est. Mistum remedium

*Medicamen-  
 ta quæ ape-  
 riunt.*

*Frigida cau-  
 teria.*

*Quæ ape-  
 riunt.*

*Quibus ex-  
 cipienda quæ  
 aperiunt.*

*Mistum re-  
 medium.*

est, fæcis crematæ vini vel aceti ℥. 2. fimi columbini, propoleos satis torrefacti, æruginis ana ℥. 3. aquæ marinæ, vel in qua subduplum sal illiquauerit. ℥. 1. olei antiqui, vel feruefacti ℥. 2. ærugo cum sale & fæce trita, aquæ & oleo commiscetur: coquuntur ea fictili causâ, puro carbone, dum tota exhalet aqua: ex quo propolis mollita priùs imponitur: auferruntur igne: vbi paululum refrixerint, columbi fimus inspergitur: pusilla plagula & oblonga efformatur, eaque medicamento inducitur, & conuenienter adaptatur: tum amplius splenium superdatur, quod leniente simul & coquente pharmaco illitum esse oporteat. Al. ℥. fimi columbini, nitri ana ℥. 4. caric. 7. quibus arida trita commisceto, ac bene pista inducito, vt priùs. Quòd si durius videbitur, purgata axungia & melle temperato. Arrhenico, sandaracha, puluere angelico vel mercurio vocato & sublimato prudenter vtendum est, vt habeatur ratio corporum & vomicarum. Nec enim placuit veteribus Medicis (quod iam cõsuetudine inualuit) grauiùs cruciari ægros. Nec in his solùm, sed in iis etiam, quæ tantùm pus exorbeant, non aperiât, ita cauisse ægris certum est. Veriti ergò illi ne quæ discuterent acriùs, dolorem vnà commouerent, bis in die detrahi medicamenta voluerunt, bis fomentis vti, quæ dolorem remitterët. Ac iam discussa saniei parte, semel tollere remedium, semel fouere tâtum permiserunt. Postremò non reuelli, sed contineri, dum tota materia exhausta esset, vtile iudicarunt. Neque priùs hoc vtendũ genere remediorũ, quàm æstus vomicæ & phlegmonæ quieuerint. In vsu, superponitur folium vel malagma, quod leniat, aut

*Non cruciã-  
di ægri.*

*Clementior  
curatio vete-  
rum.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

splenium delibutum pharmaco, quod dolorē prohibeat. Quantum vulnus esse velis, tantum splenium aut plagulam constituas, quod pharmacum vulnerarium excipiat. A maiore vena, arteria, nervo abstinendum, neque diutiùs reliquendum loco medicamentum. Laxanda priùs cutis est, & tenuitas parium comparanda pharmaco. Sic enim cruciabit minùs, & celerius efficiet. Ac rursus factò vulnere solatium parti afferendum, fouendùmque remediis, quæ temperent. Quòd si adhibito pharmaco vulnus sit, neque doloris sensus commouetur, iam syderatæ & emortuæ partis indicium est. Neq; iam aliud reliquum est, quàm vt vel depascaris igne, vel excisorio scalpro peramptures. In aliis austerior nostrorum hominum, quàm veterum medicorum, cura est, dum alligatis causticis crudeliùs excruciant ægros: sed fortassè dicât, quod olim Epicurus, doloris grauis solatium esse, quum is brevis est. In alio genere remediorû quæ saniem exugunt, sapo est illitus, tum per se, tum in discutiente oleo solutus. Quod sequitur, peculiariter conuenit abscessibus genuum & articulorum: exprimit enim pus, nec incidit. Idem etiam glutinat. ℞. recrementi plumbi ℔. i. teritur, & in sesquilibra olei veteris coquitur ad crassitudinem mellis: subductis igne, terebinthinæ ℔. i. commiscetur: coquuntur omnia placido igne, atque vniuntur. Al. ℞. litharg. cerusæ, salis ana ℥. 3. olei veteris ℥. 10. trita illa ex oleo coquuntur olla, & assiduè commouentur: quum non inquinant, in mortarium traducta contunduntur, & vsui sunt. Ex lythargyro, sale, terebinthina & oleo veteri, multa comparata reperias, quibus acria

*Desperata  
vomica.*

*Quæ saniem  
exugunt.*

trita resperguntur, ærugo, fax, calx, vitrioli genera, squama, lapis calaminaris, & similia. Facit hoc ad strumas, parotidas, ganglia, mammarum abscessus, elicitque, laxata cute, quicquid puris intus conditum est. ℞. ceræ, nitri, terebinth. olei veteris ana lb. i. aquæ, vel (vt Andromachus) lixiuij ficulnei ℥. i. o. liquatis aliis nitrum, vel aliquid tale inspergitur solutum aqua vel lixiuio: miscentur omnia, circumaguntur assiduè, nequid efferuescat. Plura iam antè, vt capite de resoluentibus, & 6. de compositione pharm. *ⲭⲓ γέν.*

*De purgantibus medicamentis. C A P. 2.*

**S**equitur vt purges. Etenim omne vlcus sordidum sedulo purgandum est. Quod si dehiscit foras, neque fistulosum est, molli tomento vel lintheo tum sinum ipsum, tum labra vlceris perpurgabis: deinde medicamentis cauum implebis, dum rubens, ac nimium neque siccum, neque humidum vlcus extiterit. Medicamenta in concepto linamento ferè imponuntur, quanquàm aliquando puluisculis cauum inspergitur, hocque præcipuè, quum humidius est. *Ratio purgandi.* Contrà verò arefcenti vitio, dolenti & inflammato liquidiora conueniunt. *Consistentia medicamentorum ratione vlcerum.* In media conditione satis corpulenta pharmaca inferuntur. Quòd si non ita expositum vitium est, sed intus latet, difficilis omninò cura est. Et si quidem capite includitur, neque per aures, nares aut aliter *In capite.* fordes effluit, modiolò, cyclisco, vel terebella patefacere viam oportet. In extremis naribus quà meatus in os pertinet, specilli nucleo, vel fistulis medicamentum induci debet. *In naribus.* Alioqui aperto ore per palatum via ad vlcus quærenda est. Nec alia serua-

# INSTIT. CHIRVURGIC.

*In ore.  
In thorace.*

tur ratio in oris vlceribus, quæ non ita patet. Ad thoracem vnica ferè via est ab ore per asperam arteriam, nisi vulneris orificium in superficiem veniat. Hic pyulcis, collyriis, suctu, suppuratio exorberi potest: iisdemque machinis vel melicratum, vel aliquid generis eiusdem inferri debet. Insufflantur pulueres per corniculum & arundinem, qui præfenti vitio conueniant. Ad ventriculum & intestina

*In vêtre gula & primis intestinis.  
Crassum intestinum.*

prima per gulam aditus est: at quæ gulam purgent, lenta, tenacique materia illigari conuenit, vt obiter inhæreant. Intestinum crassius detergente materia in clysteribus expurgabis. In vesicam fistula argentea, qua calculi tentantur, primùm immittitur: quæ, vt locus patitur, amplius cauo pateat: in cauum clyster vesicarius introducitur, exprimiturque, vt liquor per canalem fistulæ ad vesicâ vsque perfluat: Rectis enim fistulis iniectis, ferè refluit atque disperditur. Iam verò medicamenta purgantia (quæ

*Qualia esse debeant.*

καθαρτικά appellant) modicè tergeant & siccent: detergenda sordes, quæ corruptela corporis con- crescit, & reliquiis alimenti colligitur. Exiccanda sanies, humidumque recrementum, quod stata naturæ lege ab alimento partis reliquum fit, & aliunde illabitur. Πυλικά peculiariter appellant ἀφαι-  
ρετικά τῶ ῥύπῳ, quibus vis detergendæ sordis data est. Hac parte vitanda sunt quæ adstringant, vnde sordes pertinaciùs inhærent: quæ laxent, vnde robur partium elanguescat: acria, quæ colluie

*Que v. i. d. d.*

sordium cauum impleant. Sale & eadem materia ideo abstinendum, quia vt detergeat, adstringit tamen, sordes impingit, & vellicat. Hæc autem ita audire necesse est, vt ad purgandi rationem omnia

*Sale & similibus quare abstinendum.*

referantur. Nam si serpit vlcus, si putredo est, quæ vicina depascitur, si quid occalluit, si quid influit & phlegmone est, medicamentum ita comparandum, vt ex iis quæ laxent, reprimant, mordeant, quæque detergeant, tam multis semel casibus medeatur. Sed omninò in purgando vlcere, prima quidem ratio totius corporis haberi debet, quia vel incolume, vel plethoricon, vel cacochymon est: deinde peculiaris natura partis requirenda est: quia humida ea, aut sicca, acri vel stupido sensu prædita est. Postremò animaduertendum, nunquid alieni vitij vt calli, rheumatis, phlegmones, doloris, vitiosi succi, putredinis, aut aliquid generis eiusdem vlceratæ parti aduenerit. Itaque vt ea sunt omnia & sordes vlcerum, ita qualitas remediorum distinguere debet. Adde quòd vel recens, vel inueteratum malum est. Molli corpori, recenti malo, nimium neque sordido, neque humido, parti præterea sensus acrioris, leniora remedia conueniunt: multò magis si in vitiosis succis æger est. In contraria conditione, contrariis auxiliis locus est. Quòd si pars aliqua tumoris maturuit, & pus reddit, alia verò etiamdum cruda est, huic quæ concoquant, purulentæ quæ repurgent, imperabis. Eadem ratione si quid durius, malactica: si quid inflammatum, lenientia suis quæque locis accommodabis: alioqui pharmacum è multis temperabis, quod iis omnibus querelis satis esse possit, qualia sunt Græcorum πολύχρηστα. In purgando plurimum valet recta ablucendi ratio, de qua breuiter nobis dicendum est. Vbi ergò molliore flocco tum sinum ipsum, tum labra exterferis, si præterea conuenienter abluas, magnopere cura-

*a*  
De ratione  
ablucendi vlc  
ceris.

tionem adiuuabis : vt ad reliqua per se natura interdum sufficiat. Itaque si sanies acris est, serò: si copiosa sordes, melicrato : si multa simul & acris est, sero, in quo sacchari octuplum, vel tantundem mellis diffusum sit. Cùmque cœperit cauum esse purius, œnomelite : pòst etiam vino è dulci austeriusculo vtendum erit. In fœtido sinu, putri & cruento oxycratum conuenit. Acetum, oxymeli, œnomeli, dilutum marrubij, absynth. aloës, myrrh. pauculo conditum melle, putredines efficaciter iuuant, & nomas cohibent. Nomæ sunt vlcera quæ in ambitum partes arrodunt, depascuntur, ac præterea putrilaginosæ sunt. Eidem medetur malo marina aqua, vel in qua subduplum salem illiquaueris. Vrina quoque veteri exemplo, & quotidiano vsu ad eam rem laudata est. Rustico è neglecto vlcere digitus in pede computruerat: is Galeni consilio, conserpro linamento vlcus impleuit, conuenienter alligauit, & quoties incescit meiendi cupiditas, propria viina perluit, atque ita persanatus est. Quod exemplum retineri potest in pudendis, & aliis partibus corporis, quas sine pudore perminxeris. Vrina sit non quæuis, sed cuique propria: nec hæc quidem cruda & aquosa, sed suo diluta sero, & iustabile colorata. Salsugo piscium eodem authore commendatur. Sed hæc leniter adstringit: at putridum vlcus sæculenta sorde plerumque impingitur: videndumque ne astrictione sordes illa crassior magis inhæreat. Ex quo putridis adhibenda præcipiunt, quæ tergeant, discutiant, tenuent, aliquando etiam quæ repellant, quæque adstringendo siccant, vbi tenuis est sanies, & fluxio infestat. Fraxini

*Contra putredines.*

*Noma. C*

*Vrina.*

*Historie.*

*Salsugo piscium.*

*Ad putrida.*

*Fraxinus.*

folia molliuscula coquantur aqua, vnde cancrofa eluantur. Sic enim lenies, ficcabis, absterges & discuties. Lixiuum deterget, ficcet, tenuat, digerit. *Lixiuum.* Itaque in crassa forde & putredine, magnus lixiuij vsus. Paretur è materia quæ detergeat, ficcet, incidat, discutiat, & si efferatur malum, ea etiam quæ acrimonia mordeat, quale saponarium. Saponem *Sapo.* veteres confecerunt ex seuo caprillo, hircino, veruecino, bubulo, & lixiuio cum calce: qui acriter relaxet, sordes expurget, detergeat, ficcet similiter nitro. E cinere fagino & seuo alij conficiunt. Quidam è calce, sale, oleo & seuo interim permixtis aromatibus. Isque modò liquidior, modò solidior, comparari potest. Atque omninò inde lixiuium expurgandis sordibus putridorum vlcerum idoneum est. Eodem modo è tithymalis, dracontio, *Materia lixiuiorum.* fico, bryonia, batrachio, ostreorum & metallorum acrium cineribus. Vtuntur etiam capitello, quod capite de pyroticis describitur. Vrina ergò & iis lixiuij generibus vtendum erit in putridis, fluxis, humentibus, & malignis vlceribus: tum etiam ænomelite, in quod cinerem calchanthi, vel cremati vitrioli resperferis. In eundem vsum cinere caricarum liquida puluerantur: nec improbandum ligni sancti remedium. Alij ænostagma probant, quia ficcet *Oenostagma.* & putredinem prohibet, magis etiam si tantillum *ma.* cremati mellis accesserit. Nam vbi in multo humore vlcus est, crematum mel, aut è meliteis vasis *Mel.* deterfum & aridum magis conuenit. Ac dum crematur, aloë, myrrha, centaurij puluis, inspergi potest, quoniam tempore summouetur igne. Idem succo marrubij, plantaginis, absynthij, apij & similium

# INSTIT. CHIRVRGIC.

aptè perfunditur : sic enim canculos, gangrænas, putredines, facillè prohibet. Vulgus fenicula, bugla, cætaurio & plantagine, plurimùm vtitur in melle, vt cum hoc succus ex herbis pressus percoquatur. Ne-

*Vtendū vul-  
gi remediis  
adhibita ra-  
tione.*

*In nomis &  
malignis vl-  
ceribus qui-  
bus vsi sint  
veteres re-  
mediis.*

que turpe est per vulgus & aniculas profecisse. Nō enim puduit maiores nostros in multis remediis brutorū discipulos sese profiteri: sed acceptis è vulgo remediis adhibenda ratio & rectus vsus, in quo summa artis posita est. In nomis, phagedænis, Chironiis & omnino malignis vlceribus, veteres vsi sunt iis, quæ & detergeāt & adstringant, sed hæc rectè diluas, vt liquida infundātur. Aqua aluminosa, vel in qua malicoriū, myrrha, balauſtia, cæteraque eiusmodi coxerint, id genus vlceribus accommodanda sunt. Ægyptiaca in liquidis dissoluuntur, aliæque id genus. Verùm matutino meliùs adhibentur, tum quæ cōstringant, tum quæ mordeant, quo iam tempore diffluit corpus, ne adstrictione excremēta cohibeantur, & acrimonia pertrahātur in vulcus. Præstabit quoque detergente materia priùs expurgare, quàm astringētia instituas. Lixiuium è calce sæpiùs elota terget & ficcet, nec sine re laudatū est. In cal-

*In callosis.*

*Ad cance-  
rosa.*

*Absynthij  
succus.*

*Meliceratum  
& similia.*

*Quomodo v-  
tendum ca-  
thartica.*

losis, ægrè cohærētibus, cuniculosi, nimium sordidis, ex cinere ficus, tithymali, aliisq; id genus lixiuiū fit, quo sinus quotidie perfundātur. Aqua è larigna, terebinthina, resinis ferè omnibus extillata, tergendō idonea est : lixiuium ex oliuæ nucleo, cancerosa tollit. Succo absynthij siccabis, exterges, astringes, & roborabis. Melicrati & eorū quæ mel, vel saccharum recipiunt, modus est, vt sit decupla, octupla, sexcupla, aqua. Eo dilutiore vtendū erit, quò sinus putior: acriore, quò sordidior. In vlcere satis expo-

sito, linteolum prius pharmaco insuccandum, leuiter exprimendum, insinuandum cauo. In humidiorē exactissimè triti puluisculi resperguntur. In sicciore, & quod sorde offarctum est, diuulsa linamenta, vel sine his pharmaca mollia imponuntur: ex quo bene carminato vellere os vlceris obstipandum est: deinde superdanda mollis spongia, vel complicata linteola, vel deniq; quod patria lingua, & iam vulgari Cotton appellatur, vt inde tota vlceris regio cōprehendatur. Atque hæc omnia vino inculcabis, & expressa superpones: postremò artificiosè colligabis. Omninò tamen cauendum erit, ne quid durius, grauius, asperius, vlceri incumbat. In fistulis & altioribus lacunis, quod superdatur spleniū, in decussē vel crucē discinditur, vt sit quā sanies effluat, atq; ea parte diuidi melius est, qua os vlceris in decliui tangit. Poterit etiam linoxylon molle obduci splenio, qua parte diuisum est, ne sanies molestè diffluat, & subiecta corpora inquinet, sed cōbibatur. Omnia commodè obliganda sunt, vel vt cōtineas, vel etiam vt reprimas. Accidit aquando vt longior turunda extrema parte neruum aut dolentem particulam attingat, atque exasperet. Quare ea decurtanda est, & ima parte intingēda remedio, quod & lentum sit & leniat, reliqua verò detergente auxilio illini debet: quæ si parum etiam videatur, quia non penetrat in alueum quā vlcus desinit, iniectis liquidis medicamentis sufficiens erit, quod deesse videatur. Postea verò quā tēpus redierit, in quo vincula soluantur, atque reuellantur indita medicamenta, recognoscendum fideliter, quanta qualisque fordes prius fuerit: quanta, qualisque in præsentia sit.



Nam si iā minor & cocta appareat, bene est. Optime verò, si purum vlcus est, & iam aliquid laudādæ carnis succreuit. At si solito magis sordescit, & nihilominus crudum est, distinguendum hoc modo. Nam si cauitas maior, nouus calor, rubor & dolor, adfuerint, id acriori medicamento attribues. Temperabis ergo cerato rosaceo, si maior calor: si verò flaccidū vlcus & humidum, myrtino. Quòd si nihil horum extiterit, non calor, rubor, dolor, sed tantum sordes vberior prouenerit, imbecillius est pharmacum, quod adiecto melle exacues. Sed aliunde humor interdum affluit, vt in rheumaticis vlceribus appellatis: nonnunquam in largiore cibo & potu peccatū est, quibus mederi prius necesse est, quàm vlcus purgari possit. In humore nimio siccantem pollinem consperges, & mollibus pharmacis abstinabis. Aliquando verò nimium siccando, & contractum, & exuccū vlcus reperiēs: qua in re siccantia humido diluuntur. Inflammato vlcere sæpè initio recurrit materia, vt tenuis quædā sanies, lachrymæ similis, tantum effluat: vnde *δακρυώδες* vlcus appellatum ab Hippocrate. Vbi non medicamēto, sed vitio vlceris, ea res attribuenda est. Oculis, naribus, & palato aliisque partibus vlceratis, quas humor subinde alluit, vis medicamentorum aut acrior sit quàm vlcus postulet, aut sæpius cōmutetur. In contumacibus, solidiora pharmaca inseri possunt (si nō prohibet dolor) & platysmata suprà adhibētur. In summa iustam qualitatem pharmaci æstimabis, si purius vlcus inde redditū est: si naturaliter sentit locus vlceris, qui sensu præditus est: si modicè rubet: si nimium neque siccus, neque humidus est. At qui-

cunque sensu caret, aut non naturaliter sentit, quicunque nimium aut aridus, aut flaccidus est, quicunque albidus, pallidus, liuidus, aut niger est, is nondum purus est. Omnino verò siccandum vlcus est, quantum videlicet & ratio sordium, & natura partis ostendit. Alioqui infra modum siccato vlcere, fungus è membranis nascitur, aliunde excrescit caro, aut putredo contrahitur, in qua ad acria, mordentia, ignem quoque & ferramenta confugere sæpè necesse est. *Vermiculantia vlcera.* Accedit aliquando ad sordes, ut etiam vermiculatur, quo tempore aloë cremata conspergatur: veratrum album in tosto melle: pulvis pollij & absynthij in pice imponatur: nuclei mali perfici è persicariæ succo tusi: plantago arefacta, marrubium, centaurium minus, calamyntha, porrum: vesica suo felle plena, igne resiccatur, teritur, & inspergitur. In summa quæ amarore vermes enecant, & purgant sordida. Arida teruntur, & ita resperguntur cauo. Ex aliis succus exprimitur, melli vel aloë incorporatur, & aliquando simul omnia coeunt. *Ad canerose.* Eidem rei lixiuum conuenit, vrina, linamēta, ieiuni hominis salua tinctoria, cicer, orobus, lupinus, hordeum: vsta, trita & melli mista, vermes extinguunt, maligna sanant & Chironia. In canerosis cacti fluuiatilis cinis cum cadmia. Si cadmia deficit, tuthia vulgari crustacea, gleba æraria vsta tritaque, aut fuligine ex ærariis fornacibus vtilicebit. Meliora hæc omnia ex vino giluo, tenui, pellucido, leniter adstringenti, & odoro, diutius versata loco subdiali & obiecto soli, alioqui luculento foco. Irionis semen conlæuigatum melli: lens cocta cum melle. Mel in regula torrefit, & solani succo imbibitur. Ex virentis oleæ furculis succus

exprimitur: malicorium vritur. Semperuium, vmbilicus veneris, solanum, intybū, lactuca, psyllium, omphax, atriplex exuccantur, quod inde expressum fuerit, pistillo & mortario plūbeis diutiùs circumagitur, dum sit luti crassitudo. Pompholyx in pila plumbea diu versatur, atque paulatim affuso succo, qui conueniat, volutatur. Colocynthis vritur puluis pōpholygi permiscetur contra maligna & vermiculantia. Cerusæ è dracontio (gersam serpentariam vocant) ℥. i. calcis viuæ, ℥. iij. cum aceto pista iunctaque fictili cremātur: puluis expurgat caneros & curat. Fit autem ea cerusa hoc modo, quæ per se clementer purgat. Radicem verè colligunt, Galenus sub canicula: Dioscorides lauat: siccatur vmbra, aliquot post diebus secta in taleolas, traicitur acu quæ filum ducat, ex quo dependens vmbrosa domo asseruatur. Vfus tempore, trita inspergitur, & maligna curat: melli aliquādo, aut (ne acrior sit) cerato cōmiscetur. Sed vt inde cerusa fiat, vbi iam siccata, & in farinā trita est, vitreo vase includitur, in quo tantum sit aquæ rosaceæ (quod ῥοδόσπασμα vocant) vt enatet aqua: vas ergo viginti dies persolatur, & vt expirat aqua atque combibitur, ita noua refunditur: postremò farina illa exiccatur vmbra: vbi liquorem multum cōbibit, vsui reponitur. Eodem modo vmbilici marini, sales, ostreorum cinis, puluisculus iridis, os sæpiæ, aliæque generis eiusdem comparantur, & addita cerusa lota, gummi, mucagine, crinostagmate: bene mūdato lotoque adipe, anchusa denique ad fucos mulierum permiscentur. Ad canerosa ℥. litharg. ℥. ij. vino giluo, tenui, odoro, leniter astringente vel aceto, si quid est calli, immerguntur,

*Pompholyx.  
Cerusæ è dra  
contio.*

*℥ litharg.  
℥ cerusa.*

merguntur, ex eoque quotidie in sole vel igne conteruntur pistillo plumbeo & mortario, idq; diebus octo vel pluribus. At quoties tritura reperitur, vinū & acetum mutari debet: tantò efficacius pharmacum est, quantò plus liquoris rapuerit. Hic rursus oxelæon ad scilibrā iniicitur, ex quo diu trita lithargyrus excoquitur puro carbone. Iam nō inquinanti, cerusæ semūcia inspergitur, mouētur omnia, & sedulò commiscuntur. Sunt qui cineris ostreorū ʒ.ij. adiciant. Ex eadē materia Ricotia barbarorum conficitur. ℥. lithar. triti & cerusæ ana ʒ.ij. ol. myrt. vel rosaceo concorporatur, & si lubet, succo plantaginis vel solani imbuuntur. Psoricon Mesuræ medetur cancris, fistulis, lepræ, scabiei siccæ, putrida depascitur: superioribus pharmacis acrius est. Item, ℥. litharg. argenti, calchanti, vel vitrioli ana ʒ. j. arug. ʒ. j. teruntur vno die in sole æstiuo ex aceto acerrimo, quod paulatim respergi debet: deinde cōduntur omnia vase vitreo, & ad quadraginta dies sub fimo obruuntur. Ἀγρομυρόλυγος medicamentum est veterū & recentiorum, quod contra cācros vsurpari potest. Vrticę semine & foliis vtriusque tritis, aridis, infriatis Galenus vsus est ad gāgrynas & cancos, quia modicè calfaciunt, siccant, digerunt, tenuium sunt partium, nec mordent: qualia gangrænis & cancris cōueniunt. Sed vbi calor est, refrigerante succo qui per se conueniat, temperari debent. Gangrēnē cōpunguntur, scarificāturque, vt oppressis spiritib⁹ liber anhelitus reddatur: iisdēque iuuantur remediis, quibus & cancri, & putredines. Putrida curantur melle scyllitico, cui intritus sit puluisculus ellebori. Aristolochia rotūda extenuat,

*Ricotia.**Psoricon Mes.*

*Facultas querendæ medicamentorum ad gangrænas & cancos.*

*Putrida que curent. Aristolochia.*

putredines sanat, repurgat sordida, ad quæ efficacior est, quàm longa. Hyperici semen aridum, commistum melli, putridis & iis quæ in multo humore sunt, medetur. Erysimi semine ad cancrofa, putrida, gangrænas similiter vtendum est. Sabina iisdem remedio est, & atra iuuat: verùm tum hæc, tum quæ acria sunt, rebelli ac nimium contumaci vitio accommodare melius est. Quod genus vlcerum vim acrium medicamentorum sine noxa perferre potest. Nam cum recenti malo, dolente atque inflammato, clementius agendum est. Computrescebat & humore

*Sabina.*

*Historia.*

soluebatur medij digiti manus articulus, cui Galenus initio cataplasmata induxit è farina hordei in lixiuio pista: vicina verò sursum versus tensa & dolentia inflammato oleo calente fouit. Postea verò quàm dolor acquieuit, calorq; extinctus est, ex orobi farina eodem lixiuio iuncta cataplasma compegit, atq; is tandem sanatus est. Ita in articulis & nervosis partibus, tum etiam aliis quæ putrescant, farina (vt dolor est & calor) commutanda: quæ si non prohibet, è lupinis & ciceribus extundi potest. Subiguntur autem cataplasmata modò lixiuio, modò oxycrato, & in dolore ænomelite, aliquando etiam

*Cõtra putredines articulorum, nervorum, &c.*

*Vsata veteribus contra putredines.*

aceto mulso vel aceto. Marrubio, scordio, centaurij minoris cauliculis vti solitos veteres cõtra putredines Galenus author est. Aloë, myrrha, absinthio, apio amaro, melle tosto ferè vsa est posteritas. Plantago rebellia, rheumatica & putrilaginosa sanat. Ac ferè inuenias veterem medicinã triplici genere remediorum pugnasse cõtra putrida. Frigidis enim & astringentibus aliquando vsa est, vt plantagine: admodum calidis, sed quæ non mordeant, vt vrtica:

*Tria genera medicamento- rum contra putrida.*

acribus ac iam mordentibus, vt Sabina: ac singula genera singulis vlcerum differentiis accommodāda ſunt. Initiis enim putredinū vbi calor & dolor eſt, frigida illa conuenient. Vbi inualuit putredo & cōtumacior eſt, ad acria decurrendū. In media conditione, medium genus vtile eſt: in quo anethi ſemen eſt vſtum, tritum & inſperſum. Ex officinis ærariis, ea ſcoria colligitur, quæ fuſo ære relinquitur, è vino tenui quod ex aſtero dulceſcat, diu cōteritur: quadruplo melli torrefacto permiscetur, ſingulari remedio inani, oris & genitalium vitiis, magis etiam quum putredo depaſcitur. Colligi poteſt ea ſcoria, nō ſolū in primariis illis fuſuris glebæ ærariæ, ſed vbi cūque æs collectaneum iniecto lapide, quem calaminarem vocāt, refunditur. Melle myrtino gingiuarum putredines cohibentur. Contra putredines & nomas. ℞. aluminis vehementer triti, ꝑ. ij. ſalis ꝑ. j. mell. ꝑ. j. omnia coniuncta cremantur olla: vſtis, tritiſque, ꝑ. iij. tritæ ireos immiſcētur. Alumen per ſe vſtum, tritūque contra eadem mala inſpergitur. Aliud. ℞. aloës, myrrh. ana ꝑ. j. trita iunguntur ſucco plantag. & abſynth. dum ſit luti craſſitudo. Vitriolum vritur, diūque ex aceto tritū circumagi- *Vitriolum* tur: hīc ſiccatur: ſiccum è vino ſubigitur, rurfus ſiccatur: puluis citra morſum ſiccatur, & putredines adiuuat. Eodem modo macerari poſſunt acria metallica, vt ſiccant, nec ita mordeant. Chamæpytis, cu-preſſi nuceſ & folia, putrida, flaccida, & atra inuāt. Oſtreorum, buccinorū, teſtularum, oſſium, ſæpiæ cinis ex oxycrato, & aliis cōtra eadem valent. Sunt qui, dum ea cremantur, quartam partem ſalis immiſceant. In calore & phlegmone, alterci ſemen albū

# INSTIT. CHIRVURGIC.

cum dupla farina tosti hordei vel auenæ, vsurpan-  
 dum. Atque hinc poterit ex ænomelite, vel oxycra-  
 to cataplasma fingi. Arida radix cucumeris agrestis,  
 fici folia, ellebori fibræ, vnumquòdque tritum, &  
 melli mistum, iisdem vitiis auxilio est. E radice gen-  
 tianæ & enulæ, cerusa factitia, qualis è dracontio  
 descripta est, mirificè prodesse potest. Scilla simili-  
 ter cum melle cocta. Cinis è lana succida mollibus,  
 flaccidis, malignis vlceribus vtilissimè inspergitur,  
 atque efficaciter siccatur: eodem modo è pilis anima-  
 lium vtilis siccando cinis comparatur. Ad putrida.  
 ℥. vitrioli vsti, & vt priùs, confecti ℥. j. elaterij & se-  
 minis lini torrefacti ana ℥. j. terantur omnia. Isido-  
 ri Antiochæi ad gangrænas, nomas veteres, & ma-  
 lignas putredines remediũ. ℥. litharg. ℥. β. ærug. ℥. j.  
 olei veter. vel ricinini ℥. ix. metallica trita cum vnc.  
 quatuor, & semisse olei clementi foco coquito: ver-  
 sato spatha, vel manubriolo ex enulæ radice, cucu-  
 meris agrestis & gentianæ, idque donec viride fiat:  
 hîc in mortarium data omnia volutato: ex quo in  
 cacabum reperita, cû pari modo olei recoquito, dũ  
 sit melinum pharmacum: tum in pilam reuocato,  
 & circumagito: deinde redditum foco tertio exco-  
 quito, vt ruffum appareat, & in mortarium reducta  
 subigito. Postremò iam quarto coquito cum pari  
 oleo, omniâque vt priùs, facito. Andromachi ad ea-  
 dem. Litharg. vnc. ix. calcis viuæ, aris cremati, thu-  
 ris, terebinth. aristolochiæ rotundæ, ana ℥. iiij. picis,  
 cere, ammoniaci ana ℥. vj. liquabilia seorsum fundi-  
 to: de inde metallica vino tenui & odora tincta, tri-  
 tâque immittito: omnia in mortario contundito, &  
 fideliter commisceto. In putridis, depascentibus,

Isidori ad  
 nomas, gan-  
 grænas, &c.

Androma-  
 chi ad eadẽ.

& grauiter olentibus, vocato puluere angelico, arrhenico, crudis vitriolis, aliisque id genus vtendum erit. Ea in tenuissimum pollinem trita, & extremo specillo capta resperguntur, ex quo linamentum simplex, vel liquore, qui conueniat, madidum, superponendum. Atque hinc ubi aliis remediis nihil profeceris, ferro & igne purgandum est. Efficax medicamentum Lucij Cathægetæ ad malignas putredines & nomas. ℞. sulphuris vini, auripigm. squamæ æris ana drach. 2. æris combusti, drach. dimidiam: trita omnia insperguntur: mollius est, si in melle rosaceo adhibetur. Arido vtendum magis in humore multo: in siccis temperatur rosaceo. Ægyptiacis quoque vti licebit. Atque hæc quidem obiter, neque tamen præter institutum, contra cæcos, gangrænas, putredines, nomas, vermes, nigredines, quæ ad purgandi, siccandi que rationem, atque omnino percuranda vlcera pertinent. Nunc autem ad peculiarem materiam veniamus. Repurgant melle tincta linamenta: aridum mel quod melitæis vasis inhæsit: mel rosaceum, quod etiam reprimat & calorem attemperat. Sacchari eadem ferè vis est: terebinth. cum melle & rosaceo pari mēsurā. Eadem cum butyro, neruis utilis est. Iris serpentibus vlceribus & forde plenis, gentianæ radix & enulæ. Marrubij succus & fœniculi cōditus melle, mucago fœnugræci tincta rhodomelite, oculorū vlceribus idonea sunt. Melissophyllon marrubio imbecilius est. Ærugo tosta, lotaque, æris squama, ac ferè reliqua metallica, similiter cōparata citra morsum siccant, quædam etiam detergent: æs, stibiū, antimonium

*Materia**purgans.**Metallica.*



# INSTIT. CHIRVRGIC.

*Caprillum  
stercus.*

& cuperosæ genera referunt. Caprillum stercus ex-  
ustum & è vino pistum desperata sanat. Trochisci  
è calce maligna iuuant: calx viua trita quadruplo  
melli commiscetur: ex quo finguntur orbiculi, qui in  
figulino ordine collocati, & in fornacem dati con-  
cremantur. Inde puluisculus inspergitur, qui longè  
clementior fuerit, si vino vel aceto eluatur, vt citra  
morsum tergeat, & siccet. Eadem arte multos pa-  
stillos conficias, è calce, melle & metallicis. Chiro-  
niis, hoc est valde malignis, aliquando satisfaciunt  
cicer, orobus, faba, hordeum, auena, fresa omnia &  
melli infriata, vel per se respersa cauis. Eadem lupi-  
norum vis est, qui in cinerem, molli igne vsti, mali-  
gna vlcera tibiæ purgant, implèt, cicatrice clau-  
dunt. Ad eadem valent radix asphodeli, ari, & afari,  
ostreorum testæ & volumina cochlearum. Vrun-  
tur omnia figulari clausa, deinde etiam lauantur  
vino, siquidem acrimonia deterenda est. Polium  
aridum rebellia sanat. At hoc scabiem expurgat, &  
maligna curat. Ellebori albi vnc. i. litharg. sesquun-  
cia: litharg. in olei vnc. 4. & aceti vnc. 2. coquitur,  
dum non inquinet: subductis igni, elleborus pau-  
latim inspergitur, commouentur spatha, & sedulò  
permiscentur. Ligustri nostri & minoris plantagi-  
nis folia affuso omphacio teruntur, asperguntur sa-  
le, succus exprimitur ad maligna colis vlcera. Sed  
vbi quæ mordeant partibus adhibentur, quæ inflā-  
matæ celeriter putrescant, purgato corpore & iei-  
uno vicinia repellètib; obstipāda est. Erinacij cinis,  
amygdala, stæchas, anagallis, aristolochiæ radix,  
gentianæ, enulæ, cyperi, vrticæ semen, & irionis: hu-  
midiorib; vlceribus, cācrofis, putrilaginosi, gāgræna

*Contra sca-  
biem & ma-  
ligna.*

& liuore tinctis, mirificè profunt. Radix dipsaci in cinerem crematur, aut in vino ad melliginè coquitur. Solani radix excorticatur, siccat, cortex, cancris, & nomis auxilio est. Cōtra eadē, succo & trita herba vtimur, multò magis vbi calor est. Minium quod è sulphure & hydrargyro nostro fit, depascēdo purgare potest, nisi vstura & lotura maceretur: sic enim clementius futurum est, vt quod è sola cerusa vsta cōparatur, vel plumbi gleba sterili, quòdque veluti arena in venis argentariis colligitur, aut paratur è syrico. Cerusa trita cribro traducitur, & in fictili patella coquitur syncero igne, donec rubeat, & sandicis colorem trahat: idque alij sandaracham, alij sandicem vocant. Quidam etiam syricō. Et qui sandaracham, ex hac & rubrica sandicem fingunt. Ex sandice & synopide syricon, omniāque siccando conueniunt. Ad diuturna & malefica vlceratibiarum, vbi siccandum atque digerendum. Sandicis lib. 1. olei dulcis lib. 2. coquantur lento igne, dum non inquinent. At si qua sordes, ea detergenda priùs est. Ad cancrofa & malefica, cerusæ è draconio, vel radicis dracōtij, vt priùs comparatæ ʒ. 3. calcis viuæ ʒ. 1. cum aceto fingantur magdalię, quæ in olla concrementur, vt inde puluis inspergi possit. E filicis radicibus quæ tergeant, & leuiter astringant, cum melle medicamentum fit conueniens iisdem vlceribus. Quæ ex ærugine parātur cruda, vsta, lota, vsu frequentissima sunt, qualia Ægyptiacæ ac in purgando cruda ferè ærugine vtendum erit, multò magis si valde sordida, si putrilaginosa, si maligna vlcerata curanda sunt. Quòd si non adeò graue vitium est, vsta quidem licebit vti, aut tātum

*Minium.**Sandarachæ.**Sandu.**Syricon.**Ad vlceratibiarum.**Ægyptiaca**arugo.*

lota: vsta verò & elota implendo cauo atque glutinando magis idonea est. Temperatur cerato, octuplo, decuplo, duodecuplo, & aliquando terebinthina permiscetur, quæ vt ad æruginem, similiter cerato habet octupla, decupla, duodecupla. Quâquam ea ratio variè commutari potest, vt sunt vlcera & corpora. Ceræ terebinth. ana.  $\mathfrak{z}$ . i. olei  $\mathfrak{z}$ . 4. liquefactis adde æruginis  $\mathfrak{z}$ . 1. 2. 3. Quantò plus receperit æruginis, tantò acrius pharmacum futurum est. Aliud. terebinth.  $\mathfrak{lb}$ . 2. ceræ  $\mathfrak{lb}$ . 1. rosacei  $\mathfrak{z}$ . 3. aut. 4. fusis permiscetur æruginis  $\mathfrak{z}$ . 2. vel tres, vt magis siccet atque detergeat. Ac iam deterfa sorde, quum iam regeneranda caro, vel glutinandum vlcus est, minuetur ærugo, vel cerati & terebinthinæ modus inaugebitur. Atque omnino medicamentis quæ ex æruginem & acribus metallicis conficias, vis obtundi potest, si cerato aliisque id genus temperentur, si crementur, lauentur, si denique diutius excoquantur: vsturæ ratio ex Dioscoride, & aliis petenda est. Ab eodem loturæ formula explicatur, Lauantur vino, vt impleas & glutines: aceto, vt tenues, penetres, repellas. Cruda melius expurgant: vsta tenuiora sunt, magisque discutiunt: lota omnino clementiora: vsta, lotaque præstantissima sunt, vt sicces quidem, nec mordeas. Si lauatur aqua, ea sit pluuia, vel æstiuæ, vel quæ tonante cælo defluat. Ærugo sublati igne aliis inspergitur, vt viride & acrius pharmacum relinquatur. Circa initia indita, gilua facit, & dichroma colore ambigua. Diutius cocta æruginem etiam redduntur ruffa, minusque acria medicamenta: mitiora quoque, si diutius lotura repetatur, & multum vini ærugo combibat. Litas Græci ferè ap-

*Nota de metallis.*

pellant medicamēta, ex ceræ & terebinthinæ æquis partibus, æruginis octaua parte, decima, duodecima, sub duplo thure, ad modum æruginis, & aliquando oleo addito sesquialtera ratione ad æruginem. Ceræ, terebinthinæ ana  $\mathfrak{z}$ .i. æruginis  $\mathfrak{z}$ .2. thuris,  $\mathfrak{z}$ . dimidium, olei sesquidrach. sed ferè oleum adiicitur, cum sine thure & aceto conficitur pharmacum. Aceti verò vsus est, vt ex eo ærugo diutius versetur. Maleficis cōuenit, æruginis  $\mathfrak{z}$ .i. squammæ æris  $\mathfrak{z}$ .2. aceti  $\mathfrak{z}$ .8. mell.  $\mathfrak{z}$ .2. metallica in sole tandiu teruntur ex aceto, dum hoc consumptum sit: mel adiicitur, coquuntur omnia dum ruffescat pharmacum. Clementer purgat ex mellis & terebinth. pari pondere: paulò efficacius, addita ærugine priore ratione. Maligna iuuat. litharg. lib.1. coquitur in aceti lib.1. olei veteris lib.2. iam inspissatis, adde ærug.  $\mathfrak{z}$ .1. coquantur omnia dum ruffum colorem trahant. In rheumaticis & humidioribus mel. lib.1. aceti se- libra, æruginis  $\mathfrak{z}$ .1. aluminis semuncia, coquuntur reliqua: postremum alumen inmittitur, tandiu permittuntur dum ruffescant. Atque omninò in his modus sit æruginis, vt ne mordeant. Multa alia viridia & gilua ex ærugine lib.2. de cōpositione medicamentorum  $\chi\tau\gamma$  γέν. Ægyptiaca recentiorum *Ægyptiaca recentiorum.* multis emplastris veterum ex ærugine respondent. Vnguentum de melle, aut Ægyptiacum magnum Mesuæ, vlceribus malignis, putrilaginosi, cuniculosis cōuenit. Sed hæc præscriptis modis macerata ærugine, moderari licet. Cera viridis, arida & infriata, aut ( si res postulat ) soluta rosaceo deterget. Ægyptiaca, aloë, myrrha, vsto alumine, radicibus aristolochiæ, gentianæ, enulæ, & aliis id genus aridis

# INSTIT. CHIRVRGIC.

tritis cōſperguntur: ſiccantur in tegula, puluis inde muccoſas carnes putridas, præhumidas corrigit, & teſtulas oſſium elicit. Papaueris cornuti folia, & flores admodum ſordida vlcera & rebellia iuuant: ſed his, vt aliis omnibus quæ valde tergeant, abſtinen- dum in molli corpore, nec ita ſordido vlcere: ſiccā- tur illa, & inſpergūtur. Archigenes inſperſis puluiſ- culis, floccum è diuulſo filo, imbutum frigida vel ſubauſtero vino ſuperponebat. Squamæ, æruginiſ- ana  $\mathfrak{z}$ .i. ceræ  $\mathfrak{z}$ .6. larignæ aut terebinth. liquidæ ſeſ- quuncia: in minùs malignis, dimidio minuēda me- tallica. In tumentibus vlcerum labris reſinæ loco, æſypus, medulla cerui vel vituli permiscēda: medi- camentum in platyſmate totum vlcus comprehen- dat: vicinæ partes parygro recenti, vel alio medica- mento, quod phlegmonem arceat, muniantur: ter- tio quoque die reſoluitur platyſma. Ex ærugine & cremato ære medicamenta conficiuntur ad mali- gna: conſcorporantur illa modò cera pingui, modò cerato myrteo vel roſaceo, atque par metallorum modus eſt. Ceratum paulò vincat metallica, quod aliquādo quoque larignam, vel terebinthinam ha- beat ſubdupla ratione ad ceram, & alumē ſubqua- druplum ad metallica. Aerurg. æris cremati ana  $\mathfrak{z}$ .i. aluminis ſemuncia, ceræ ſequuncia: terebinth.  $\mathfrak{z}$ .6. olei myrtei ſemūcia. Plura generis eiufdem quarto de compoſitione pharm.  $\chi\tau^1$  γένη. E farinis hordei, fabarum, cicerum, orobi, lupinorum, melle & tere- binth. conſcorporatis, ſordes extergebis. Farinæ  $\mathfrak{z}$ .3. ſucci apij, abſynthij, marubij & ſimiliū, vnus lb. i. mel.  $\mathfrak{z}$ .9. ad iuſtum corpus decoquantur. Al. Hor- deacea in duabus partibus aquæ, vna mellis roſacci

*Papauer cor-  
nutum.*

*Aſclepiadi.*

*Ratio confi-  
ciētiſ cathar-  
tica ex æru-  
gine & me-  
tallicis.*

*E farinis.*

percoquitur: purgat, lenit, calorem temperat. Farinae in memoratis succis coctæ, contra caneros & fistulas valent, in laboribus neruorum terebinthina commodè permiscetur: myrrha & aloë in putredine, quæque contra putria descripta sunt. In calore, hordeacea & sabacea præferri debet. In aliis è fœnugræco, ciceribus, orobis & lupinis melior est. Amicissimum neruis quod sequitur. ℞. resinæ, mell. *Amiciss.*  
 terebinth. ana ℥b. myrrhæ, sarcocollæ, farinae fœnugr. & seminis lini ana ℥. i. ireos semunc. Aliud *neruis.*  
 quod in pure crassiori vsurpandum est. Galbani, *In pure crass.*  
 ammoniaci, resinæ, terebinth. sepi taurini, ceræ, olei *so.*  
 veteris ana part. æqual. in aceto mersa, paulatim fundantur igne. Aliud quod purgat, siccatur, fistulas *Pulvis*  
 curat & glutinat. ℞. iris florentinæ ℥. 5. farinae oro- *Ocellanij.*  
 bi vel cicerum ℥. 3. mannæ, thuris, calcis viuæ ana ℥. 3. aristoloch. ℥. 3. & semiss. fiat pulvis: in fistulas  
 vêtulo factò immitti potest: alioqui in liquida medicamenta quæ fistulis conueniant, respergitur. Viride ex  
 ride ex herbis vetera vlcera repurgat, excreſcentem *herbu.*  
 carnem reprimat & cicatricem ducit. Chelidoniæ, plantaginis, scabiosæ, lybistici, vrticæ, ormini sylvestris, ana M. i. cōquassata septem diebus in oleo macerentur, in eodem cocta exprimantur: expresso succo, adde ceræ ℥. 3. terebinth. ℥. 6. resinæ ℥. i. simul bulliant dum fiat corpus. Subductis igne adde sarcocollæ, aloës ana ℥. i. aristolochiæ longæ, aruginis ana semunc. aluminis ℥. 6. sed iniquius pondus est: fiat vnguentum. Vnguentū apostolorū ferè respōdet veteri antiquorum: qui hoc vsi sunt attrahēdo, molliendo, glutinando, & contra ferarum morsus: quod quia variè describunt, ex Aëtio vertimus

# INSTIT. CHIRVURGIC.

thure addito, & myrrha, vnde clementius futurum est. ℞. litharg. ℥. 25. ammoniaci ℥. 9. Colopho. ℥. 16. æruginis, galbani ana ℥. 2. bdellij, opopanax ana ℥. 3. aristoloch. thuris mascul. ana ℥. 6. myrrh. ℥. 4. ceræ, ol. ana ℔. 2. Lithargyrus oleo coquitur, media ebullitione inditur ærugo (recentiores decoctionis sine, vt melius purget) vbi non inquinant, Colophonia inspergitur: summotis igne, reliqua ex aceto trita immittuntur: postremò versantur in mortario, & permiscuntur. Nostri terebinthinā addunt, & maiorem modum æruginis: ideóque purgando efficacius est. Al. Mellis cocti lib. 1. thuris semuncia: myrrh. ℥. 2. efficacius è crudo melle, additisque æruginis & resinæ ana ℥. 1. Plura primo, secundo, quarto, & quinto, de compositione pharm. κτ' γένη decimoquarto & decimoquinto Aëtij.

Pronidendum autem, vt ne malè purgatum vlcus coëat. Hippocrates cuneolos è spongia aut plumbo ori fistulæ inducebat: nostri & spongiam & gentianam & Syphones, vel tubulos, quas cannulas appellant. Ac liquabilia quæ *τηκτὰ* vocant cuniculosis vlceribus & fistulis iniiciuntur, penna vesicæ alligata, vt Hipp. vel cornea fistula vesicæ iuncta, vt Gal. Nostri melius fistulis quas syringas vocant: veteres oriculariis clysteriis, aut vesicæ loco, sacculis coriaceis vsi sunt. Arida verò *ξύρια* dicta corniculis inspirabant, aut illitis penicillis lentore aliquo inspergebant, penicillos autem è filo contexebant, fingebant è scirpo. Nostri è plumbo fistulas conflant, illinunt vnguinosis auxiliis, candelas cereas immittunt, aut has mistis Ægyptiacis, cera viridi & aliis conficiunt.

**Q**Uod iam purum, quódque ἀσπίσαντες vlcus est, carne impleri debet. Actale quidem est, quod fordibus purgatum, modicè siccatum, sine rheumate, dolore, phlegmone, callo, intemperie constitutum est. In summa cui nihil accidit, quò minùs impleri possit. Híc ergo carnem regenerabis. Sed hoc naturæ opus est, quæ carnem è sanguine conficit. Oportet ergo tantum talémque sanguinem naturæ suffici, vt inde carnem procreet: instituenda vitæ lex, cibi boni succi, vitatis acribus: auis, venatio, suilla elixa dari potest. Vinum in dolore & phlegmone alienum est, datum alioqui modicè, nec ita vetus, vt iam acre sit, aliquândo prodest. Reliquum verò sarcoticis medicamentis perfici debet. Quæ reuera sarcotica sunt, iustam materiam naturæ comparant, modicè detergent, siccant primo gradu: vel ita vt ne nimis calesfaciant. Nam quæ vehementiùs exergeant & siccant, primùm quidem ac per se, rhyptica & cathartica appellantur: deinde verò ac secundariò sarcotica: & colletica dici possint. Quin & cephalica sarcotica quædam sunt, sed paulò acriora, quàm vt reuera in sarcoticis statuantur, nisi vim siccandi emollias, & acrimoniam hebetes: vt eorum quæ purgant, asperitatem lenias. Sic enim carnem regenerent. Itaque ceratis, oleo, & similibus temperentur. Ac cerata dupla, tripla vel quadrupla sunt, vt molle, durúmque corpus, & medicamentum læne, vel ásperum, acre vel moderatum est. Quale fuerit si ægyptiacorum vnciam, duabus, tribus, aut quatuor vnciis cerati permisceas. Cerata fiant è myrteo, si adstringendum:

*Sarcoticorū  
natura.*

*Cephalica.*

*Modus cerati  
ad rhyptica  
& cephalica.*

*Materia ce-  
ratorum.*



omphacino, si etiam refrigerandū: rosaceo, si præter hæc concoquendum & repellendum: quamquam his omnibus communis quædam virtus est. Mastichino, lentiscino, terebinthino, vbi leniter calefaciendum, molliendum, & contrahendū. Quòd si parte aliqua durum, crudum, nec ita clemens vlcus est, loco cerati simplicis, vteris eo, quod quia resinam capit *ῥηλινόχνηρον* appellant. Deterasa quoque rotis axungia, temperadis eiusmodi cathartice idonea est. Mollit, siccatur, digerit, & leuiter astringit. Licentia est vocare sarcotica, quæcūque repellunt, temperant, molliunt, intemperiem corrigunt, ac breuiter summouent omnia, quæ à generanda carne naturam intercludant. Quæ in re vitanda sunt, quæ plurimum astringunt, & acrimonia mordicant: illa frugi humiditatem partium, & materiam carnis ebibunt: acria corrodunt, & aucta sorde vlcera amplificanc: vtræque verò exasperant. Seligenda materia, quæ naturæ corporum, & partium conueniat. Nam si quid Dionis vlcus impleat, non statim & Socratem iuuare potest: nec quod in glande carnem instaurat, & præputium protinus incarnabit. Finge Socratem cui femur vlceratum sit: thure alioqui sarcotico putredinem gignes: aristolochiæ puluere carnem restitues. Aristolochia enim carnem regenerat, vbi thus sordes commouet. Ac rursus Dion sit paulò humidior temperatis: huic thus cōmodū, aristolochia inutilis est. Thus quod in Dione carnem gignit, in humidiorē vel sicciore nihil tale efficiat. Atque omnino in sicciore corporibus & partibus, magis siccantia: in humidioribus quæ siccent quidem, sed minùs, vtilia sunt: ideoque

*Axungia  
rosatim.*

*Delectus  
materia.*

*Thus & aristolochia.*

*Consilium à  
naturæ par-  
tium.*

& præputio, & toti pelli quæ colem induit, sicciora: peni carneo & glandi minùs siccantia conuenient. Ad hæc carni quæ minùs siccant: oculo minùs quàm nari, huic quàm auri. Oculos incarnant, *Oculis incarnandis.* sarcocolla, quæ maceratur aliquando in aqua rosacea, lacte, rubi succo, & aliis, thus, manna, cortex thuris, aloë, myrrha, gummi arabicum, tragacantha, mistis interim metallicis, quæ citra morsum siccant (siquidem copiosior humor affluit) pompholyge, cerusa, terra sigillata, plumbo vsto, spodio, antispodiis: acrium etiam momento, vbi in multa sorde vlcus est. Sed hæc elota priùs, meliora sunt. Auribus *Auribus.* metallica magis siccantia, nec aliis temperata carnem regenerant. Ad hæc pastilli qui plurimùm siccant, Andronis, Polyidæ, Pasionis. Scoria ferri *Scoria ferri.* plurimis diebus in sole teritur, ac subinde intingitur aceto, quod acerrimum esse oportet, aut certè vino. Alij ita cõparatam, & in latere torrefactam, si piùs terunt, lauant, aceto imbuunt, siccant, & in pollinem tenuissimum cõminuunt. Atque hoc medicamento vtendum erit in veteratis vlceribus, in duris corporibus, vbi lenioribus nihil profeceris. Quæ ocularia efficaciora sunt, incarnandis auribus quasi leniora vsurpentur. In narium vlceribus, non tam *In narium.* ferri quàm plumbi recremento vti conueniet. Ad hæc lithargyro, cerusa, vino austero, oleo myrteo, rosis, punicorum succo misto interim malicorio & alumine. Qualia sunt recrementi plumbi, vini veteris, olei myrtei, ana  $\frac{z}{2}$ . recrementum in pollinem terito, & affuso vino diu versato: tum myrteo adiecto omnia conquassato, circumagito, figulino includito, coquito, dum sit luti crassitudo: in vase

plumbeo ad vsum reposito : hoc etiam auriū vlce-  
 ribus accommodatur. Eadem ratione metallica tri-  
 ta, liquidis permiscebis : & si siccandum magis, ro-  
 sas, melicoriū, alumen ex vino tritum adiicies. Cæ-  
 terū vlcera narium, pastillis illis, Andronico, aliis-  
 que generis eiusdem semper curari Galenus author  
 est. Verū à lenioribus auxiliis ad hæc transeun-  
 dum erit. Soluuntur vino modò dulci ( siquidem  
 dolor est, aut aliquid crudi reliquum sit) modò au-  
 stero, quod reprimat: aliquando veteri, vt siccet ma-  
 gis: nonnunquam aliis: aceto etiam modò vinoso,  
 modò acri & vetusto. Atque hi pastilli capite de  
 hæmorrhagia describentur. Rosæ detractis vngu-  
 ibus omphacino triplo infunduntur, quadraginta  
 diebus insolātur, oleum cauis vlceribus accommo-  
 datissimum est. Vlceribus pudendi, quæ humidiora  
 sunt, anethum vstum inspergitur, cucurbita sicca,  
 lota pompholyx, eiūsq; cinis, lapis hæmatites, pini  
 cortex, plumbū vstum lotum, cadmia similiter cō-  
 parata, spodium, antispodia : quæ conficias ex olea-  
 stri floribus & foliis, ebore, cornu cerui dactylo-  
 rum nucleis, moris immaturis, buccinorum cauis,  
 testudinum & ostreorum domiciliis, taurino gluti-  
 no, aliisque plurimis : quorum quæ solidiora sunt,  
 noua cremantur olla, molli carbone, dum figulinū  
 percoctum sit : quæ verò molliora, exarescunt in  
 sole : teruntur omnia, & si quid acrimoniæ retinēt,  
 lauantur vino & rosacea aqua, vt citra morsum sic-  
 cent, impleantque: hæc autem ocularibus sarcoticis  
 commodè ascribentur. Præter hæc tum pudendis,  
 tum partibus omnibus quæ vegetiùs sentiant, idō-  
 nea sunt, amyllum, cerusa sæpius elota. His autem  
 conuenienter

*Antispodia.*

*In pudendis  
& partibus  
quæ facile  
sentiant.*

conuenienter miscebitur aliquid thuris, mannæ, corticis thuris, aloës, sarcocollæ, myrrhæ, cerusæ factitiæ: aloë sicca, & mannæ portiuncula, non ita madida vlcera genitaliū incarnantur. Quòd si cancer in metu est, solani succum, semperuiui, plantaginis & similium, pistillo plumbeo & mortario diu versabis, in eoque medicamentum accommodatum concorporabis: aut in oleo, quod vi ignis exprimūt è plumbo. Eadem quoque remediorum ratio in ano & partibus quæ faciliè putrescāt, seruari debet. Putrescunt faciliè & nomis occupantur extremæ corporis partes, quibus infirmus calor est, quique celeriter extinguitur: cauæ, vt quæ recrementis faciliè impleantur, atque omninò calidæ & humidæ, & ita positæ, vt parum commodè persentur. Atque omninò naturæ partium coniungere oportet, quòd sinus vel humidior & sordidior: vel purior & siccior est: vt si consentiant, quia & pars humida & humidum vlcus est, ad utrūque remedia accommodes. Quæ si contraria indicāt, pars natura sicca, & cauum quod supra modum humectum, est ita temperada ratio, vt quum alterum iuues, alteri non noceas. Natura partis similia: vlcus ferè contraria desiderat. In diuturnis, rheumaticis, quæque æger-

*In diuturnis  
& rheuma-  
ticis.*

*In fistulis.*

*Languidius  
& efficacius  
sarcoticon.*

rimè carnem recipiant, sarcoticis aridis opus est, quæ citra morsum siccet, qualia proximè descripta sunt, quibus cauitas confertim implenda est. Eadem fistulis inspirantur, ex quo in vetere axungia, aut erosa rotis, Ostreorum cinis, labris, vlceris & qua parte callus est, imponitur. Omnia ergò remedia suis finibus distinguenda, & naturæ partium vlcerūque accommodada sunt. Languidius sar-

coticon vel saniem aceruat, vel mollem carnem, flaccidamque gignit. Efficacior cauum exarescit, vel callosum germen enascitur, sæpè etiam excitatur dolor, vlcusque grauitè arroditur. Quæ induntur vlceribus, leuia sint, & contactu suaui (ἐὐαφές Græci vocant) ne asperitate dolorem creent. Ex quo terebinthina ceræ, & hæc terebinthinæ sæpè commiscetur. Friabilis materia in tenuissimū polli- nem resoluitur: & cum aliis lenta & emplastica tē- perantur, vt aliorum aspredinē delineant. Coquun- tur multa vt liquecant, & viscidam naturam tra- hant: vesantur sedulò, ne in grumos coëant. Cæte- rum aliud genus varium, quod multa simul perfici- cit, & ad multas corporum naturas deformari po- test, sæpè vsui est: quia videlicet eo celerius malum percuretur, & vnum pluribus mederi possit. Ac cer- tē perferri debet, quum multiplex vlceris querela est, quia rheumaticon, dolens, callosum. Quòdque volumus, subiecto exemplo intelliges, idque in vsu reliquorum medicamentorum semel expositum sit. Glutinat, siccatur, deterget & carne implet. Strobili- næ ℥. 3. ceræ ℥. 1. æruginis rasæ semunc. thuris ʒ. 2. aceti quod sufficit. æruginem pluribus diebus ace- to conteres, thus vno die: atque ita liquatis aliis per- miscebis. Gangrænis, nomis, putrilagini conuenit. Fiet clemētius strobilina prius molliore facta è ro- faceo, vel terebinthina strobilinæ loco mista. Quòd si terebinthina careas (quod ferè fit) larigna, quæ pro terebinthina supponitur, & omnino ei similis est, vt edum erit, quam ad omnia valere, ad quæ te- rebinthina, scripsit Aëtius. Alia larignæ differentia cætera quidem terebinthinæ similis, sed gustu mor-

*Exercitatio  
in acuendo,  
vel hebetan-  
do pharmaco.*

*Duplex lar-  
igna.*

dacior, sensu acrior, & odore grauior est. Mitius quoque fuerit cerato addito, cera lota, diutius trita ærugine, aceto non ita forti, sed vinoso: postremo si æruginem minuas, hac arte clementius factum glutinat. Mediocre fit, nimium neque acre, neque languidum, non ita diu trita ærugine, & medio modo indita, ut didrachmi vel drachmarum trium pondere: picea si iecta aut abietina, qualis est vulgaris terebinthina, iam crassior, natura lenta, colore ruffo: tenacius simul & minus acre ad modum æruginis immisto thure. Vbi siccandum magis, drachmas duas lithargyri, aut squamæ (siquidem cõtumax vitium est) adicies. Squama vratur prius, & in cinerem trita, vino vel aceto eluatur. Atque hæc metallica tum maxime vsui sunt, quum flaccescunt carnes, & humidius vlcus est. Oleum verò adhibeatur (siquidem fuerit opus) melinum, aut myrteum: in calore, rosaceum præstatius est. Quod si parum procedit caro, aristolochiâ, aut aliquid è sarcoticis iniicies: in duritie, medulla cerui & vituli, adeps vituli, gallinæ, anseris, colliquanda sunt. Quæ si leuiss efficiunt, ad resinam liquidam, non acrem: postea etiam ad galbanum & ammoniacum decurrendum erit. Partem quoque aluminis infriabis in rheumaticis, vel ladanum quod mollit, lenit, repercutit: mastichen, sarcocollam, aloën. Atque hæc repellit, terget, digerit, & carnem gignit. Sic ergo πολύχρηστον temperabis, quod ad multa vitia semel transformes. Variis corporibus adhibeas, eoque semper carnem regenes. Iam verò constare puto in simplici vlcere quod ἀσπίδατον dicebamus, vtendum esse eo genere sarcoticorum, quæ suauiter implent, nihilque mor-

*Ladanum.  
Ex natura  
vulcerum.*

dent. In malignis, despaſcentibus, putrilaginoſis, ad acria decurritur. Sed ita, vt ratio aliqua partium habeatur, iuſtòque modo ceratis, roſaceo, & aliis temperètur. Quod inter vtrùnque vitium ambigit, mediis auxiliis curari debet. Atque omninò prouidentum, ne moueatur dolor, atque inde inflammatio: tum ne qua ſit intemperies vlceris, aut partium, quæ hoc ambiunt. Etenim natura partis inſtauranda priùs eſt, quàm renutrias. Quæ metallica adhibentur, cruda meſſoribus, nautis, foſſoribus, atque omninò calloſis corporibus: eadem uſta & è vino lota pueris, mulieribus, eunuchis comparètur. Quæ tantum uſta femori inſeruntur, ea uſta ſæpiùſque lota inſpergantur coli. In pudendi vlceribus præſtantiffimus eſt margaritarum cinis. Corallo ſimiliter vtilicebis: cryſtallum laudant in oris vlceribus & cancris. In clementibus auxiliis aloë eſt. Amylum per ſe tritum & reſperſum genitalia implet, & cicatrice tegit. In tenera natura lauatur aqua polygonij, ſolani, plantaginis: nec abſimilis habetur cura vlcerata ſede, ore, partibus extremis. Fuligo thuris, terebinthinæ, myrrhæ, ad modum ſiccare poteſt: è ſtyrace & pice liquida efficaciòr eſt. Suauior quæ ex butyro & æſypo effumat. Lauari debet quæ ſit acrior. Manna repellit, & ad multa vtilior thure eſt. Colophonia pix, reſina præſertim ſicca, humidioribus corporibus conueniunt. Colophonia modò per ſe, modò cum thuris polline vel manna, vlcera genitalium perſonat. Caries lignorum expurgat, impletque humida. In vlmo præcipuè, quercu, & adſtringente ligno colligenda eſt. Per ſe inſpergitur, & aliquando adhibetur in cerato. Cortex radi-

*Particularis  
materia.*

*Margarita.*

*Corallus.*

*Aloë.*

*Amylum.*

*Fuligo.*

*Manna.*

*Pix & reſina.*

*Colophonia.*

*Caries lignorum.*

cis capparis eadem potest : & cum carie cōtra Chironia & maligna permiscetur. Farina tosti hordei & sœnugræci humecta iuuat : torretur in tegula. Aristolochia, gentiana, enula, & similia detergent, *Aristolochia.* digerunt, attrahunt, & carne replent : sed hæc paulò acriora sunt, quæque duriori corpori & humidiori vlceri conueniant. Aqua rosacea vel vino macerata aliquantulum mitescunt, cerato quoque retundi possunt. Pumex crematur carbone puro, vino immergitur, siccatur vmbra : per se & cum sexta sulphuris parte Chironia iuuat. Chironiis longè optimum medicamentum est plumbum vstum & elotum. Plumbi scoria similiter comparata, vtrâque *Plumbum.* caneros & putrilagines mirabiliter adiuuant. Extillant oleum è plumbo Chemicorū arte, quod ad eadem vtiliter adhibetur. In acri sanie acria suspecta sunt. Sed hæc partim vstura, partim lotura obtundi, & cerato capta, vel rosaceo leniri possunt. Ac cerato quidem, si expositum, nec ita cauum vlcus est : in cuniculoso diluuntur rosaceo. Liquidiora pharmaca in superficiem data diffluunt, & inde linamenta arida relinquuntur. Crassa verò atque corpulenta altiore sinum non subeunt, nisi diluantur, & in pyulcis, colliriis, corniculis oris amplioris infundantur. Metallica acria sunt, squama æris, & stomatis (chalybem vocant) chalcitis, calchantum, quibus non nisi parcè vtendum est, & quod antè dictum est, vstis ferè, lotis, & leniori genere pharmacorum temperatis. Lauantur pluuiâ, si quæritur astrictio, alioqui puteali, fluuiali vel fontana. In fistulis & callosis vlceribus, aceto, vrina, lixiuio, vino alioqui giluo & subaustero : multò



magis si vel caro, vel cicatrix creanda est. Sed acribus paulatim assuefacere oportet. Cōsuetudo enim efficiet, vt ferat pars ea, quibus initio grauiter irritabatur. Cremantur metallica, vbi acrimonia metuitur, olla cruda tecta operculo quod vel corniculo, vel multis foraminibus pateat, quāq; acrior vapor exhalet. Vsta verò extingueri oportet lacte, butyro, melle, vino, herbarum succis, vnde vim cōuenientem imbibant. Ex quo lotura quicquid acrimoniæ reliquū est, exteri debet. Lithargyrus cocta sarcoticis imbecillior est, quia non ita siccatur, terget, adstringit: acrioribus mista iuuare potest. Ærugo acrior est, quā vt carnem gignat: oleum sordes colligit: cera idem efficit: tria hæc mista carnem regenerāt, celerius etiam si quid sarcotici ammisceas. Quale est ℥. cerati rosacei ℥b. i. æruginis ℥. i. Ac de medicamentis ex æruginē superiori capite satis dictum arbitror, explicatūque, qua arte cathartica deforme. Vt fiant sarcotica, retundēda acrimonia, lenienda eorum quæ tergant asperitas, lenis adiungenda adstrictio, vt carnem regeneres: de quibus abundē eo capite dictum est. Quod si in historiis veterum medicamenta reperiās, quæ carnem regenerent, capiant tamen acria & aspera, qualia quæ valde tergent, quæque vel austerā sunt, vel acerba: recognoscere oportet ea ipsa non omni vlceri descripta, sed ei quod sordidum sit & contumax, atque humore diffluat. In quo acrimoniam retundi & asperitatem sorde multa & sanie deliniri contingit, non aliter quā illa ceratis & oleis molliri solent. Atq; omninō separandū genus hoc pharmacorū ab altero quod pura impleat. Eadē ratione in

*Lithargyrus.*

*Ærugo.*

*Animaduertit.*

vlceraſtis oculis, multum lachrymantibus & ſordi-  
 dis, paulò acriora ſarcotica imperamus: quia intel-  
 ligamus ſorde & lachrymis vim pharmacorum di-  
 lui. In genere æruginis, factitia eſt chryſocolla ex  
 vrina pueri impubis. Verſatur hæc in mortario, pi-  
 ſtillóque æneo, quæ è molli ære & cupro conflata  
 ſint: ſal puriſſimus vehementer tritus, aut nitrú con-  
 iungitur vrinæ. Similiter ex ærugine Cypria, vel  
 quæ è cupro deraſeris, diutiſſimè tritâ, circûacta iſ-  
 dem mortario, piſtillo & vrina. *Borax,*  
 uero candore, quódque caſiſtrum vocât, eodem mo-  
 do teritur, & in mortario cum vrina circumagitur:  
 deinde omnia tinguntur glaſto, aut eo puluere gla-  
 ſti, qui iam è Narbonēſi Gallia marſupiiſ importat-  
 tur. Iſ emitur magno: cõmuni nomine cum cocco  
 baphico paſtellú vocant: inſicirque, colore purpu-  
 reo ad violâ inclinante. Sic intinctus Borax ceruleo  
 ſplendet, aut ſi plus glaſti combibit, purpureo. Eſt &  
 vſtolex barbaro nomine, ex aluminis, ſalis ana parte *vſtolex.*  
 vna, aceti acerrimi partibus duabus tritis vt prius,  
 dum ceruleum colorem trahant. Alij aceti loco, vri-  
 na illa vt malunt, à qua nō longè abeſt Scolæcia & *Ærugo ſto-*  
 rugo veterum, maximè Dioſc. hæc omnia acri ſunt *lætu.*  
 natura, eodẽ modo vſurpanda, quo ærugo & acria  
 metallica cremâtur, eluútur, réperantur aliis. Quod  
 ſequitur, anodynó eſt, ſiſtit, incarnat, phagedænicis, *Ad phagedæ-*  
 rodentibus, cácerofis, tibiærum vlceribus medetur. *nas tibiærum.*  
 ℥. litharg. ꝯ. vj. olei myrtei, & ſucci hyoſcyami ana  
 lib. i. coquâtur omnia expirante ſucco, dum ſit mel-  
 lis craſſitudo. Seorſum autem coquito, ceruſæ lib. ß.  
 in olei roſacei & ſucci plâtag. ana lib. ſemiſſ. ita co-  
 cta metallica miſceâtur, leniter coquâtur, verſentur

# INSTIT. CHIRVURGIC.

spatha: postremò summotis igne, insperge mastich. lib. semiss. vniantur probè, & plúbea pyxide reponantur. Ad eadē vlcera tibiarum, litharg. lib. ß. subtilissimè teratur, versetur affuso vino, succo plantaginis, vel alio liquore, qui per se conueniat: ex quo coquito cum ol. rosacei, adipis caprilli ana lib. ß. coctis ad iustum corpus addes mastiches libr. semiss. subductis igne, & leuiter refrigeratis, vitellos quinque ouorū immiscebis. Theriaca efficacissimè purgat, incarnat, cicatricem ducit. In sarcoticis censentur cephalica, quæ primùm quidē caluariæ medentur, deinde reliqua ossa carne contegunt, postremò duras carnes restituunt. Duorū ferè sunt generum. Alia enim κεφαλικά, quæ peculiariter caluariam incarnant: quædam χεῖλασματικά, quæ reliquis ossibus fractis adhibētur: verū vtriusque nomen & ratio interim permiscetur. Cephalica catagmaticis acriora sunt, squamas ossium detrahunt, foras euocant quæ in alto latent: vtrāque tergent, digerunt & siccant. Multa catagmaticis & cephalicis acria metalla cōmiscuntur, sed præcipuè vbi ramentum ossis reuellendum, & humor viscidus longiùs trahendus. Ac nudatis ossibus incarnādīs, arida inspergantur. Pinguia enim & quæ ἔμμοτα vocant, quia inuncta linamentis adhibentur, nudatis ossibus nocent. Miscetur ferè cephalicis quod leniter adstringat. At hoc nisi eò vsque viceris tritura, vt in tenuissimum pollinē abeat, tardabit potius reliqua, quàm incitet. Contrà tenuissimè læuigatū reprimet quod influat, efficiētque, vt vis tergētium altiùs penetraret. In vulneribus ossium, sed præcipuè capitis, non statim ad incarnationem (συσσάρκωσις appellat) ve-

*Theriaca.*

*Virtus cephalicorum.*

*De compositione cephalicorum.*

niendum: sed explorandum priùs, an omnia tuta *Cautio.*  
sint, num quid contusum, quod suppurare priùs, ac  
deinde purgare & siccare oporteat. Videndū quo-  
que priùs est, ne qua parte syderatum aut corruptū  
os lineat, vel cariem trahat; eliminandum enim, inu-  
rendum, excidendum, ac omnino repurgandum est.  
Hæc autem cura multò maximè suscipi debet in  
caluariæ fracturis, quæ altiùs procedūt. Itaque tum  
dum cephalicis utēdum, quum pura omnia ca-  
rere periculo videbuntur. Atque ubi succrescit caro  
(succrescit autem facillimè) & os suo corpore leui-  
ter integetur, cephalica tēperabis oleo, cerato, aliis-  
que generis eiusdem. Cerati modum definient, na- *Ceratio.*  
tura partis, qualitas vitij & medicamenti. In calloso *duo ad cepha-*  
ulcere, par medicamentum pari cerato misceri po- *lica.*  
test. In aliis ceratū duplum, triplum & quadruplum  
esse consuevit. Parantur cephalica ex iride Illyrica, *Materia ce-*  
vel florentina, alioqui pumila, densa, quæque sit frā- *phalicorum.*  
genti cōtumax, subruffo colore, gustu amaro, odo-  
re perquā syncero. Parantur quoque ex orobi, cice-  
rum & lupinorum farina, manna, aristolochia, gen-  
tiana, bryoniæ & panacis heraclij radice, magis etiā  
eius cortice. Opopanax autē calidior est. In summa  
cephalicorum materia deterget, siccat, & nō rodit.  
Nam acria miscentur, non quia sarcotica, sed ut tes-  
tulas ossium è profundo trahant. Cephalicum Ca- *Cathēgeta.*  
thægetæ, quod tollit squamas, ossa corrupta detra-  
hit, & caua implet. ℥. iridis, radice panacis vel cap-  
paris ana ʒ. j. aristolochiæ rotundæ, mannæ ana se-  
munc. trita & traiecta cribro resperguntur, vel mi-  
sta melle inferuntur cauo. Aliud acrius Xenocratis.  
℥. farinæ orobi ʒ. j. iridis sesquunc. mannæ, aristo-

loch. rotundæ, squamæ ana drach. 5. tritis vtitor, & cum melle. Sunt qui addant radicem bryoniæ, & aliter parent. Aliud è Silphio, quod si desit, vtere benguino: rescindit callos, purgat, tabefacit membranas, vt sponte sua decidant: & caua implet. Resinæ pini siccæ sesquunc. pumicis torrefacti extincti vino, iridis, aristoloch. silphij ana 3. j. thuris semunc. squamæ æris 3. ij. aliàs quatuor: arida & in

*E silphio.*

*E serapiade.*

melle vsui sunt. E Serapiade. Satyrij tritesticularis, iridis, marrubij ana vnc. 1. farinæ orobi vel lupinorum 3. x. aristoloch. 3. xv. sicco & ex melle vtitor: squamas elicit, valde siccatur, incarnatur. Huic generi Satyrij quod Serapias & triorchis vocatur, hæc insunt, quod in pollinem radice trita, contumacia & putrilaginosa siccatur & repurgatur, herpes sanat, discutit œdemata. Triphonis quod aufert squamas. Corticis pini, squamæ, pumicis vsti ana sesquunc. manne, thuris, aristoloch. iridis, resinæ pini ana 3. j. myrrh. aloës ana semunc. vtere vt prius. Athenæus pro cortice pini habet gallæ vnc. 1. Quod sequitur, Deleontis est: diuturno, egrè curabili, & calloso ulceri medetur, ossa corrupta rapit. Squamæ, mannæ, thuris, resinæ siccæ ana vnc. 2. aceti quantum sufficit. Squama ex aceto leuigatur, thus & manna tenuissimè trita immiscentur, similiter & resina: pastilli fiunt, qui in vmbra resiccantur. In callosis, pari cerato rosaceo: in aliis triplo vel quadruplo temperantur. Melanchloron Triphonis ad eadem. Squamæ sesquunc. mannæ, thuris, ammoniaci, resinæ pini siccæ, seu vitulini bene curati, terebinthinæ ana vnc. du. ceræ, olei ana vnc. quatuor, aceti vnc. 10. confice vt prius. Plura capite de vitiis os-

*Satyrium.*

sum secundo, quarto & quinto de compositione  
 pharmacorum  $\chi\tau^1$  γένη. Trigenar, Cera, Colopho- *Trigener.*  
 nia, terebinthina pari pondere colliquantur, refri-  
 gerata immerguntur frigidâ, diuque manibus vo-  
 lutantur: nuda ossa capitis incarnat, squamas de-  
 ducit, & cicatricem facit. Sed hîc aliquid epulotici  
 cominiscebis. Admirandum est è mastiche pariter *Iudæi.*  
 mista in ossium fracturis. Iudæi. Colophonîæ lib. i.  
 mastich. vnc. i. olei sesquuncia: liquata & in frigi-  
 da pista sine linamento vlceri interponuntur: pur-  
 gat hoc pharmacum, & carne implet, sed non clau-  
 dit cicatrice, nisi quid ex epuloticis immisceas.  
 Optimè incarnat, farinæ pistrinalis vnc. 2. colopho- *Galen.*  
 niæ valde tritæ vnc. i. arido cauum impletur. Gale-  
 ni. Cerae sesquunc. ol. lib. dimid. liquefactis adde  
 thuris, iridis, aristolochiæ ana drach. 2. æruginis  
 drach. 1. Aliud. Radicis anchusæ vnc. 2. aloës vnc.  
 4. vtere arido. Hactenus experimenta veterû, nunc  
 ad recentiorum sarcotica transeamus. Aureum Me- *Aureum*  
 suæ ita describunt. Cerae vnc. 5. resinæ vnc. 3. tere- *Mes.*  
 binth. lib. 1. mell. sesquunciam: mastichis, thuris,  
 sarcocollæ, myrrh. aloës, croci ana drach. j. fiat vn-  
 guentum. Aliter Mesuæ & alij, ceræ citrinæ  $\zeta$ . 6. ol.  
 boni lib. 2. & s. terebinthinę vnc. 2. resinę, Colo-  
 phonîæ ana sesquunciam, olibani, mastichis, ana  
 vnc. i. croci drach. 1. Vtrûnque sarcoticon est, &  
 molliora corpora conglutinat: cera in eo liquanda  
 est: liquata resina, Colophonia, & terebinthina  
 confundenda: depositis ab igne olibanum & ma-  
 stiche insperguntur: postremò crocus in pulue-  
 rem tritus immiscetur. Fuscum Nicolai & croceum *Fuscum & croceum.*  
 multa habent vnde emolliant & concoquant.

# INSTIT. CHIRVRGIC.

Vnguentum paruum Ceraeos, Gratia dei, emplastrum de Ianua multa habent vnde purgent & carnem gignant. Tetrpharmacū dolorem lenit, maturat phlegmonem, putredinem augere potest, siccare verò & expurgare nō potest. Galenus locis aliquot Thessalum & Thessalios reprehendit, qui tetrpharmaco vt siccante, purgante, & incarnante, vterētur. Quod si tum iure reprehēsum fuit, in eandem causam incidunt, non modo recentiores me-

*Actuarii.* dici, sed inter Grēcos Auētuaris, qui iam à vetere illa Grēcia degenerasse, & Arabum familiis consensisse visus est: inter Latinos Scribonius. Vterq; enim vim incarnandi tetrpharmaco tribuit. Sed non ita absurdum videtur nobis tetrpharmaco vim generandæ carnis eos assignasse, parte non admodum sicca, si modò è sicca pice, Colophonia arida, adipe taurino, & cera non ita pingui confecerint: & in vsu, rosaceo, myrteo, mastichino dissoluerint. Omnia vlcera per sanat illud. ℥. artemisiæ, scabiosæ, absynthij, ormini, senecionis, tamarisci, apij, verbenæ, pilosellæ, lanceolæ, pimpinellæ, linguæ canis, millefolij, chelidoniæ ana M. i. ex omnibus, reiectis radicibus, exprimatur succus, cui adde veteris aung. lib. 2. sepi hircini lib. 1. olei lib. 2. mellis ℥. 3. medio-criter bulliant, deinde in mortario pista vniantur.

*Diaireos.* Diaireos. Sepi vaccini lib. β. olei ros. ℥. 3. ceræ ℥. 2. radicis ireos vnciā vnam: thuris, sarcocollæ, mastiches, aloës, aristolochiæ ana drachmas duas, cum terebinth. ℥. 3. fit vnguentum. Puluis Rhazæ. ℥. oli-bani, aloës, sarcocollæ, sanguinis draconis, radicis ireos ana. Eodem modo cum mastiche, farina orobi, fœnugræci, cicerū, lupinorum, thure & aliis sar-

*Puluis  
Rhazæ.*

coticos pulveres confinges, quos subtilissimè tere-  
re oportet, ne asperitate lædant. Itaq; materia tun-  
ditur in pila, tenui cribo secernitur, postea mollitur,  
ac deinde tenuiùs cribratur: quicquid nō trāsmeat,  
repetitur in pilam, ac randiu conteritur, dum ad ex-  
tremū pollinem deueniat. Alia sarcotica per se in-  
duntur cauo, vel penicillo vulnerario capta impo-  
nuntur: in fistulas immittūtur clysterio, sed diluta:  
ab his thorulus mollis vino madēs superdatur. Vi-  
num sit è dulci austeriusculum: postremò omnia  
cōmodè alligantur. Æstate bis, hyeme semel in die  
commutantur: sæpius etiam, si quid phlegmones,  
doloris, aut casus generis eiusdem intercesserit. Lin-  
tei lanugo bene munda, impacta vlceri sæpè suffi-  
cit. Liquida verò quæ in fistulas danda sunt, ex in-  
cidentibus, mollientibus, & incarnantibus ferè cō-  
parantur, quale est in decocto centaurij, marrubij,  
apij, absynthij, ligni sancti, aristolochiæ, ireos, al-  
thææ, maluæ, ficuum, passularū, tragacanthæ, in li-  
xiuio, lotura calcis & acris metallici, aqua vitæ, sar-  
cotici pulveres resperguntur: qualia sunt, radicis al-  
thææ, exempto neruo  $\mathfrak{z}$ .i. ficus duæ, cētaurij, mar-  
rubij, absynthij ana pug.i. fiat decoctio: in decocto  
 $\mathfrak{z}$ .4. disperge pulueris ireos, mastiches, aloës, sarco-  
collæ ana  $\mathfrak{z}$ .i. Sunt qui aliquid mellis rosacei, vel  
myrtei commisceant. Aliud.  $\mathcal{V}$ . vini albi odoriferi  
 $\mathfrak{z}$ .7. aquæ vitæ optimæ  $\mathfrak{z}$ .3. myrrh. aloës, sarcocollæ  
ana.  $\mathfrak{z}$ .2. thuris  $\mathfrak{z}$ .3. seminis hyperici, centaurij, mille-  
follij, verbenæ, linguę canis, vtriùsq; cōsolidæ ana  
pug.i. leniter bulliant in vino herbæ & semina: de-  
inde exprimātur, affundatur aqua vitæ, reliqua tri-  
ta misceantur. Fistulæ os obstipetur medicamento

*Lanugo  
lindei.  
In fistulis.*



ex acriuscula materia, vt ostreorum cinere, & axungia vetere, vt incidat, molliat, discutiat.

*De Epuloticis.*

CAP. 4.

*Natura pulotici.*

**P**lenum vlcus clauditur cicatrice. Epuloticon fliccat, (sed citra morsum) atque hinc reprimat, carnem reficcat, cogit, & cute operit: aut certè callo tenui, qui cuti similis est. Ex quo fliccare magis necesse est, quàm quod vel carnem gignit, vel glutinat. At cicatrix non aliter quàm caro, naturæ opus est. Aliud verò genus quod licentia epuloticon appellant, quia excreſcentem carnem reprimat, acri natura & iam mordaci. Addunt & tertium genus, quod fliccat quidem, sed non adstringit. Cicatricem ducunt. Pompholyx, cadmia, ceruſa, plumbum, ostrea vſta & elota (ac pompholyx quidem lotus & cinis eius in iis quæ citra morsum fliccent) præſtantiffima ſunt. Verus pompholyx efflari poteſt, colore parum candido atque liueſcente, iniectus carbonibus auream flammam edit: is iam olim Aëtij memoria parum frequēs erat, ac ſæpiùs adulterabatur. E fornacibus ærariis facilè parari poteſt, vbi tum flamma, tum vapor æris, teſtudinem elam-bit. Pinguis enim, candicans & tenuis fauilla inde exteſa pompholyx eſt. Qui verò pompholyx cruſtaceus conuexo quaſi dorſo aſperior, & parte caua lenis eſt, colore modò nigro, modò cinericio, ad cadmiæ genus potiùs referri debet. Spodios, quam vertunt cinerulam, è ſolo atque pauimentis fornacum æris euertitur. Ceruſa plurimis locis Galliæ conficitur. Venetiis importatur quæ ferè candore vincit: ad cicatricem nihil fortàſſe melior eſt. Recrementum plumbi vſtum, ac ſæpius elotum, terra

*Improprie dicitur epuloticon.*

*Verus pompholyx.*

*Cadmia.*

*Spodios.*

*Ceruſa.*

figillata, bolus armenius, lapis hæmatites, antispo-  
 dia bene lota, acribus fluxionibus & teneris corpo-  
 ribus omnia instituenda sunt. Asperiora sunt, galla, *Fortiora*  
 myrrha, malicoriū, alumen, aris squama, chalcitis, *epulotica.*  
 misy, ærugo, vitrioli genera vsta & elota. Et (quod  
 in his præstâtissimum est) crematum æs & elotum.  
 Metallis acribus excrescens caro consumitur: vstis  
 tantum vel elotis, aut vtrôque modo maceratis tra-  
 hitur cicatrix. Sed solum vsta, lotis etiâ acriora sunt. *Preparatio*  
 Vruntur ea fictilibus crudis, dum percocta vasa *metallorum.*  
 sint: extinguuntur vino: tunduntur in mortario af-  
 fusa pluvia: mox siccantur, cribrantur rariore seta, in  
 mortariuni aliquoties repetuntur, ne quid vel are-  
 nosum, vel scabrum reliquum fiat. Abluuntur sæ-  
 pius & torrentur, ea ratione quæ partim ex Diosco-  
 ride, partim ex Arabum commentariis petenda sit.  
 Tertiò aliquando & quartò retorrentur, lauantur,  
 in pilam reuocantur, vt ea cura melius mitescant.  
 In vlceribus quæ ægrè, vixque cicatricem ducunt,  
 tandiu elaborare metallica nō oportet. In his enim  
 semel cremata, semel vino vel pluvia extincta, vsur-  
 panda sunt. In callosis, aqua maris vel aceto extin-  
 guere melius est. Si sanies acris est, immergantur la-  
 cte, tenuissimo liquore oui, rhodostagmate: vinum *In quibus ex-*  
 subausterum conuenit, siquidem copiosus humor *tingi lau-*  
 allabitur. Atque hoc lauandis metallicis præferri *rique conue-*  
 debet, quod annis & qualitate medium est: inutile *uiat.*  
 recens, quodque ætate, vel mordax, vel fugax & lan-  
 guidum est. Aqua etiam in calore utilis est. Nec alia  
 ratio in lotura seruari debet. Atque ea arte tum v-  
 sturæ, tum loturæ eodem medicamento excrescen-  
 tem carnem adimes, cicatricem mollibus, duris-

que corporibus informabis. Malignis idonea sunt, sarcocolla, ichthyocolla, chrysocolla, quæ cruda, admodum acris est, nisi sanie vlceris & sorde diluatur: plumbum vstum, crematū stibium, plumbi recrementū, squama ferri & stomomatis. Aëris squama præterquam quòd siccat, etiam deterget, & pura vlcera efficit, quod reliqua squamarum genera non præstant. *Æs* vstum carnem exedit: vstum & leniter elotum duris corporibus epuloticon est. Poterit autem vrendo sæpiùs & lauando ita macerari, vt etiam molli naturæ conueniat. Leniora metallica, pompholyx, spodium, plumbum, atque inde purgamentum, minùs obtundi debent. Cerusa non eget vstura: & lotura satis temperatur. Extergent, æs, æris squama, stibium, cadmia, vitrioli genera: vsta lotaque acrimoniam deponunt: astringendi vim ad cicatricem retinent. Eodem modo calce, ostreis, buccinorum cauis, & purpurarum, limacum testis atque testudinum, erinacei spiculis, calculis marinis & silicibus, vstis omnibus & elotis vtendum est. Ac breuiter quæ in sarcoticis efficacius siccāt, ad creandam cicatricem transferri possunt. Omnia in cinerem trita specilli nucleo capiantur, & ita inspergantur plano. Quæ in cerato myrteo adhibentur, leuiora fiunt. Acria verò excepta cera impingi possunt. Cera sequaci vti conueniet, alioquin ad ignem è myrteo pista, mollienda est: quale hoc est. ℥. ceræ ʒ. 4. manibus myrteo tinctis, ad ignem molliantur, & cum æris vsti, squamæ æris, & æruginis ana ʒ. 3. fiat platysma. Sed hoc & alia id genus malignis & contumacibus imperanda sunt. Ac ferè duplici ratione epulotica vsurpātur, quia alia in farinam trita insper-

*Squama.*

*Æs vstum.*

insperguntur, *χρίσματα & ὀπιπασματα*  
 Græci vocant, alij *ξηρὰ καὶ ξήρια καὶ ἑππαγα*. Alia  
 verò *ἐμπλαστρώδη* firmo corpore ac tenaciùs hæ-  
 rente. Addunt alij & *ἔμμοτα* mollioribus naturis,  
 locis doléribus aut inflāmatis: quæ liquatis empla-  
 sticis confinguntur. Itaq; vbi ægriùs trahitur cica-  
 trix, emplastica meliora sunt, quia diutiùs inhæret,  
 quod vim & celeritatem cicatricis adiuvat. Vlcus  
 humidius aridis iuuatur. Molliora corpora linamē-  
 to gaudent. Suauiora ferè, nec tam aspera, quæ vel  
 emplastri forma, vel in linamentis adhibentur. Re-  
 cens enata caro, neque acrimonia rodi, neq; astri-  
 ctione irritari debet. Corpus ferè accipiunt à cera  
 quæ pinguis sit, vel natura sua, vel quia remollita  
 oleo. Olea conueniunt contrahente natura, myrti-  
 num, fraxininū, melinū, terebinthinum, létiscinum,  
 mastichinum, rosaceum, omphacinum, vel in quo  
 oleæ germina, cymæ rubi, cauliculi vlmi, salicis, &  
 similium præcoxerint. Quale si defit, ad ea quæ sic-  
 cant, decurrendū erit. Tale vetus est, & recens qui-  
 dem, sed quod diu efferbuerit. Siccāt & alia, rapha-  
 ninum, sycionium, ricininum, quæq; vehementer  
 discutiant. Iisdē generibus olei, crassiora pharma-  
 ca ad linamentum diluuntur. Quanquam in mali-  
 gnis non oleo, non aqua vtendum erit, neq; per se,  
 neque cum aliis: sed larigna vel terebinthina mol-  
 lietur cera, in qua epulotica concipias. Olei modus  
 est ad ceram, vt sit decuplū, vel duodecuplū: co-  
 piofius tamen esse pōtest, & parcus, vt cera mollis  
 est & dura: vt sunt corpora dura & mollia: vt deni-  
 que vlcera, vel facilè vel ægrè cicatricē trahunt. La-  
 bris tumentibus & callofis hæc addūtur ceræ, lari-

*Vnde corpus  
epulotica.*

*Modus co-  
in mollienda  
cera.*

*In callofis  
labris.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

gna, terebinthina, lanarum sordes, medulla cerui & vituli. Quæ connexa non solum emolliunt, sed præterea efficiunt, ut diutius hæreat pharmacum, & tardius exarescat. Prouidendum autem, ne quod tenellæ carni pharmacum incumbit, ariditate scabrescat: ex quo irritet locum, & ante tempus decidat. Ac diutius hæreere bonum est: ex quo tertio primum die, vel eo tardius absolui debet. E larigna & dupla cera ce-  
ratum confici potest. Minor sit medullæ modus & æsypi, quam resinæ. Metallica quadruplo & sextuplo cerato capiuntur. In epulotico Zenonis, quod à Galeno descriptum est, vicesima pars galbani, molliendo scilicet, metallicis permista est. Verum præstabit callosa labra circulari malagmate circumscribi mediam verò carnem, cui cicatrix creanda est, epulotico induci. Alioqui platysma fingatur, quod malacticon sit, qua parte labra contingit: reliqua verò epulotico pharmaco illinatur. Sed in callosis labris si nihil malacticis efficies, ad ea quæ ἐκτιλωτικὰ inde appellant, veniendum. Extrema auxilia sunt ferramenta quæ excidant, & linum usurpatum Hippocrati. Flaccidis carnibus balaustia, alumine vsum, quæque similiter contrahunt, affatim insperguntur. Verum liberalius iniici oportet, ubi caro detrahenda est: parcius & in subtilissimum puluerem conleuata, atque acie cultelli capta, ubi cicatrice caro regenda est. In calloso stupidique sensus corpore, si neque pletora est, neque cacochymia, acrioribus (idque matutino magis) ad cicatricem uti licet. In aliis vlceribus, quæ leniant ideo miscentur, ut acrimoniam retundant. Ac iam progressa carne & cicatricem trahente, oleum, adipem, resinam, ceram

*Modus eorum  
 quæ epulotico  
 concompo-  
 nunt.*

*In flaccidis  
 carnibus.*

aliâque id genus coniungit Hippocrates, vt decôra, lenis, non scabra durâque cicatrix inducatur, idque hyeme magis quàm Æstate. Quæ molliora corpora colliquant, durioribus cicatricem trahunt. Rursum quæ his carnem regenerant, mollioribus ferè epulotica sunt: & acria rosaceo cerato fracta, cicatricem claudunt. Quôdque antè dictum est, tam pos-  
*Quomodo è  
sarcoticis fit  
epulotica.*  
sunt mansuescere lotura, quâ suavis est cerusa. E sar-  
coticis scordio, carie lignorum, cortice radicis cap-  
paris, irionis semine, iri, acoro, artemisia, dracunculi  
radice, aristolochia, cypero, gentiana, & aliis epulo-  
tica finguntur, mista astringenti materia: sed & ea  
myrteo cerato capta, epulotica sunt. Acriora quoq;,  
vt calx viua, arrhenicon, ærugo, mollioribus sarco-  
ticiis ad cicatricem temperantur. Eodem modo alu-  
men quod nimiû astringit: sed hæc omnia propo-  
sitis exemplis declarantur. Manna, thus, leuia sarco-  
tica sunt: calx acrior: nec sine acrimonia squama  
est. Ex his fit aridum Spodorides Asclepiadis, quod  
conuenit vlceribus, quæ vix cicatricē trahunt. Cal-  
cis viuæ ʒ. 6. mannæ, thuris, squamæ ana ʒ. 4. vel (vt  
Heliodorus) calcis viuę, mannæ, thuris, ana ʒ. 1.  
squamæ semunc. Al. Ireos, mannæ ana ʒ. 2. recre-  
menti æris, squamæ ana ʒ. 4. Nomæ & putredines  
nisi vehementissimis, acribusque pharmacis ægrè  
curantur. Qualia sunt, Sulphuris viui, auripigm.  
squamæ ana ʒ. 2. æris vsti ʒ. 1. Al. Sădarachæ semun-  
cia, aluminis, myrrh. crocomagnatis, ireos ana se-  
muncia, cyperi ʒ. 4. tritis vttere. Fit autem croco-  
magma è croci drach. centum, myrrhæ, amyli, ro-  
sæ, gummi ana ʒ. 50. Siccant, nec ita stringunt,  
myrrha, sarcocolla, argenti spuma, ostrea, diphry-  
h ij

# INSTIT. CHIRVRGIC.

ges, ærugo, & alia quædam metallica. Spodios factitia (quod antispodion vocant) in epuloticis censetur. Cyperi radix in nimio humore cicatricē trahit. Cucurbita sicca, vsta, humidis præputij vlceribus, nec adeò malignis vtilis est. Ad eadem inuenterata, anethi radix vsta inspergitur. Abrotoni radix eadem maligna iuuat. Amylum per se tritum, & cum tantillo aluminis, eisdem vlceribus prodest.

*Cyperus.*  
*Anethi radix & abrotoni.*

*Amylum.*

*Lithargyrus*

Lithargyrus duplo rosaceo vel myrteo coquitur, ac ne effuerescat, paulatim affusa rosacea refringitur: vbi non inquinat, in eadem aqua subigitur, omnia versantur mortario: rebellia curat & humida: loco rosaceæ licebit vti aqua rhois (sumachū appellant) cornorum, spinorum (quæ prunella vocant) quātò coquetur diutiùs, tantò siccabit magis. Hordeum combustum Chironiis inspergitur, & quod inde conficitur *Μεχρίθων*, serpentia, Chironia, & quæcunque tardius cicatricem ducunt, persanat. ℥. hordei cremati 3. 10. ærug. 3. 50. ceræ 3. 1. olei mastichini 3. 9. ærugo ex oleo teritur, cera seorsum liquata coniungitur: leniter coquuntur: refrigeratis hordeum in mortario permiscetur. In summa quæ leniter siccant & astringunt, mollibus corporibus & benignis vlceribus conueniunt: durioribus naturis, nec ita māsuetis vitiis, paulò validiora auxilio sunt. In vlceribus quæ pertinaciùs repugnent, ad metallica acria vsta veniendum. In malignis, Chironiis & alioqui desperatis, crudis metallicis & acribus vtendum erit: vbi si nec his quicquam efficitur, ferro & igne opus est. In dysepulotis fugienda *μαλ-  
θακάδι* mollia medicamenta: deinde malactica, adeps suillus, oleum, cera, resina, ammoniacum, &

*Hordeum &  
inde διὰ κρι-  
θων.*

*Vitanda in  
dysepulosis.*

similia: fugienda acria, piper, sinapi, sed præcipuè v-  
bi plethora, vel cacochymia. Adhæc quæ hume-  
ctant, vt aqua: quanquam non ignorandum ea om-  
nia interim commisceri, verùm alia ratione, quàm  
vc cicatrice claudât. In Pamphilio Asclepiadis, me-  
tallica coquantur hydrelæo, ex aqua interuntur, si  
sanies acrior, si quid phlegmonis, si molle corpus  
est. In albis epuloticis miscetur aqua, vt lithargyrus  
celerius eliqueſcat. Verùm eò vsq; coquuntur phar-  
macá, dum tota aqua exhalauerit, atque ita nihilo  
ferè humidius medicamentum est. Acria discutiunt, *An aqua re-*  
& contumacius vitium magis edomant: malactica *ciptatur in*  
acrimoniam temperant & molliunt callos. Quòd *epuloticis.*  
si omnibus ritè institutis quæ ad topica remedia  
pertinent, nihilo magis cicatrix inducitur: aut si iã  
opertum, clausumque vlcus rescinditur, longiùs re-  
quirenda causa est. Ac ferè cicatricem tardant ple-  
thora & cacochymia. Copia phlebotomo deple-  
da est: vitiosus succus pharmaco purgari debet. *Vnde diffici-*  
Quòd si vtrunque coit, neque in sola copia humo- *lis cicatrix.*  
rum, sed & in qualitate vitium est, primùm quidè  
phlebotomo, deinde purgante pharmaco leuare  
corpus necesse est. Sed è varice vitiosa materia vl-  
ceri illabi potest. Vbi nõ modò difficilis, sed etiam  
plena periculi cura est. Secatur vena, purgatur cor-  
pus eo cathartico, quod melancholicum succum  
vnà & pituitam ducat: iusta vitæ ratio decernitur.  
Quibus si parum efficitur, emulgetur varix, ac me-  
dius præciditur. Designanda prius vena est: atramè-  
to notatur, aut rubrica: sed ea parte præcipuè, qua  
proximè radicem spectat. Hic cultello nudatur cu-  
tis, caro inciditur, molliter distinguuntur fibre, atq;



his omnino vulnerata caro explicatur: vbi specillo buxco, veleburno vti conuenit. Ac iam nudo vasculter lenis summittendus est, vt ab inferiore carne diuulsis fibris, varix absoluator: hîc vossella venaprehenditur, eleuatur hamo: inferiori parte funiculo religatur, quem acus conuehat: supra funiculum phlebotomo pertûditur, vt reddat sanguinê, quantum sit opus. Ex quo supra vulnus immissa acu, vt prius, quæ filum ducat, præstringitur: hîc iam vinculum inferius distringendum, attollendum membrum est, & sursum adducta manu, quâ venæ membri decurrunt, & per factum vulnus sanguis exprimitur, ita paulatim emulgetur varix. Laxatû filum rursus obligatur, & media vena præciditur, qua parte vtrîque funiculo illaqueata est. Postremò iusta ratione, suoque tempore noua plaga sananda est. Quanquam aliquândo contingit, vt iam curato veteri vlcere, maneat incurabile, quod ad varicem est, nouo vitio subinde affluente. Aliis vtróque vlcere perfanato melancholia commota est. Atque vtrèque casus reuocato subinde phlebotomo, sæpius purgato corpore, iusta vitæ lege declinari potest. Hippocrates rudiùs, sed meliùs fortasse, varicem, siue is sit euident, siue in carne teneatur, multis locis compungit, vbi opportunû videatur, ac sanguinê nigrum exhaurit. Prohibet autem, vt ne vicina loca quæ eodê vitio, nigricât scalp pro exasperetur vulnere illato, quod ægerrimè postea percurêtur. Quòd si ab hepate, liene, aut alia parte corporis ducta colluie in perpetua sorde vlcus est, necessarium parti remediû adhibebis. Ac vomica interior nonnûquã agit cuniculos, qui in exteri<sup>9</sup> corp<sup>9</sup> desinât, vbi ferè,

*Apartibus  
corporis tar-  
dus c. catrix.*

sed multò magis prouectis annis, desperatio est. Et ab vlceribus externis in latera initio ducùtur sinus, qui etiamsi lateant, produntur tamen, cum multo plus sordium colligitur quàm ferat ratio & magnitudo vlceris, & pus aliud est, quàm natura partis gignere consuevit, serosius scilicet aut crassius: quum deniq; qua parte subest cuniculus, aut scabrior, aut pallidior, durior aut mollior cutis est. At specillo argenteo, vel cereo res tètari potest, vbi vel cauterio vel ferramento cavititas detegenda est, nisi vel profundior descendat, vel grauior casus à ferro & cauteriis metuatur. Sèpè etiam in vetusto vlcere, quòdque fracturæ coniunctum fuit, os subiectum parte aliqua syderatum, luridum, cariosum, coalescit. Itaque qua parte vitiosum os est, abradi scalpro, & cauterio inuri deber: malè còpactum rescissò callo, ad curam de integro reuocandum est. Reliquæ fissuræ sedulò compingendæ, & ramenta maturè detrahenda, si qua restiterint. Instauranda quoque vlcerum natura & vicinæ carnis, quæ nonnunquam eò vsque corrupta est, vt vel frugì materiã alimenti possit corrumpere, vt iam vicina liueant, nigra sint vlcera, modò vieta, modò callosa, cancrosa, putrida, vermiculantia. Quædam igitur contrariis remediis depelluntur, alia ferro peramputanda, alia igne affligèda sunt, sanguisugis affixis, scarificatu & corniculis exhauriendum vitium est. Ac breuiter sum-mouenda omnia, tum quæ cicatricem prohibent, tum quæ eandē factam refricant. Legitima vitæ instituta præscribi debent, videndūque medico, ne quid vel peccetur ignorantia, vel negligentia omit-tatur. Lithargyrus per se inspersa, attrita operit. E

*Lithargy-  
rus.*

vino vel aceto teritur, siccatúrque ad cicatricem vlcerũ, quæ multo humore madet: elota mitissima est. Lithargyri vsus est in paruis vlceribus, in desquamata cute, & prurigine. In his enim leniora remedia vsui sunt: sæpè etiã in subliquidis ceratis, quæ è myrteo, rosaceo, & aliis id genus confingas. Tenuis

*Plumbum.*

plumbi lamina, plumbũ vstum lotum, summoperè medetur cancris. Recrementum plumbi in æquali vino exactissimè læuigatur, affusóque pari myrteo decoquitur, dum sit luti crassitudo, & aurium, nariumque vlceribus accommodatur. Vlceribus sedis & narium, canaliculus è plumbo fingendus est, qui dehiscat foras: altera parte qua subit corpus, in læuem ac rotundum quasi vmbilicum desinat, atque hic centro suo angusto foramine pateat, quã videlicet liberũ iter aëris teneatur. Vtero similiter & aliis locis corporis, quæ caua sint, conformari potest è figura partis. Cadmia cremata pluribus diebus leuigatur, ex aceto quidem in malignis: in aliis vino, modò giluo, modò è dulci austeriusculo. Atque sic elaborata incarnat, & cicatrice claudit. Lapis (quẽ calaminarem vocant) impetigines, herpetas, scabras prurigines persanat: fictili crematur, vino extingu-

*Cadmia.*

*Ladanum.*

tur, & cadmiæ similiter elaboratur. Ladanũ molle è vino vel saliuâ pistum eleganter claudit, ea etiam quæ vix cicatricem ducant. Myrteo cerato duplo, triplóque iunctum, lene epuloticon est. Recens vnguinosum est, & per se liquefcit, myrteo exiguo interdum mistum. Aridum ætate infriari potest. Ex scoria & squama eris fictili crematis, extinctis vino, ex eóque diutissimè læuigatis, epulotica fiunt, quæ maligna iuuent. Medium quoddam genus efficies

*Ad maligna.*

*Ad media.*

mista lithargyro. In compositis auxiliis Galenus  
 prætulit quæ è cadmia & ladano conficiuntur: quæ  
 cùm multa sint, & variè concinnentur, pauca eâ-  
 que paratu facilia describemus. Cerusæ, cadmiæ  
 ana  $\bar{z}$ .4. ceræ, myrtini ana  $\bar{z}$ .6. Al. Plumbi vsti  $\bar{z}$ .3.  
 cadmiæ, æris vstis ana  $\bar{z}$ .2. Colophonix, olei myr-  
 tini ana lb.2. vini antiqui odorati, quantum suffi-  
 cit. Cadmia, vt priùs, elaboratur, vsta, lota, diùque  
 trita: præstabit quoque pharmacum, si reliqua duo  
 metallica similiter comparentur: deinde Colo-  
 phonia & oleo vnà liquatis, sedulò misceantur. E  
 ladano, quod prætumida vlcera labra imminuit,  
 callosa mollit, implet caua, & cicatrice claudit. Pi-  
 cis aridæ lb.1. & semunc. ærugini  $\bar{z}$ .3. æris vstis  $\bar{z}$ .2.  
 squamæ rubræ  $\bar{z}$ .2. & semiss. ladani  $\bar{z}$ .9. litharg. lb.  
 3. olei, vini optimi ana lb. 2. & semiss. hoc est  $\bar{z}$ . 30.  
 Lithargyrus oleo coquitur: coctione media reli-  
 qua metallica immittuntur, volutantur rudæ, dum  
 non inquinant: hic pix iniicitur: sublatis ac refri-  
 gescentibus ladanum è vino tritum coniungitur:  
 omnia conficientur in mortario: hoc & reliqua  
 medicamenta quæ siccent, & non mordeant, diu-  
 tiùs coqui melius est. Adhibitum in platysmate, ma-  
 ligna iuuat, nec ante quartum diem exolui debet.  
 Alia generis eiusdem secundo & quarto de compo-  
 sitione medic.  $\chi^1$  γένη. Sunt & hæc epulotica & ma-  
 ligna curant. Æruginis, æris cremati ana vnc. di-  
 mid. aluminis  $\bar{z}$ .2. ceræ  $\bar{z}$ .10. mitescit vsta ærugine:  
 trita omnia capiuntur cera præmollita igne: vel ce-  
 rato ex larignæ semúcia, & ceræ  $\bar{z}$ .1. alioqui cerato  
 myrteo vel rosaceo. Hoc vt optimo, in malignis

*E ladano.*

*E metallicis.*

*Galenus ad  
maligna.*

æruginis ana ℥.3. trita omnia ceræ pinguis ℥ 4. ex-  
 cipienda sunt. Alioqui mollitur cera è myrteo, mo-  
 dò in sole, modò igne. Ac ferè tripla cera est me-  
 tallicis, aut quadrupla: nonnunquam æqualis est:  
 constátque tantò fore acriora, quantò plus metalli,  
 ceræ minus acceperint. Al. Squamæ, æruginis ana  
 ℥.1. ceræ pinguis ℥.6. larignæ semunc. iuncta omnia  
 in platysmate adhibentur, quod vlceris locum, nec  
 eo ampliùs circumscribat. Munienda vicinia iis, quæ  
 phlegmonem arceant: tertio quoque vel quarto  
 die platysma reuellendum: hîc austero vino fouen-  
 da pars est, & platysma, vt priùs, apponendum. Re-  
 petuntur hæc dum cicatrix duci incipiat. In callis,  
 resinæ loco, vel æsypo, vel medulla cerui præsta-  
 bit vti. Et hæc quidem è metallicis, duris corpori-  
 bus & malignis vlceribus imperanda sunt. Plura  
 quarto de compositione pharm.  $\chi\tau\iota$  γένν. Vapor è  
 pastillis acribus Andronis, Pasionis è cinabrio vul-  
 gari, aliisque id genus, maligna iuuat: priùs autem  
 hæc suis fordibus expurganda sunt. Leue est, ceru-  
 sæ, lithargyri ana lb.1. olei myrtini lb.2. ceræ lb.ß.  
 terebinth. ℥.3. aluminis ℥.1. piperis semuncia, vel  
 paulò minùs: leuius erit, si sesquunciam thuris ad-  
 dideris.  $\delta\iota\alpha$   $\chi\pi\iota\theta\omega\nu$  clementius, quàm quod paulò  
 antè descriptum est. Singulariter facit ad ambusta.  
 Cerusæ ℥.5. al. ℥.6. & 3.2. lithargy. ℥.5. hordei tosti  
 ℥.15. al. ℥.5. (idque meliùs) ceræ ℥.5. alij ℥.15. (sed  
 maior hic modus est) ol. rosacei, vel myrtini ℥.15.  
 alij ℥.18. metallica è vino terito: ceram cum oleo li-  
 quefacito: hordeum cribratum inspergito: omnia  
 coquito, excolato, in mortario conficito. In ambu-  
 stis, alba meliora sunt, quæ neque thus, neque resi-

*Ambusta.*

nam accipiunt, in iis præcipuè, quæ aceto constant: piper additum cicatricem accelerat. Paratur facile, & mirabiliter iuuat. Aluminis vnc. dimi. in vini, aquæ pluuiæ vnc. 9. diluitur: linteolum vetus, sed bene mundum aqua inculcatur: hocque arefactum sole depectitur, & conceptum imponitur. In sedis, oris & genitalium inueteratis vitiis, vino uti melius est: aqua verò pluuia præferenda, quæ in cauis vlni vel quercus resederit. Al. Alumen nucis magnitudine teritur, & cum vnc. 3. mellis myrtei vel rosacei coquitur, aut fistili crematur, ad eadem viria. Aliud, in quo veterum & posterorum consensus est. Linteolum aqua illa vel vino madens, & expressum, molliter apprimendum plano, cui deinde pertenuem plumbi laminam induces & alligabis. Al. sine morfu siccat, & ægrè trahentibus cicatricem conuenit. Cerusæ ʒ. 2. gallar. *Ecerusa.* myrti, recrementi plumbi ana ʒ. 1. fiat pulvis. Aliud. *Album Gal.* Litharg. cerusæ ana lib. 1. coquantur in ol. albi lib. 2. aquæ purissimæ selibra, dum exhalauerit aqua, & purum pharmacum constiterit: purus sit ignis, & serenus aer, vbi medicamentum incoquitur: liquatis & ita coctis, adde terebinth. vel (si rebelle vlcus est) larignæ vnc. 2. vel vnc. 3. ceræ albæ vnc. quatuor, vel vnc. 6. Nam ut augetur resinæ modus, ita cera augēda est. Postea verò quàm omnia coierint, adde thuris semunciam, pompholygis, ostreorum, cadmiæ ana vnc. 1. hæc in cinerem vsta lauantur aqua, si sanies acris est: marina verò, vel aceto, si labra ulceris in callum extuberant. Inopia marinæ, subduplum salem aqua diffundes. Quòd si multus humor affluit, vino albo pellucido leuiter astringente,

# INSTIT. CHIRVURGIC.

*Calx.*

metallica lauabis. Miscentur autem his, cadmia, pompholyx, cerusa, lithargyrus, ostrea, buccinorum inuolucra, os sepiæ, calx & similia, quia præterquam quod epulotica sint, album colorem iuuant, qualia fingi voluit antiquitas. Calx septies lota, è rosaceo vel aqua diluitur, exponitur soli æstu medio, subinde reuoluitur, tetitur, abluitor: quum iam satis lota tritaque exaruit, è rosaceo pinsitur, imponitur, cicatricem ducit: vlcera neruorum maligna iuuat, & ambustis auxilio est. Sordes quæ in ampullis lucernariis subsidet, vlcera quæ mediis digitis excitantur, alopecias quoque adiuuat. διὰ χαλκίτεως ex austero, rubròque vino subigitur: deinde emollitur oleo melino vel myrteo: rosaceo etiam, si quis rubor calorque in oris vlceris existit: alioqui crassius in platysmate inducitur, vt vicina comprehendat, qua videlicet metus est, ne quid humoris affluat.

*Album  
Actuarij.*

Album Actuarij capite de repellentibus descriptum, epuloticon est, vt quæ emplastra alba è cerusa fingunt, quale hoc est non absimile albo Galeni. Cerae vnc. 4. rosacei libr. semiss. terebinth. vnc. 3. cerusæ vnc. 2. lithar. vnc. 1. thuris, cineris ex cochleis crematis ana semunc. cera, oleum, terebinth. simul funduntur: reliqua miscentur, versantur omnia, & in mortario vniuntur. Aliud leuius. ℞. cerusæ ℥. 1. lith. ℥. 2. aquæ rosarum sesquunc. rosacei lib. 1. metallica trita in mortario fortiter perfricantur pistillo duro: quod quum fit, deinceps ac paulatim liquida affunduntur. Album Rhazæ. Olei rosacei libr. 1. cerusæ ℥. 1. cerae ℥. 2. caphuræ ℥. 1. albumina ouorum tria: melius fiet cum semunc. vel ℥. 6. litharg. Leue est, & magis conuenit, vbi calor, vltio, excoariatio est. Ce-

*Album Rhazæ.*

rufa per fe in pari rofaceo cocta ambufta iuuat, & *Cerufa.*  
 attrita. Ad eadem facit vnguētum de cerufa. Alij ex  
 rhodoftagmate cerufam terunt, vt fit liquidi mellis  
 craffitudo, quod in calore, in paruis inflammationi- *Vnguenta*  
 bus, quales ad nafi pinnas eueniunt, vtile eft. Trita *epulotica.*  
 è vino humidioribus vlceribus cōuenit, per fe am-  
 bufta curat: permifta butyro, mollit, coquit, cicatri-  
 cem claudit. Epulotica funt, vnguentum deficcans  
 rubrum, vnguētum de plumbo, & alia. Puluis epu-  
 loticus balauftiorum, ſanguinis draconis, cadmiæ  
 argenti, æris vſti loti ana: fiat puluis: duris corpori- *Plantago.*  
 bus, contumacibus vitiis & nimium humidis vtilis  
 eft. Vtrāque plātago cum radice ſiccatur vmbra, tri-  
 ta ad cicatricem inſpergitur. Triapharmacū, quod-  
 que huic ſimile ex litharg. & oxelæo, in glutinanti- *Nutritum.*  
 bus deſcribetur, epulotica funt. Nutritum quoque  
 quod à Rhaze & Auic. hoc modo fit. Lithargyrus  
 in pollinem trita ex aceto & rofaceo diu verſatur in  
 mortario (vt quidam volunt) plumbeo, piſtilio plū-  
 beo: modus eſt vt inde craſſior fermentetur, & ex-  
 turgeat. Sunt qui addant ſextulam æris vſti, vel cre-  
 mati plūbi, aut tantundem aluminis, balauſtiorum,  
 rubiæ, ſanguinis draconis, cadmiæ argēti, caphuræ:  
 idque ſingulari ope in malignis & pertinacibus vi-  
 tiis. In cancroſis ceruſa permiscetur piſtillo & mor-  
 tario plumbeo. Alij hoc modo. Litharg. ceruſæ ana  
 ꝑ. 2. teruntur in mortario, vniunturq; ex olei myrti-  
 ni vel roſ. ſeſquunc. Sunt qui oleum prius circum-  
 agant in pila plūbea, & radio plumbeo concutiant  
 dum craſſeſcat, & nigrius euadat, vt olim Apollo-  
 nius. Alij ſic vnita omnia olla noua vrunt, puluerē  
 reponunt mirabili remedio ad cācroſa, malignaque



# INSTIT. CHIRVURGIC.

*Ad canceros* fedis & genitalium vlcera. Alij loco olei succum  
*pudendorum.* acetosæ, solani, polygoni, plantag. omphacis & si-  
 milium, eo modo exercent plumbo, & metallis ad  
 vsturam iungunt. Quidam etiam theriacâ addunt,  
 & vnâ cum aliis concremant. Frequentissimus etiâ  
*Pompholyx.* vsus est pompholygos: suo vetustas, suo posteritas  
 vtrâque salubriter vsa est. Vritur pompholyx, & in  
 cinerem resoluitur: in solani succo, rhodostagmate,  
 & aliis generis eiusdem diem integrum maceratur:  
 tum pistillo plûbeo in plumbeo mortario diu exer-  
 cetur: bis in die inseritur cancerosis vlceribus & ma-  
 lignis. Quod autem pharmacum διαπομφόλυγος  
 inde conficitur, variè describunt. Aliter enim Ori-  
 bas. Paulus, Aëtius, aliter quoque Arabes. Sed hoc  
 maximè epuloticon est. ℞. pompholygis, cerusæ,  
 litharg. ana ℥. i. ladani ℥. 2. acaciæ ℥. 4. ceræ ℥. 3. myr.  
 ℥. 8. ouorum affatorû vitellos 9. metallica è vino te-  
 rito: cerâ cum oleo liquefacito, ex quo ladanum &  
 acaciam cōmisceto: deindè vitellos & metallica in  
 mortario reliquis coniungito. Simile ferè quod se-  
 quitur. ℞. cerusæ, litharg. pompholyg. ana ℥. 2. cad-  
 miæ ℥. 4. medullæ cerui ℥. 3. cerę, ol. rosacei ana lib.  
 1. myrtini ℔. ss. Liquatis aliis metallica è vino trita  
 permiscentur. Hoc cancerosis conuenit, pueris, eu-  
 nuchis, mulieribus, atque omnino mollibus corpo-  
 ribus, vbi cicatrix citra dolorem ducenda est. Nico-  
 lai, Olei rosarum ℥. 10. ceræ albæ ℥. 5. succi expressi è  
 granis solani ℥. 8. cerusę lotę ℥. 4. plumbi vsti, tuthię  
 ana ℥. 2. thuris ℥. 1. oleū cū succo decoquito, donec  
 expirauerit succus: deinde cerâ oleo confundito, re-  
 liqua in farinâ trita in mortario permisceto, omniâ-  
 que diu circumuoluito. In putridis & cancerosis,

vbi feruor aliquis est, summa fiducia vsurpandum est, quod nulli veterum compositionum cedit. In corrodentibus & inflammatis vlceribus, succo seridis subigunt. Liquido cerato rosaceo emolliūt, immittunt tubulo, ad rhagadas & alia id genus: in callosis, lini succus & adipēs misceri possunt: ad inflāmata, croco & vitellis oui intingitur. Atq; hęc sufficiant. Reliquum verò genus est eorum, quę excreſcentem carnem detrahant, de quibus capite de Pyroticis abundè differetur. In cicatrice vitia sunt: quia excreſcit, quia caua est, quia deformis, durior, scabrior, mollior, & maior est. Excreſcit parum siccato, purgatoque vlcere. Caua est nimium siccato, & ante tēpus inductis epuloticis: vel quia pars subiecti ossis igne absumpta, sublata fero, aut abscessu excidit. Deformem facit sutura frequentior & inepta, maior incisio, & alia quę vel cauā, vel eminentem efficiunt. Durior est, nimium siccātibus medicamentis, nec lenientibus tempore immistis, quod, vt ante scriptum, præcepit Hippocrates. Mollior infra modū siccato vlcere. Excreſcens cathæreticis reformatur, scarificatur, absumitur. Caua reficāda & exterenda, vt quod desit aggignatur. Mollior siccāda est. Deformitas mollientibus, lenientibus, discutientibus, exedentibus quoque & cathæreticis, aliquando etiā astrictione medicamentorum corrigitur. Ad hęc omnia materia suis locis descripta est. Epuloticis vtimur iam propè pleno, nōdum tamen ad æquato vlcere. Celsus linamēto è frigida pressō, primū integit: deinde vbi iam æquata cuti caro est, sicco vtitur. Ac bene fiet, si in frigida illa alumen

*Quādo epuloticis vsus, & ratio vtendi.*

sum exaruerit. Et hæc quidem in leui vlcere faciunt  
 fatis. In maligno, bene puro linteolo sinum molli-  
 ter extergebis: epuloticon induces quod plurimum  
 siccet. Et quia ferè aliquid calli labris concreuit,  
 oras vlceris pharmaco circúscribes, quod attenuet.  
 In dolore, rubore, phlegmone & rheumate, pary-  
 gro recenti vtendum erit: vel διὰ χαλκίτεως li-  
 quido in platysmate. Attenuans platysma æquali  
 linteo contegitur, ex quo splenium superdatur, ex-  
 pressum frigida, aliquando vino. Ac frigiditas sple-  
 nij, subinde refuso frigido liquore contineri debet:  
 postremò fasciæ commodè alligandæ, quas tertio  
 primùm die absolues. Hic molli flocco saniem de-  
 tergebis, & priorem curam omninò reuocabis, è re  
 nata vel retento, vel mutato consilio. Recentiores  
 vino calido, cui balauftia concoxerint, aut similia,  
 vlcus fouent: alioquin aqua, si quid caloris est, quæ  
 vim aluminis conceperit. Ac sit octupla aqua alu-  
 mini. Sed in calore astrictio suspecta est: molli vel-  
 lere humorem sorbent, pharmacum imponunt, su-  
 perdâr stuppas vino madidas, vel aqua: omnia glu-  
 tinantibus fasciis cōstringunt, non iis quidem, quæ  
 ita contrahant, vt è rotundo oblongum fiat: nisi  
 cauitas supersit, & vnà cures, vt & glutines, & cica-  
 trice claudas. Galenus interdixit aqua, vt ne nudum  
 vlcus contingeret. At in calore & iam procedente  
 cicatrice, non adeò nocere potest. Cicatrix (si qui-  
 dem naturaliter ducitur) in ambitum vlceris sanis  
 partibus primùm concrefcit, deinde paulatim ad  
 centium progreditur, postremò in ipso centro  
 coalescit atque perficitur.

De glutinantibus C A P. 5.

**L**ongius fortasse, quã res postulabat, de glutinantibus sermo dilatus est. Verũ ita nos coëgit, traxitque consequens medelarum ratio: nec alius obtigit locus, in quo de illis orationem commodius institueremus. *κολλητικὰ* Græci vocant *συμφορικὰ* & *πρωματικὰ*. Quidam etiam *ἐναμα*, & peculiariter quæ cruentis vulneribus adhibentur. Siccant hæc omnia ad secundum ferè gradum; media natura inter ea quæ ad cicatricem ducunt, & quæ carnem regenerat: non detergent, sed astringunt, prohibentque, ne quid humoris vlcerũ labris obueniat. Nec in cruentis solũ vsurpari solent, sed ad sinus, fistulas, maligna vetustaq; vlcera transferuntur. Opitulantur celerius, si integra partium natura est: si paucus sanguis idẽmq; purus affluit: si non abrafa, nõ præcisa, sed vel salua, vel parte aliqua etiamdũ hærens cutis est. Etenim cuti cũ subiecta carne naturalis quædam amicitia coit, vt ægerrimè senescat, quibus omninò illa excidit: facillimè, vbi incolumis seruata est. Mirum q̃ præcisa, sed loco suo reddita, coalescit, recipit spiritum, & quasi mortua reuiuiscit: quòdq; è plaga luore ducto, nõ in iuvene solo, sed etiã sene viuidũ colorẽ recuperat. Magna igitur cutis habẽda ratio, neq̃te ob id solũ, quòd inde celerius glutinatur vulnus sed quia interiecta cute plurimis iuuatur, quæ nuda caro non perferat. Nudũ vlcus linteo, lana, spõgia irritatur: medicamẽtis paregoricis sordes colligit, vellicatur catharticis, iuuatur omnibus, si familiari cute quasi propugnaculo obtectũ est. Ideòq; & abrafa cutis & pẽdula, suo loco inducatur, & redi-

*Facultus glutinantium.*

cta molliter apprimatur: sic enim vlceri celerius cō-  
fueſcet. Neque deſperat quę ſuſpenſa, iam liuida aut  
nigra eſt, etiā ſi eo abſceſſit loco, vbi os ſine carne,  
vel cartilago ſubiecta eſt. Ea enim vel in hoc acer-  
bo caſu ſuo corpori reconciliatur, & vitalem ſpiritū  
recipit: quod in genu & nuda carne tibia, in gibbe-  
ro, vbi tantū ſubiecta cuti mēbrana eſt, experiri li-  
cet. Id quę fieri tum aliorū pharmacorum ope, pro-  
dedit Galenus, tum celebri illo, quod Heræ & At-  
talo attributum. Deſcribitur hoc libro primo de  
compositione pharmac. *χρὶ γένν*, titulo *Διὰ πινέ-  
πew*, Attalo & Hera authoribus, & paulò poſt in Al-  
bis Aſclepiadis. Aſclepiades Pāphiliū vocauit. Iam  
verò & labra vlceris animaduertēda ſunt: quia vi-  
delicet alia cōtracta, alia euerſa, plurima dehifcunt.  
Quas formas vlcerū in vario labiorum motu per-  
cipias. Os enim cōmiſſis labris interdum clauditur:  
nonnūquam illa diducuntur, vt ſit hiatus. Aliquādo  
quoque aliter deformantur, quia alterū retortum  
labrū & euerſum: alterū in os reductū, vel vtrāque  
modò intrò, modò foras replicata ſunt. Contracta  
labra vlcerū ſpecillo vulnerario molliter diſiungē-  
da, & vtrīnque abductis faſciis, vt extra vulnus ma-  
gis cōſtringantur, ſeparanda ſunt. Colligenda verò,  
quę plurimū hiāt, à ſanis partibus ineunte faſcia:  
quę vt ad oras vulneris propiū accedit, ita firmiū  
aſtringatur, ea ſcilicet ratione, vt ne nimium cogen-  
do, nimium cōprimas, & dolorem gignas. Euerſo  
tantū altero vlceris labro hinc lintea abduces, &  
in alterā partem quaſi trahēdo volutabis. Si vtrūn-  
que euertitur, ea quā *ἐκδοῖν ἀρχῶν ὀπίδειν* vo-  
cant, neceſſaria eſt. Atque hæc labra flaccidis, callo-

*Labrorum  
vlceris ratio.*

*Ad contra-  
cta labra.*

sis, muccosis & cācerosis vlceribus magis eueniunt. *Quatuor ra-*  
 lam verò glutinatio fit, vel innata carne (συσάραξις *iones gluti-*  
 σιν Græci vocant) vel eo quem illi ἀσκησιασμόν, *nandi.*  
 nostri infibulationem appellant: deinde etiam ἡ  
 ῥαφήν futura: postremò καὶ ὀπίδου fasciis obli-  
 gatis, quā deligationem vertūt. Sed omninò vt vul-  
 nus glutinetur, enato corpore, religatis, vt prius, &  
 inter se plexis carnū fibris coīre necesse est. Id quod  
 fibulis acu & fasciis sæpenumerò adinaturatur. Ac  
 ferè vt sunt vlcera & partes, ita remedia distinguun-  
 tur. In paruo ac recenti vlcere fasciola in orbem ne-  
 xa satis esse potest: & quæ cultellis cibariis fiunt,  
 solo fuctu, qui partes colligat, sæpius coalescunt.  
 Alia vulgari terebinthina illita (quæ abietina potius *Nullū v ul-*  
 vocāda est) & iniecta fasciola celerrimè cōmittun- *nus vel mi-*  
 tur. Verū nullum omninò vulnus vel minimum, *nimum con-*  
 etiam si acus minima pupugerit, contemni debet, *temendum.*  
 multò minùs, si vel plethora, vel cacochymia, vel  
 denique sensus acrior in metu est: alioqui dolor,  
 phlegmone, conuulsio ad exitium sequi consuevit.  
 Itaque statim initio relicta glutinādi via, paregori-  
 cis vtendū erit: quæ dolorem leniāt, & à phlegmo-  
 ne vindicent partem, donec omnia pericula abiisse  
 videantur. Ac ferè quinto & septimo die grauiores  
 casus sese proferunt, quos quum æger saluus euasit,  
 & omnia tuta sunt, deterfum siccaturmq; vlcus glu-  
 tinabis. In maiori vulnere maiora remedia quærē- *In maiori*  
 da sunt, deligatio, sutura, fibula, medicatio: vbi me- *vulnere.*  
 dicamentū quoque siccare magis necesse est, hīcq;  
 audienda sunt magnū & paruum in sectione, non  
 quorundam veterum opinione, qui ἐπίχειρον, insi-  
 gne vulnus è natura loci, μέγα, magnum è periculo

definiunt. In glutinādo distingui debet naura corporum : quia videlicet (vt loquuntur illi) aliud *δυσελκές*, quodque ægrè coalescit : aliud *ευελκές*, in quo vulnera celeriter cōiunguntur. Vulnera rotunda non facilè glutinari, nisi in longitudinē dissecentur testes sunt, Hippocrates, Aristoteles, Gal. Cassius & alij medici veteres. Lentiginosa corpora, ruffa, cacochyma tardiùs sanescunt. Ac breuiter difficultas nascitur ex iis, quæ in rebelli vlcere proximo capite tradita sunt: adhæc externis casibus, culpa medicorum, ægri & eorum qui ægro inseruiunt. Primum igitur in cruēto vulnere (si quidē neque profundum est neq; hæmorrhagia extitit) molli tormēto, spongia, pāniculo detergendus cruor est : atque illa priùs inculcātur frigida, & expressa adhibentur. Patrocles apud Homerum Eryphili vulnus tepida exterget, rudiùs quidem, quod postea ab Hippocrate interdictum fuit. Quòd si altiùs descēdit vulnus, erupitq; sanguis, aceto magis vtendū erit. Sic enim grumos incides, & sanguinem cohibebis. In neruis, ab aceto metus est, nisi seruata tenuitate, frigiditatē eius exoluas. Ideoque specilli extremo linteolū alligabis, quod vel sapa, vel melicrato madefacies. In lacunis & vlcere veteri vbi glutinandi tēpus accesserit, vinū & ænomeli idonea sunt. In mulieribus, pueris, eunuchis, atq; id genus corporibus, tū alias, tum maximè vulnerato capite, aceto abstinemus. Idem aperto perioestio relinquendū est. Aceti loco, vino & ænomelite floccū intingimus, exprimimus, & cruorem inde extergemus. Atque vbi is ritè deterfus est, nihilque labris vlceris intercedit, qualia sunt grumus, pilus, oleū, pluma & similia, sequitur

*Ratio glutinandi.*

*Aquē & aceti vsus.*

ut latera lateribus, oræ oris, ritè coëant. Ponimus autem neque dolore, neque phlegmone, neque ullo alio vitio vlcus laborare: ac iustâ carnē lateribus vulneris interesse. In rectis vulneribus labra facile adducuntur, multò magis si molle corpus est: & adducta fasciis continenda sunt, ex duplici initio, aliqui simplicibus, sed futura interdum addita, & fibulis. In transuerso vulnere oræ dissident magis: quare futuris & fibulis opus est. Atque has figuras vuln-  
*In transuerso.*  
 rum ex fibrarum cursu, quæ musculos intexunt, distinguere oportet. In magnis & profundis vulneribus vincula ex duobus initiis necessaria: eadē quoque in latis & profundis: sed hæc præterea altis futuris cogenda sunt, neutra verò præproperè glutinanda, ne quid reliquum fiat, unde postea recrudescant. Fascias autem austero vino & nigro maduisse iuuat, quod in cæteris vulneribus præferendum est: quia repellit, phlegmonem prohibet & cogit. Quin & aliquod eorū quæ contrahunt, licebit incoquere: sed modus sit, ut ne nimis adstringendo moueatur dolor. In molli parte, extrema auricula, imo naso, frõte, bucca, palpebris, cute gutturis, ventre, membranis, quæ nõ sunt tendines, sutura cõuenit. Præputium assuitur & infibulatur ut carnosum genus, ubi nimium dehiscit, nec oræ facile cõiunguntur. In capitis vulneribus extrema cutis, tum futuris, tum fibulis cõmitti potest. Cartilagines auris effractas Archigenes fibulis cõtinebat, & argilla cauum auriculæ implebat, ne cõcideret. Alij diuisas partes eiusmodi, primum quidem digitis cõmittunt: deinde glutine, visco, aliisque generis eiusdem in breui platysmate quasi ferruminant. Sed quæ viscida in-



# INSTIT. CHIRVRGIC.

pingas, glutinare præstat, vt non solùm contineant, sed diuisas inter se partes concilient, atque cōglutinent. In particulari materia eadem seruat ratio, quæ iam sæpius in aliis generibus pharmacorū præscripta est. Eaque seligenda, vt sunt partes, vt molle durūmque corpus: vt recens, vetustum, paruum, magnūmque vulnus est: quod in fasciis, fibulis, futuris similiter distingui debet. Ac præcipua ratio haberi debet in vulneribus, quæ in ventres corporis penetrant, aut alioqui multū profunda sunt, vt ne commissæ parte, quæ exterior est, interior distincta, inglutinatæque maneat: aut si hæc quidē glutinatur, infirmior tamen sit cicatrix atque vnitio, vnde & suppuratio intus colligatur, soluta cicatrice, & exteriores oræ resoluantur, quod monuit Hippocrates. Glutinādi vim habent ebulus, sambucus, syderitis, palmæ, pini, tædæ cortices: dracōtij folia recentia, herba quæ fraga gignit, anagallis, salix, androsæmum, astragalus, phlornunculus, telephium, symphytum petræū, araneæ tela, sed ea præcipuè, cui è pistrino farina incederit. Equisetū maxima vulnera præfectos etiam neruos cōglutinat. Coccus baphicus ex aceto pistus ingentia vulnera coniungit: cū oxymelite diuisos neruos cōciliat. Magnis quoque vulneribus Chamæpytis idonea est. Arnoglossum quadam temperaturæ symmetria iungendis veteribus lacunis, atque recentibus vulneribus, nulli remedium cedit. Rebellia, rheumatica, putrilaginosæ vlcera, & in dysenteriis facta percurat. Eaque omnia, quia conuenienter refrigerat, siccatur, adstringit, nec mordet: leuiter digerit & extergit. In humidis vlceribus, & partibus quæ natura

*Particularis  
materia quo-  
modo seligē-  
da.*

*Chamæpy-  
tis.*

ficciorē pręditę sūt, tota herba cum radicibus sic-  
catur, tritaque inspergitur: idem rei per se commo-  
dum semen est. Spongia, lana succida, lintcolū, im-  
merguntur aqua, aut vino potius: vel si profluxit *Spongia, &c.*  
sanguis, oxycrato: adhęc liquoribus aliis, qui con-  
trahant: deinde expressa vulnē colligantur. Quer-  
na folia trita in læui petra, vulnē securi factō Ga-  
lenus apposit ut etiā vicina comprehenderent,  
eōq; remedio glutinauit: ea ipsa vino cōspergi pos-  
sunt. Caseus recens & oxygalactinus, Isatis sativa, *Isatis.*  
neruos pręcisos & tendines in fine musculorū iun-  
gunt, & duriora corpora conglutinant. Centauriū *Centaurium*  
minus, foliis & floribus vlcera magna coniungit: *minus.*  
arefactum collecticis miscetur, multō magis si rheu-  
maticum vlcus est. In quo genere pręstantissima  
medicamenta sūt, quę valde siccant, leniter ad-  
stringunt, ut non mordeant. Pentaphylli foliū ner-  
uos adiuuat, cum melle tritum. Ad vlcera capitis,  
myrrha, aloë, terebinthina, assis aliis tritisque, farina  
rostri hordei & milij, Mummia vtendum est. Cala-  
mynthę succus membranīs vulneratis infusus egre-  
giē glutinat. Sed hoc & similia, acriora scilicet, quę-  
que vehemēter siccant, Megetis sūt Sydonij &  
Eudemi, qui in membranīs cerebri, acribus, mor-  
dētibus, oxymelite, aliisque generis eiusdē vsi sūt.  
Milij farina iisdem vulneribus inspergitur. Resina,  
pix sicca, amurca cocta, duris corporibus adhiben-  
da sūt. Pix humida, minūs quā sicca mordax:  
hordeum vstum, aloë ex aqua trita: herbę folia &  
succus, quā ex India comportant, & patrio no-  
mine Zambanam appellant. Aloë vulgaris est, quę *Zambana.*  
tenaci vitā in multos menses viget: ē laquearibus æ-

*Attractylis.*

*Hedera.*

*Vlmus.*

*Aqua in folliculis vlni.*

*Aqua vitis.*

dium & tabulatis magna virore cōmendatione suspenditur. Constat hoc remediū certo experimento naturarum. In colleticis quæ ad manū sunt, præcipua laus attractylidi. Eius cacumina austero vino vel oxycrato incoquantur: excipitur concha quod enatat oleosum. Eadem quoque in reticulum data, quod duabus ollis argilla iunctis, eliciendo oleo intercedit, oleagineum liquorem reddit. Atque ollam superiorem igne cingi, inferiorem terra defodi, reliquæque omnia ea ratione cōparari oportet, quæ superiore libro præscripta est. Cuidam decisus nasus, quæ os in cartilaginem definit. Rusticus propēdentem partem alteri digitis coniunxit, herbam tusam, & è vino nigro tritam, quod millefolium appellat, impegit, rudius omnia colligavit, vnde celeriter restitit profluens sanguis, & vulnus pulchra cicatrice breui coit. Folia hederæ recentia in vino cocta, grædia vulnera coniungunt, & maligna sanant: atque inde succus, tum per se, tum rosaceo temperatus (si quidem acior videatur) narium vlcera & aurium percurat. In vlmō multa sunt quæ laudes. Decocto vlni compingendis fractis ossibus, veteres vsi sunt: eiusdem cortex & folia ad alligata, glutinant, ambusta iuuant, vt sine manifesta cicatrice coisse videantur. Teruntur folia: cortex veluti fascia obligatur. Purgat, implet, cicatricem ducit, glutinat, exterit, delet papularū vestigia, & artificialibus balsamis commiscetur aqua, quæ vlni folliculis includitur, bene purgata vermiculis. Ea Crito vsus est ad Lichenas. Balsamo quodam raro & pretioso principes vtuntur glutinando. Sunt qui eam aquam quæ castratis vitibus exudat vere, lenticula vitrea excipiant: vas

operculatum sedulo, clausumque, annum integrum exponunt soli, loco subdiali, sed qui ab iniuriis cæli tutus esse possit: ac lenticulam ad solā subinde vertunt, ut vndequeque radij euerberet, & aquam coquant. Melligo tandem concrefcit, quæ sit balsamo viribus æqualis, ἀμπελοσαλμα ex analogia (si vis) appelles. Duriorum sunt corporū, sorbus, mespilus, pinaſter, quercus, & quæcunque acerbæ sunt. Simite quernis foliis comparanda sunt. Addunt bolum armenam, terram ſigillatam, & ſimilia. Compoſita ſunt, cerati myrtini ℥. 3. ceruſæ ℥. 1. vetuſta glutinat. Aloë arida cœnomelite coquitur, linamētum inde tinctū vulneribus capitis inferitur: phlegmonem prohibet & iungit. Galenus mollioribus naturis pharmaca temperauit ex lithargyro, oxelæo & cœnelæo: durioribus ex ærugine, bitumine, ſquama, aloë & myrrha. In quibus quia bitumen præcipuam vim habet, verū friabilius eſt, quā ut ſolutum oleo emplaſtrum reddat, cera quoque ad corpus vnā temperatur. Sed oleum & cera vim bituminis exoluunt: ideóque ſquama additur, ærugo, & alia: atque hinc vocata barbara comparantur. Fiſtulas expurgat, glutinat, priuſquam occaleſcant, & cicatrice regit. Induratis muſculis vtile eſt. Lithargyri ℥. 4. olei & aceti ana ℔. 1. vel paulò minus coquantur omnia dum omnino combibitum oleum, acetum verò expirāſſe videatur, nec iam inquinet, & nigro ſplendeat. Acetum ſit acerrimum, pellucidum, ex vino factum non aquoſo: oleum verò antiquiſſimum. Hoc parabili auxilio Galenus parotidas criticas, quæ iam fiſtulas traherent, in pueris, adoleſcētibus, mulieribus, ſæpiùs curauit. Siccat ſine

*Galenī phar  
māca.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

morfu, vlcera difficilia perfanat, cruenta glutinat,  
 omninóque vlcera magna parúaque iuuat, dum  
 ad cicatricem perueniant. Hoc emplastrum alij ni-  
 grum, alij vnguentum de lithargyro coctum ap-  
 pellant: nec à Tripharmaco Mesues alia re differt,  
 quàm quòd plus habet aceti & olei. Recentiores e-  
 nim parem aceti modum & lithargyri: duplum o-  
 leum commune vel rosaceum commiscent. Differt  
 autem è Nutrito, quòd aliud Tripharmacum est  
 Mesuæ: quia in hoc materia cruda est, ex quo non  
 ita siccatur, & vim aliquam concipit è plumbeo mor-  
 tario, in quo conficiunt. Quod ex lithargyro & æ-  
 nelæo fit, contra rheumata valet, induratos muscu-  
 los adiuuat, & cruenta iungit. Litharg. libr. 1. octo  
 dies, vel eò plures in Sole teritur affuso vino giluo,  
 tenui, pellucido, odoro, subadstringente. Ac quan-  
 tò plus vini combibet, tantò efficacius futurum est:  
 postea cum sesquilibra, libris duabus olei plus mi-  
 núsue excoquitur, dum non inquinet. At hæc assi-  
 duè versare spatula necesse est. Melina sunt multa  
 2. de compositione pharmac. *ἔνν*, quæ gluti-  
 nent. Quod sequitur ex vino Heræ, luxata firmat,  
 recentes puerorum strumas discutit, inueteratos si-  
 nus, quique in vacua penetrent, percurat. Recentia  
 vulnera etiã magna conglutinât. Litharg. auri libr. 1.  
 hoc est  $\frac{3}{4}$ . 12. sic enim perpetuò libram Græcorum  
 vsurpamus: diu teritur in Sole affuso vino giluo, te-  
 nui pellucido, vt prius. Quo teretur diutiùs, & plus  
 liquoris rapiet, eò præstantius euadet. Ex quo iterũ  
 læuigatur in mortario, instillato deinceps atque al-  
 ternatim modo oleo concalfacto, modò vino illo:  
 atque utròque quantum fieri potest, saturari debet.

*Tripharma-  
cum.*

*Nutritum.*

Hic in cacabum transmittitur, & cum olei & vini gilui ana  $\mathfrak{z}$ .9. vel eò pluribus excoquitur: bene coctæ lithargyro immiscentur resinæ pini læuigatissimæ lb.1. ceræ albæ  $\mathfrak{z}$ .10. opopanacis sesquunc. coquuntur omnia molli igne, dum non inquinent. In usu, sanguine agrestis columbæ conspergitur. Al. Critonis, quod iungit recentia, cicatricem ducit & extrahit. Litharg. libr.1. ceræ libr.1. terebinth  $\mathfrak{z}$ .2. æruginis  $\mathfrak{z}$ .2. olei veteris  $\mathfrak{z}$ .9. aceti  $\mathfrak{z}$ .2. & semiss. Litharg. oleum, acetum, ærugo blando igne coquenda sunt: iam propriè coëuntibus resina ceræque cōiungitur, coquuntur dum sint corpus, & non inquinent. Magis glutinabit pharmacū, si myrrhæ, aloës, farcocollæ ana  $\mathfrak{z}$ .1. misceas ea quæ per se glutinent. In malignis, squamæ & vitrioli genera conspergi possunt. Celebre & polychrestō Macherionis pharmacum ad vlcera maligna: recētia glutinat, phlegmonem prohibet, præcipuè vbi aliquid contusum fuerit: rabiosi canis morsibus medetur impostum, ac subinde commutatum: phagedænis conuenit, aurium, nariumque vlceribus carnem generat. In genitalibus & nudatis ossibus idem efficit. Aristoloch. rotundæ, galbani, opopanacis, æruginis, iridis, ammoniaci, myrrh. ana  $\mathfrak{z}$ .1. terebint. ceræ, ol. omphacini ana  $\mathfrak{z}$ .7. & semiss. Ærugo ex dimidio, ol. seorsum teritur, cum reliquo oleo, cera & terebinthina molliter coquuntur: ærugo additur: postea verò ammoniacum ex aceto fusum, galbanū purgatum, & opopanax permiscētur, postremò refrigeratis reliqua insperguntur. Ægyptiac. Andromachi vulnera ense facta, vel profundissima, triduo glutinat, quod capite de ossium vitiis describetur.

*Critonis.**Macherionis.**Ægyptiac. Andromachi.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

διὰ χαλκίτεως fistulas & magna vlcera coniungit. Axungia veteris bene purgata fibris & sine fale lb. 2. ol. veteris, litharg. ana lb. 3. chalciteos ℥. 6. conficiatur ex arte. Quodd si palmaria spatha defuerit, saligna rudicula cōmouebis : aut ex ea materia, quæ glutinando cōueniat, non radice cannæ, cui magna vis inest detergendi. Salix verò siccatur & astringit, idque sine morfu, quæ omnia glutinando idonea sunt. Quod è succo liliorū conficitur, diuturna malignaque vlcera cōglutinat: nimio humore languidis malè coalescentibus, cicatricem ægrè trahentibus vtilissimum est : vehementer siccatur, idque citra morsum, vt incisa capita musculorum possit cōiungere. Succum foliorum lilij ℥. 5. mellis & aceti ana ℥. 1. coque lento igne, dum crassescat. Alij è symphyti succo & aliis quæ per se glutinent, melle rosato & aceto sambucino eadē pharmaca componunt, quæ efficacissimè glutinent. Ad neruorum vulnera cochlearum carnes concisæ tritaque adiecta myrrha & thure conferunt. Eosdē neruos vniunt lumbrici terræ triti & impositi. Iam verò cruentis, suggillatis, excisis quacūque parte corporis, vitiligini, lepræ, maculis, crustis efficacissimè opitulatur, quod paratur ex Attractylide. Attractylidis effossæ cum radice, deinde siccatae vmbra, postremò trita vnc. quatuor : ol. dulcis vnc. quatuor : Colophoniam sesquilibra: æruginis ℥. 2. ceræ ℥. 8. Oleum, ceram, Colophoniam liquefacta excolato: deinde æruginem, postea herbam commisceto : iuncta omnia frigida immergito, manibus versato, pinsitroque : pista in aqua noctem finito, atque ita vsui reposito: verum Colophonia nostra siccior est. Liquida quoq; vete-

*Salix.  
E succo liliorum.*

*Ad neruos.*

*Ex Attractylide.*

res utebantur, quæ si defit, sicca partim oleo, partim terebinthina molliēda erit. Hoc autem glutinat recentia. Rhodini vel myrtini  $\mathfrak{z}$ . i. terebint.  $\mathfrak{z}$ . i. æruginis  $\mathfrak{z}$ . 2. si quidem lota est, & molliora sunt corpora, alioqui sesquidrachma. Barbarū Galeni. Picis  $\mathfrak{lb}$ . i. bituminis, ceræ ana selib. ammoniaci, mannæ ana  $\mathfrak{z}$ . 3. cerusæ sesquunc. ol.  $\mathfrak{z}$ . 20. nam sic melius, quàm  $\mathfrak{z}$ . 17. Al. Est & aliud insigne Barbarum emplastrum nigrum, quod capite de hæmorrhagia describetur. Plura quoque primo & secundo de compositione pharm.  $\chi\tau$  γένη. Atque hinc ad recentiorum medicamēta transeundum, si prius monuerimus dige-

rentia & attrahentia cerato temperata fieri sarcotica: sarcoticis fieri glutinantia, si quid astringentium permisceas: aut si iunxeris quæ siccent magis, & astringant, reddi epulotica. Basilicū magnum Mesuæ glutinat nervos. Celebris est pulvis (quem rubrum vocant) ex sanguine draconis, & sesquialtera ratione vel dupla thuris. Alij calcem, bolum armenam, santalos cōmiserunt. Sunt qui hoc modo conficiant. Symphiti maioris, boli armenæ ana  $\mathfrak{z}$ . i. picis Græcæ  $\mathfrak{z}$ . 3. mastich. olibani ana semunciam: sanguinis draconis, mummiæ ana  $\mathfrak{z}$ . 2. Pulveres futuris insperguntur, vel in cerato imponuntur. Sanguinē draconis collecticon variè conficiunt. Thus, mastichen, bolum armenam æqualiter mista, hirci sanguine mactati Augusto mense concorporant. Alij aliter ex eadem materia. Quidam bolum armenam terunt, faciuntque ut plurimum sorbeat sanguinis hircini & sorborum succi. Plinius sorborum succo & caprillo sanguine compingit. Eidem Plinio & Solino sanguis est draconis, qui dum vulneratus

*Barbarum.**Quaratione  
in varia ge-  
nera remedia  
commutes.**Pulvis rub.**Sanguis  
draconis.*



# INSTIT. CHIRURGIC.

elephas concidit, colliso casu dracone colligitur. Aëtius è succo herbæ Indicæ ( quem dracunculum vocant ) fingi credidit. Dracontio nostro vis inest glutinandi. Cartilagines mediâ naturam habent inter ossa & carnem. Itaque glutinantur non tam siccantibus,quàm quæ catagmatica,aut quæ porotica à gignendo callo appellât,nec tam mollibus,quàm quæ ἐνσχυμα, carnem vniunt.Eâque natura cōstant tenaci & viscida,pix,manna,cato & salina cochlearum,viscum,glutinū fabrilē, pollen visco illigatus, tragacantha in aceto fusa, gummi Arabicum, aloë pinguis,terebinthina è vino lota,muccagines, aliâque id genus : quibus sanguis draconis, pulvis ruber,& alia quæ per se glutinandi vim habeant,coniunguntur. Ita concorporata pharmaca illinuntur, cōpinguntur,adhibētur in spleniis,& veluti incerata tela,quæ arctiùs consuetur,vt pharmacū firmiùs inherescat.Sed si magna vulnera sunt,sibula vel acupriùs conducere oportet : deinde medicamēto impingere:id in cartilaginibus aurium & narium fieri debet. Cochleæ cum suis volutis diu teruntur in mortario, vt nihil asperi reliquum sit. Sanguis draconis subquadrupla,manna suboctupla ratione adiungitur, permiscetur in mortario, & affiguntur. In naribus ( quod antè dictum est ) ne vulnus concidat,atq; ita cartilago dissideat,fistula concaua paranda est, quæ introducatur, & qua parte vulnus cōtingat, illinatur pharmaco : altera verò nasi pars, quæ foras vertitur, quâque pinnae eminent,emplastico medicamento compingetur.Aurium caua argilla impleri debet. Argilla priùs cochleæ salina, & acidi punici liquore subigatur. Alioqui 3.2.aloës ex-

*Cochleæ.*

cipiuntur fabrili glutine soluto ex aceto. Aliud. Tra-  
 gacanthę ʒ. i. in aqua Rhois maceratur, mucago  
 elicatur, in qua excipiantur myrrh. aloës, sanguinis  
 draconis ana ʒ. i. omnia pauca terebinthina colli-  
 gantur: adhibentur in pellicula, vel linteolo. Atque  
 hæc tandiu inherere oportet, dum coalescat carti-  
 lago, nisi prius excidat, Quæ sequuntur, iusta ratio- *Viride Bo.*  
 ne probata sunt posterioribus chirurgis. Plātaginis, *nantis.*  
 vtriusque cōsolideę, betonicę, verbenę, pimpinellę,  
 pilosellę millefolij, linguę canis, caudę equinę ana  
 M. i. conquassata coque cum lb. 3. sepi arietini: cola-  
 tis adde resinę, cerę, galbani ana quartaria 3. sacco-  
 collę quartariū vnum, terebinthinę quartarium i.  
 & semiss. liquata omnia & ad ignem circumducta,  
 ex arte misceantur. Aliud. ℥. Centaurij minoris *E centaurio.*  
 manip. 6. macerentur noctē integram in vino albo,  
 postridie in eodem vino ad dimidias coquito, cola-  
 tum succum recoquito, dum sit mellis crassitudo:  
 postremò reponito. In vsu, accipe succi ʒ. 3. terebint.  
 lb. i. cerę nouę quartarium i. lactis muliebris ʒ. 2.  
 Optimum hoc medicamentum & amicum neruis:  
 cruenta glutinat, dura emollit, fluxiones inhibet,  
 arcet putredines, detergit sordes, à fera morsis auxi-  
 liatur, atque omnino dignum laude est. Centaurij *Centauris*  
 succus leniter astringit, siccatur, tergit citra morsum: *succus.*  
 ex quo miscetur medicamentis, quæ fistulas, sinus,  
 rheumatica vlcera coniungant, & cicatrice claudat,  
 quæque veteres duritias emolliant. Planta admo-  
 dū parabilis est, maximè laudata veteribus, de qua  
 libellus etiā Galeno attributus est Eius radix inuti-  
 lis est. Herba cum floribus postremò Vere colligē-  
 da, & vt prius, exuccanda, reponendus in multos

vsus succus est. Eadē siccatur vmbra, vt in tempore trita in puluerem, putridis, sordidis, cācrosis, & aliis vitiis inspergatur. Eodem modo Marrubium, Scordium, Apium, & aliæ plantæ plurimæ, chirurgo veluti opes quædam, suo tempore comparandæ sunt. In medicamento de quo agitur, glutinādi vis aucta est adiecto vino. Similiter & aliis emplasticis, mastiche, thure, gummi Arabico, quæ cū leniter astringant, molliant, reprimant, in communē vsū medicamenti conspirāt. Aliud Dini. ℞. betonica, centaurij ana manipul. 2. coque, & cola, vt prius: excolato succo adde resinæ quartarium 1. terebinth. lb. β. sarcocollæ ℥. 1. ceræ ℥. 2. liquefiant omnia ac leniter bulliant: acetum paulatim affundatur: vbi refrixerint omnia, è muliebri lacte manibus cōuoluātur. Pares vires habet cum priore, benignum est, vt neruis possit conuenire. Centaurium, betonica, resina, neruis punctis amica sunt: sarcocolla mitissimum est colleticon: aceto fit, vt altius permeet, & melius attrahat: lacte muliebri mollius pharmacū est, nec ita cohibetur eius tenuitas. Al. Ceræ albæ, resinæ ana quartarum 1. olei ℥. 2. terebinthinæ ℥. 1. thuris, mastiches ana vnc. dimid. adde pimpinellæ, melangianæ, aut loco eius, telephij, maioris semperuiui, vel attractylidis, verbenę vermicularis, aut potius semperuiui minoris ana manipul. 1. coquantur vino vt prius, dum duæ vini partes euanuerint: & hæc omnia percolētur, exprimanturque, atque iterum coquantur ad crassitudinem: tum adde resinæ lib. 1. cerę albę lib. semiss. mastiches ℥. 2. refrigerētur vt prius, & lacte muliebri subigantur: leue colleticon est. Viride ex herbis fortius est, & iam malignū quid

*Dini.*

*Viride ex  
herbū.*

quid præ se ferentibus conuenit, quod ex cap. de purgantibus repetendum est. Vnguentum gloriæ. Olei bedegaris lib. i. ceræ quartariū i. feminis albarum rosarum semuncia. Oleum bedegaris non ita parabile, quia quid sit Barbarorū bedegar parum constat. Vteris autem vel spongiolis illis, quæ in canino rubo colliguntur, vel cymis attractylidis. Alioqui tenerioribus cacuminibus aculeatę plantę, quę ab herbariis Bedegar appellatur: vel eadem ē carduo sylvestri, ( quam cardonettam vocant ) detruncabis. Incoques autem horum quoduis oleo & vino nigro: dum vinum exhalauerit, materiam vehementer exprimes. Semen rosarum est, quod detractis foliis & apicibus luteis excusso capite decidit. E vermibus, neruosis partibus glutinandis, vtriūsq; symphyti, cynoglossi, pilosellæ, vtriūsq; plantaginis ana manip. i. vermium terrenorum lib. semiss. conquassata omnia septem dies in ol. sesquilibra madent, deinde leniter cocta in suum oleum exprimuntur: expresso succo & oleo, misce sepi arietini purgati libr. i. picis naualis libr. semiss. picis Græcæ quartarium i. galbani, opopanax, terebint. ana vnc. i. thuris mastiches ana semunc. alia liquantur: galbanum, opopanax, thus, mastiche aceto macerantur: ex quo soluta aliis permiscuntur, & ex omnibus efficitur corpus. Lumbrici terræ triti & per se impositi, neruos glutinant. Aureum. Ceræ citrinæ lib. β. olei boni lb. 2. & β. terebinth. ℥. 2. resinæ & Colophoniz ana sesquunc. olibani, mastiches ana ℥. i. croci ℥. i. cera cum oleo liquatur, deinde resina, Colophonia, terebinthina confunduntur: sublatis igne, thus & mastiche insperguntur;

*Bedegar.**Semen rosarum.**E vermibus.**Lumbrici terræ.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

postremò resperfo croco omninò intinguntur. His ergò pharmacis vtendum erit, vbi cruorem & fordes exterferis, vbi curaueris ne quid intersit vlcerum labris: vbi denique neque dolor, neque phlegmone, neque alius casus est, vnde glutinatio prohibeatur. Digitis, acu, fistulis, deligatione, diuisa labra coniungenda sunt, arida resperguntur, illinuntur liquida, crassa, viscidâque: vt in magnis vulneribus neque fatis eò hærentibus impinguntur, superdatur stuppa è vino nigro pressa, ex eodem splenia, fascias, subligacula madere vtile est: quanquam & aceto imbui possint: colliganda omnia eo deligationis genere, quod contineat, reformet, cogat, quantum videlicet casus expostulat. Puluis ruber oui cãdido, postea quoque terebinthina excipitur, atque imponitur. Quoties commutatur medicamentum austerio vino fouetur vulnus. Rariùs autem commutari debet, quarto primùm die, deinde sexto. Lintea eodem vino inculcata super imponuntur: atque hæc donec coalescat vulnus. A quo si quæ macula relinquitur, detergente materia exteri oportet.



IACOB I HOLLERII  
STEMPANI, MEDICI PA-  
RISIENSIS CELEBERRIMI  
de Materia Chirurgica

LIBER III.

*De utili materia in vitiis ossium. C A P. I.*

**A**M explicanda nobis ea pars reme-  
diorum, quæ ad ossa pertinet. Vitiis  
ergo quæ ossa fecerint, eodem ferè *Quæ negle-*  
momento succurrere oportet. Alioqui *Etis ossibus*  
phlegmone succenditur: quæ saniem *superveniât.*  
facit, agit cuniculos, vlcera dispergit alta, exesa, &  
curanda motis, ἐμμότῃς inde vocat Hippocrates.  
Ex quo denigrantur ossa, cariem inducunt, sydera-  
tione corrumpuntur. Aliis femur claudicat, manca  
manus est, ad solitos flexus torpet articulus, vel is  
extortus est. Huic convulsis nervis, distorto corpo-  
re, crudeli morte vita extinguatur. Ille gangræna  
& putredine contabescit, extinctoque sensu paula-  
tim conficitur. Itaque in tam lubrica medendi par-  
te omnem consilij rationem moueamus, maturri-  
mè occurramus, vt nihil naturæ pereat, nulla ci-  
catrix, nulla vestigia mali, aut honesta certè, relin-  
quantur.

# INSTIT. CHIRVURGIC.

*Labores  
ossium.*

Laborant ergo (vbi accessit iniuria) corrupta, fracta, collisa, fissa, forata ossa & mora articulis. Ad que vitia alia quoque suboriri solent. Accessio mali est, si cum vulnere læsa sunt, multò magis in articulis, vbi nervi, tendines, ligamenta, nuda carne & ossea loca sunt, in quæ laxa ac cōmota & iam nouo casu imbecilla, excrementa corporis facilè decurrunt.

*Quæ multa  
auxilia in-  
uēta ossibus.*

Adde quòd ibi cartilago est, in qua cicatrix formari nequit. Hic ergo asperior casus est, dolor, vigilia, febres, deliria, conuulsio & mortes sæpenumèrò commonentur: & vt articulus maior est, ita periculum grauius creare solet. Verùm non alia chirurgiæ parte ditior suppellex veteris disciplinæ, nusquā hæc curiosa magis, quàm in ossium medelis. Infinita propè reperit, & literis tradidit: quædam etiam autoritate Principum ære publico in ciuitatibus extruxit, quæ ad hanc curam ossium pertinerent: ferramenta varia, excisorios cultros, scalpra rasoria, limas, specilla, aliquot terebrarum genera, modiolos, forfices, forcipes, *μυρτίνη φούλακας*, volfellas, scalas, scamna, contos, repagula, vectes, glossocomia, canales, sphæria, stathmia, trochiscos, pennas, inceratos canaliculos, fistulas, seras, fila, bysso & auro texta, alia quoque plurima, quæ ad purganda, tendenda, reformanda, tentanda, constituenda denique ossa facerent. Et in vna deligandi cura quamplurima vsu diuersa suis etiam nominibus veteres distinxerunt, linteola, fascias, hypodesmides, splenia, apodesmos, regulas, ferulas, spatulas, habenas, laqueos, mitellas, puluinos modò scroteos, modò molliusculos: nodos, acus, acias, & alia sexcenta, quorum multa retenta sunt: alia antiquata,

*Deligatio-  
nis materia.*

quædam deferta partim ignorantia, partim negli-  
gētia. Adde quòd multis in rebus facilior, nec tam  
operosa curandi via inuenta est. Atque hîc quoq;  
peculiare nomen habuit deligandi forma, & χα-  
ταγματική vocata est: quanquam non in omni  
querela ossis ea necessaria est, sed aliquando in or-  
bem, aliquâdo in asciam ducta, nonnunquam etiâ  
sine deligationib. id genus splenia vsurpâtur: quo-  
rum omnium ratio ex libris primum Hippocratis  
de officina medici, de fracturis & articulis, deinde  
commentariis Galeni petenda est. Corruptum os  
pingue est, nigrum, molle, cariosum, quod superna-  
tis grauibus vlceribus aut fistulis, hîsque vel longa  
vetustate, vel putredine occupatis, euenit. Nudatur  
os cui vitiû accessit, vlcere exciso, subsecta carne, si  
latius serpit ossis iniuria, quàm vlcus fuit. Abscessus  
ossium priusquâ corruptelâ trahant, partim melo-  
tide, partim è sanie cognosci possunt. Hinc enim  
fordes vberior, & vi maiore, quâ pro vlcere, scatur-  
rit, eâq; tenuior est, non crassa, vt à carne: non gluti-  
nosa, qualis est à neruis: neq; vnguinea, vt ab adipe  
diffluit. Adhæc in abscessu ossis oræ vlceris dissidēt  
magis, agrè coalescunt, & interiore quodam motu  
vitiû significatur. Saniosis ossibus medicamēta cō-  
ueniunt quæ plurimùm siccant, quorû materia ex  
capite de purgantibus pharmacis petenda est. Quæ  
in superficie extat caries, ea sola radula eximi potest,  
sed ab igne tutius remediû est. Corruptû os ad viuâ  
scobem eliminandum, exterebrandum, inurendum,  
excidendû, peramputandum quoq; totum est, vbi  
desperatur malum. Miserum quidē, sed vnicû præsi-  
diû, & instâti exitio præferendum. Vbi ergò vlcere

*Deligatio.**Corruptela  
ossis.**Remedia  
corrupti  
ossis.**Abscessus  
ossis.**Medicamē-  
ta in sanio-  
sis ossibus.**Corruptû os.*



cōciso vel amputata carne os vndique nudatum est, quod videatur pingue, nigrum, aut cariosum, semel iterumve inurendum ferro, aut scalpro deradendū, donec iam aliquid cruoris ostendatur, quæ integritatis nota est. Qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, vt & agat aliquid, & maturius desinat. Finis est, quum in nigrítie ad os album : in carie ad solidum ventum est. Neque alia facienda sunt, cum in summo ossè iniuria est. Sed hæc vitia aliquando secedunt oleo feruente, aquis quas fortes vocāt, & mollioribus cauteriis, de quibus capite de pyrotic. Nonnunquam etiam matura putredine, modò per se, modò leni tractu decidunt. Quòd si malum altiùs descēdit, caries quidem specillo tenui explorari debet, quod vt cedenti ossi altiùs infigitur, ita longiùs caries procedit. Nigrities colligi potest ex dolore & febre. Quæ vbi mediocria sunt, illa altè descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra. Nam finis vitij est, vbi scobes nigra esse desit. In maiori carie, maior asperitas & inæqualitas ferro deprehenditur, & hoc quidem minus firmiter inhæret, & cito elabitur loco, cui impressum est. Igitur caries tota sapiùs versata terebra excalpenda est : ex quo candente ferro foramina perpurganda, vt iam nullo affluente vitio, lacuna carne repleatur. At os quod vel nigrities totum peruasit, vel excedit caries, excidere oportet. Exciduntur ossa ferè in capite, pectore, & mēbris: eaque modo scalpris, modo terebris & modiolis, quorum omniū ratio à Galeno, Celso & aliis tradita est. Syderatū membrū non tam crudeli, quàm miserabili auxilio semel peramputandum est: in quo quicquid

*Rasura ossis.*

*De excidentibus ossibus.*

*De amputatione membri.*

corporis emortuum est, lacerandum scalpro, & nouacula excidendum est. Siquid autem viuæ carnis, nerui, venæ, arteriæ superest, nec vrget casus, qua parte corruptela desinit, vincula arctissimè cōstringenda, vt ea omnia defecta alimēto celeritè exolecant. Quod quum euenit, ea corpora ferro, vt priùs, *Vnde mors amputatis membris.* & nouacula excanda sunt. Hæc autē, quia non placuit Hippocrati corpus etiamdū viuens ferramētis irritari, ne inde commotus dolor, hæmorrhagia & animi deliquia (quod ferè fit) ægrum è vita tollant. Alij maiora vasa & nervos priùs designant, medias *Alia ratio.* carnes interfecant, & illa ipsa ad sanam partem filo illaqueant, vt intabescant mora, & sponte sua decidunt. Qua etiā arte, hæmorrhagias & conuulsiones magis declinēt. Iam verò legitima serra sit, & bene comparata, quæ quàm celerrimè trāscurrat. Linteū interponi potest vino vel aceto madens, qua parte cōmota serra viuentem carnem affricat, ne scilicet exasperetur caro, & profluuiū sanguinis moueatur. Præfecto ossè reliquæ partes contra hæmorrhagias cauterio inuruntur. At si viuente ossè circumducta caro emortua est, priusquàm malum in os transeat, excindenda illa est, & iniectis vinculis, omnis aditus, quo sanguis ad os decurrat, intercipiendus est: imperāda vitæ parsimonia, & ea alimenta quæ facilè diffluent, nihilque succi crassi lentique gignant, vt os ipsum cum suis vinculis paulatim emarcescat, ac tandem excidat. Ad celeritatē operis vbi vtrūque licet, maluit Hippocrates in articulis quàm medio membro ossa rescindi. Reliquis iniuriis ossium ferè *Vlcera con-iuncta vitiis ossium.* accedit vlcus: idem astrictioribus linteis & ferulis aliquando cōtrahitur. Sed hoc genus vlceris lenio-

# INSTIT. CHIRVRGIC.

ribus pharmacis : illud autem aliorum vlcere le-  
gibus curari debet. At non antè vias claudere oportet, quæ per vlcus ad ossa pertinent, quàm hæc sedulò explorata, & omni carie, sorde, nigredine purgata sint. Quin & præclusum iter patefacere oportet, & angustias ferro ampliare: deinde spōgia molli aut penicillis implendum cauum, vt ne cōeat, sed dehiscat vlcus, dum vel integendum carne, vel ferruminandū callo bene purū os videatur. In altis cuniculis spongia, linamenta, penicilli summa parte religantur filo, quod foras propendeat, vt in tempore facilè reducantur. Vt autem quæ succrescit caro toti suo ossi coalescat, purū os esse & siccum necesse est, inspergendūq; medicamentis, iride, māna, aloë, myrrha, arido thure, aristolochia, & eo genere cephalicorū, quod capite de Sarcoticis descriptum est. Sed quæ continetur ossibus caro generatur, vt paulò siccior futura est, ita magis siccantibus gaudet, quo genere etiam deterfa, rasa, exterebrata ossa conspergi debent. Vt verò ducēda carne ab ossibus recedis, ita vis siccantium temperanda est, donec iam cicatrix trahenda sit. Ac carne replere ossa, & fissa iungere sæpenuerò opus est, vbi callū genere non licet, nimium dissidentibus fracturæ labris, & vbi in maiore circulum vel os ipsum maius excisum est, verū multò stabilius vinculū callus est.

In fracturis cum vlcere, si quidem transuersum hoc est, idēque magnū, ferulis abstinendum : in recto vlcere ferulæ ad latera cōmitti possunt. In vtrōque maior copia fasciarum adhibenda, quia declinanda astrictio, confirmāda tamen deligatio est: quod vel astrictio vel copia linteorum efficit. Linteorū mul-

*Regeneratio  
carnis in vi-  
tis ossium.*

*In fracturis  
cum vlcere  
ratio ferula-  
rum & lin-  
teorum.*

titudo astrictioribus fasciis præferri debet, ubi molle corpus & cū fractura vlcus est. Astrictior deligatio & vi maiore confixæ ferulæ sæpenumerò syderant partes, atque exulcerant. In tumore, vlcere, inflammatione & dolore ferulis & omni astrictione interdiciendum. Ferulas Hippocrates septimo primū die, sublato metu inflammationis, adhibet. Non stri statim initio. Albucasis in leui malo primo die, in grauiore vitio quinto vel septimo. Solutis ergo linteis & refixis ferulis, si quid cōputruit, excindendum ferro, priusquā ad implendā carnem veniatur. Vidēdum quoque priusquā impleas, ut omnis diuisio ossis tutò cohæreat. At si qua squama aut fragmentū excesserit, ea suo ossi sedulò coaptanda sunt: aut si acumine carnem subintran, molliter præcidere oportet, etiā diuisa carne & excisa, si res exigit: verū in columis fragmenti radix, quā ossi suo etiā dum hæret, seruanda est. Alioqui scalpello vel ferrula leniter eliminanda, aut volsella prehensanda est. Quòd si nihil molestiæ squamæ adferunt, neque possunt suis ossibus reconciliari, vel medicamentis detrahes, vel ita fines, donec maturitate quadam per se decidant. Sic enim celeriter cogetur callosus, & caro ossibus concrescet. Quæ verò squamæ rapiuntur ferro, necdum maturè violētia reuelluntur, fistulas ægrè sanabiles relinquunt. Hic ergo declinanda vis est. Squamas detrahunt medicamenta in cephalicis descripta, capite de Sarcoticis, erucæ radix, vtriūsq; bryoniæ, cucumeris agrestis. Aristolochia peculiariter elicit testulas caluariæ. At quæ deruenda ossa sunt, medicamentis siccari conueniunt, ratione vitæ simili: cauterio, radula quoque atteri,

*Syderate  
partes ni-  
mia astricti-  
one.*

*Squama.*

*De detrahē-  
du squamis.*

*Medicamē-  
ta.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

volsella molliter agitari, perforari terebra, vt maturius, vel sponte sua, vel leni cōmotione excidant. In fractis ossibus & loco motis multarum rerum cura est, ac circa initia omninò prohibēda fluxio, dolor,

*In fractis & luxatis multa cura.* inflammatio. Os ergo quod vel abiit articulo, vel fractum dissidet, primùm quidem reformare atque constituere oportet: deinde ita cōtinere, vt ne recidat: postremò cōfirmandum callo, carne, resiccatis humoribus, qui colligantia vincula relaxent. Primùm tamen incunda ratio, an reponi possint: deinde an sine periculo reponātur: postremò qua arte conuenienter & celeriter, minimo dolore ac molestia reducātur.

*Desperata.*

Concisis articulorum vinculis, dissectis cartilaginibus desperatio est: tūmq̃ bene agitur cum ægro, si solū claudicat, si manco mēbro, si deformato & obtorto articulo superesse datū est.

*Non statim reponenda ossa.*

Non reponendū (inquit Hippocrates) tibiæ os qua parte suo vtrīnque articulo copulatur, si quidem rescissa cute per vulnus prominet: alioqui conuulsio, phlegmone, gangræna, syderatio cōmouentur, quæ ægrum breui momento è vita tollant. Quæ vt declines, quàm vt os reponas, potiùs cogitādum. Reformanda luxatio primo die, vel certè altero. Nam tertio & quarto quiescere oportet, quo ferè tēpore nouæ iniuriæ sese proferunt: hinc ad decimū tutior reponendi occasio est. Quòd si restituto ossē cōuulsio incidet, rursus articulum excludes, calida liberaliter irrigabis, fouebis oleo, & molli lana conteges. In luxatis & fractis ossibus hæc sunt præcipuè, τάσις, vel si mauis, ἀντίτασις, διάπλασις, ἐπίδεσις, ὑπόθεσις, vel ὑποθεσις. Extēditur mēbrū manibus prehensum, vel iniectis laqueis, vbi vi maiore opus

*Quando reformanda luxatio. Contra conuulsiones.*

est, ut diductis & adductis marginibus soluti ossis, oræ oris molliter consuecant, nihil exasperetur, nihil diffringatur, quod in fracturis dēticularibus, scabris & ferratis sæpè contingit. Videndū quoque ne in distentatione nervus, vena, arteria, musculus, tendo, ligamentū, atque inde os & membrum contra naturam extorqueantur. Sed in luxatis, cōpages articuli & ossium copulatio prius recognoscenda est, *Cognoscenda in luxatis.* quàm multis, longis, prominulis & obstipis capitibus constet: quot, qui sinus & acetabula, quàm alta hæc, quomodo inflexis alueis declinibus, lubricis, quibus scilicet capita illa & exerta ossium tubercula inferantur: quæ superciliarū forma: qua fide ceruices ossiū cōtineantur, quibus vinculis iunctura articuletur: quæ cartilagine intercedant, qui tendines, muscoli & nervi ad constantiā articuli concurrant: in summa, qua omnino ratione flectant, tendant, diuertāt, atque vno verbo, copulentur. Vertebrae duplici capite prominent, duplici quoque acetabulo *Exemplum in vertebra.* sinuantur: altera alterius acetabulis sua capita inferit, eadēque paria faciēs, & quasi relata gratia suos alueolos explicat, in quib. vicinæ vertebrae processus reponantur: mucosis vinculis utræque coniungantur, quæ soluta, cæsa, arefacta, distracta morbo, vertebrae exarticulāt. Quas iam cognoscas ægrè reformari, quia scilicet intelligas quàm multis cardinib., quaque societate coeāt, quā denique vario implexu conferantur. Itaque omnis articulata iunctura sæpius oculis ipsis vsurpada, sicq; animo & mēte concipiēda est, ut ad viuum pressæ articularū formæ cū res exigat, oculis ipsis, ut ita dicā, obuerfentur. Sic enim explicatur opificiū naturæ, quod in fractis & luxatis

sedulò persequamur. Atque omnino qui extendit, componit, ligat, continet, hoc efficiat, vt iusta naturæ teneatur *κατάσεις*. Sic enim Hippocrates, quod naturali figura membri & partis Galenus definit. Extensum membrum loco redditum manibus tractari, palpari, & legitimè conformari debet *διάπλασιν* appellant. Quòd si neque sic constitutum est, ad *μοχλίαν*, lorum, habenas, & vsitatas machinas veniendum. Quæ omnia ex libris Hipp. & commentariis Galeni petenda sunt. Sequitur *ἐπίδεσις*, quam *καταγματικὴ* appellant, in qua multorum prouidentia est: sed maximè vt contineas, phlegmonem arceas, & procures callum. Ac primùm an sit deligandum, statuere oportet: tum qua deligandi forma: ac ferè à duobus principiis, varia tamè ratione. Ex quo decernendum quibus, quàm multis, longis, latis, quàm denique firmis fasciis opus sit. In splenis eadem versetur cura: idonea forma linteis quaerenda est. Cognoscendum prætereà vnde primum ineas, quæ sit futura progressio, quàm multi & quales circuli, quo modo distinguantur orbes, qui conueniant anguli, quibus interuallis, vbi & quando laxior vel astrictior deligatio, qua parte desinat, quo loco & qua arte nectantur nodi, aciæ ducantur, complicantur habenæ, quando regulæ, ferulæ, puluinaria, mitellæ, adhibenda sint, quandiu continere omnia, & quando soluere oporteat. Atque in sano membro probanda priùs deligatio, quàm in ægro periculum facias. Postremò in ea figura collocandum membrum, in qua diutissimè constare possit, & minimè doleat. Iustos hæc commentarios desiderant, & hæc non tam docendi, quàm monen-

di causa dicta fuerint. Neque ignorandum vnum os parum extendendum esse teiebra, minúsque inurendum : semel enim vstum ægerrimè tum callo, tum carni, reconciliatur. Ac nec minima cura esse debet, vt ne diutiùs os apertum expositumque aëri maneat. Grauis enim ea consuetudo noua est, quia sic calor insitus aërem expirat. Sunto igitur tecta, & quàm minimùm licet nudata ossa. Sic enim conclusus calor, & non exhalans, faniem foras dispergit, atque ita purgata ossa celerius coniungit. Extorta valgo- *In variis & valgi deli-*  
rum crura pertractis intrò vinculis & astrictis asser- *gatio.*  
culis ita componenda, non quasi dirigas, sed non a-  
liter quàm si è valgo varum transformare velis. In-  
flexis varorum cruribus aptanda omnia & colligā-  
da sunt, quasi è vare valgum efficias. In abscessu *Abscessus*  
paruo ossium deligatio κατὰ μάλιστα locum ha- *ossium.*  
bet, sed paulò laxior & sine ferulis. In magno non  
est deligandum κατὰ μάλιστα. Satis faciunt sple-  
nia vino insuccata nigro, subaustero, quæ deinceps  
atque conuenienter hinc inde adhibenda sunt, non  
vt hoc illi insideat. Longiora sunt, quàm quæ so-  
lum ambitum membri comprehendant. Nam si *Ratio sple-*  
quadrantalibus circulis est partis, paulò longiores sple- *niorum.*  
nes trientalibus esse oportet. Obliquè inferuntur  
membro & aduersa parte decussant. Atque hæc qui-  
dem spleniorum ratio alia quum os abscedit, & fan-  
iosum est, alia eorū quæ in deligationibus fascias  
confirmant. Hic enim æqualiter affinguntur mem-  
bro, ne alterum extremum alteri insideat, aut redup-  
plicet, quum videlicet longiùs spleniū est: néue bre-  
uius atque decurratum inane spaciū, & quasi fos-  
sulam relinquat. Ab vtrisque spleniis tum quæ lon-



# INSTIT. CHIRVURGIC.

*In iugulo & costis.*

giora, tum quæ breuiora sunt, inæqualis, aspera, & inconcinna fit deligatio, in qua æqualitas vel maximè querenda est. Alia rursus illa ratio est à plagulis, quæ fracto iugulo & costis adhibentur, quarum prima atque altera in decussim collocantur, & se intersectant: tertia porrigitur in longum, obstipat fracta, & reliqua splenia confirmat. Aliter quoque ut sunt vitia & partes commutantur. Sed hæc peculiarem commentarium requirunt. In fasciis remedia adhibentur, quæ madorem linteorum contineant. Sic enim prohibetur dolor atque inflammatio. Fasciæ initio plures & astrictiores, si neque dolor, neque phlegmone, non vulnus, aut aliquid tale prohibeat. Ac ferè inebriantur vino crasso, nigro, modicè austero. Vinum hoc superficiè cogit, vim suam ad repellendum altius imprimit: ex quo præcidit inflammationum causas. Quod nimium adstringit, dolorem facit, tenue, album, giliuum, fuluum, etiam si contrahat, repudiandum tamen est ut totum reprimetium genus, quod aqueo humore solutum est, papauer, mandragora, cicuta, multò magis si in articulis & nervosis partibus labor est: quia non sola qualitas, sed & horum corpus intrò penetrat, & nervosa lædit. Hinc etiam calor qui vitam fouet, interdum extinguitur. Vino igitur crasso, nigro, modicè austero, fasciæ & splenia saturentur. Minister adsit, qui subinde affuso vino lintea perfundat: alioqui cum periculo resiccantur: quod ne fiat, noctu præcipuè & æstate providendum. Hyeme vini loco ænelæo uti satius est, quo etiam tempore prius intepuisse iuvat: & succidæ lanæ spleniis præferuntur. In fracturis & luxationibus ubi exertum os est

*Vini ratio.*

*Lintea madere opus est.*

& vlcus facit, quóque cum periculo reponatur, *Quando lana succida pro fasciis utendum.*  
 quandiu conuulsio in metu est, abstinendum fasciis,  
 & succida lana utendum est. Eaque, ut prius, im-  
 buenda vino, curandumque est ut assidue irrigetur,  
 & non squalescat. Astringit leniter lana hæc, & te-  
 pido calore fouet. In his fumoso vino & nimis  
 odoro ideo abstinendum, quòd caput feriat.

Atque hæc omnia decreta sunt veteris discipli-  
 næ, quæ Galeno probata sunt. Iustū quoque in suc- *Alia quibus fasciæ im-  
 buuntur.*  
 candis linteis medicamentū ad dolores & inflam-  
 mationes, oui candidum è rosaceo vel myrtino fra- *Ceratum album.*  
 ctum. Alij contra eadem vitia aceto, oxelæo fascias  
 imbuunt, detur id benè carnosâ parte & sine vlce-  
 re. Quòd si suspecta est ministri cura, qui negligenti-  
 us fascias repergat, & nouo madore cõpluat, vnde  
 lintea exarescant, cerato albo utendum erit. Adde  
 quòd cura illa odiosa esse potest. Verum ceratum  
 hoc ut repellat, & phlegmonem inhibeat, vno mi-  
 nus est efficax, & magis vsurpandum post initia, iam  
 abeunte periculo inflammationis, vbi fractura sim-  
 plex, nec in fragmenta varia contritum os est. Igi-  
 tur cerato pars ægra, fasciæ & splenia illinantur, ad-  
 hæc extremæ partes, sed manus præcipuè & pedes,  
 ne quod deligatione extringitur, infirmum scilicet  
 frigidumque membrum concipiat, ex quo putre-  
 dine tandem corrumpatur. Ceratū hoc *Compositio  
 cerati albi.*  
 κατωγμα-  
 πικόν υσβρόν & λευκόν veteres appellarunt. E cera  
 pingui & duplo oleo conficitur. Oleum sit re-  
 cens rhodinum vel myrteum. Quòd si cera vetus  
 fuerit, nec ita mollis, paulò plus olei miscendum  
 erit. Picato quoque veteres vsi sunt, si quid contu-  
 sum esset, si quid coquendum atque mitigandum,

# INSTIT. CHIRVURGIC.

*Picatum ceratum.* *πικωτηρὰν κηρωτήν & πικωόκηρον* appellant. Eoque magis vsurpandum, quia contusa omnia & cruda, quæ ossibus incumbunt, quàm celerrimè saniem fecisse iuuat, ne subiecta ossa tempore corrumpantur. Atque hoc præcipuè in caluaria, deinde reliqua ossium natura, magis etiam qua parte subsunt nervacea corpora, procurandum erit. Liquido cerato albo pix addita picatum facit. Ac tantum picis misceatur, vt inde color in nigrum transeat: verùm cerati corpus non immutetur. A pice molli vtrúnque præstari potest: hæc enim media compage inter oleum & ceram ambigit. Quæ cera durior, vel huic pariter dura est. Mollienda manus itaque oleo inquinatur, atque hinc ad ignem pix illa pinsitur, voluitur, contrectatur, dum satis emollescat. Alioqui ceræ & pici oleum non duplum, sed ferè triplum misceatur, vt picatum inde coëat, quod tam liquidum sit, quàm ceratum album esse opus est. Sed in contusis liquidius conuenit, vbi mitigandum. Ad coquendum iustiore corpore compingi debet. Eadem seruandæ leges hac parte, in eo quod *ρήνωόκηρον* appellant, resina ceræ mista. Ac resina liquida, qualis est larigna quædam & terebinthina, ceratum nimis diluit, nisi admodum exigua misceatur. Resina compage ceræ seruabit cerati corpus. Dilutum est ex ceræ  $\zeta$ . 1. terebinthinæ liquidæ  $\zeta$ . 3. olei  $\zeta$ . 2. Solutum quidem & molle est, non dilutum nimis, ex ceræ  $\zeta$ . 2. Colophonix  $\zeta$ . 1. olei  $\zeta$ . 4. Corpulentum satis vbi ceræ & resinæ vtriúsq;  $\zeta$ . 2. olei  $\zeta$ . 4. permiscetur. Sed de cerato, quod resinam capit, plura capite de suppurantibus. Verùm in luxationibus hoc cerato præcipuè vtendum, quia scilicet articolata

*Viscerati re.  
sinati in lu-  
xationibus.*

articulata ossa magis cōtinet, & hinc lintea firmiùs affiguntur, hærent diutiùs, vincula vero humore laxa & vieta melius exiccantur. Fracta deniq; firmiùs cohærent, & callo suo fideliùs compinguntur. At quæ sine lentore linteis capiuntur, quale austerū vinum est, antè resiccātur, quàm solvere oporteat. Ac tertio primū die ferè absoluimus. Sicca autem lintea duritie & asperitate lædunt, elaxatāque minùs continent. Hæc ergò ratio magis ineunda, si quando periculum grauius metuitur, atq; ideo cura maior desyderatur. In his vitiis ossium magnus *διὰ χαλκίτεως* vsus est. In metu inflammationis mollitur subduplo rosaceo, deinde austero vino imbuitur, illinitur parti, & in linteis adhibetur. Ex *Contra in-* aceto vini loco subigi potest, si neque vulnus, neq; *flammationes.* neruacea natura, neque aliud quicquam prohibet. Contra œdemata & inflationes, quæ astrictione *Contra œdē-* linteorum extuberant, idem medicamentū auxilio *mata.* est. Omnia verò leuia sint & mollia: grauitas enim opprimit, & dolorem creat. Idem durities efficit & exasperat: vtrunque callum retardat. Perfusiones *Perfusiones.* fiunt ex aqua tepida, eo calore téperata, quem manus perferat: in frigoris hydrelæon melius est. Perfunditur pars tertio & quinto die, quoties videlicet lintea absoluuntur, idque liberaliter, vnde prurigo acquiescat, & materia eius in halitum dispergatur. In articulis tepidæ vsus est: tensa relaxat, dolorem mitigat, & inflammationi aduersatur. Iam septimo die tardiùs aliquando affunditur, non vt discutiat, sed euocet sanguinem: vnde cōcreto poro ossium fracturæ conserantur. Capitis fracturas neque vino, neque realia, nisi quàm minimū, made-

*Contra pri-*  
*uginē à de-*  
*ligatione.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

*Decoctum  
vلمي.*

facere iussit Hippocr. Dioscorides ex veterum usu corticem vلمي aqua incoquit, decocto fracturam fouet, & os perfundit quod iam egere callo videatur. Id de radice vلمي, nō cortice Galenus prodidit.

*Callus.*

Πώρωσι Græci vocant genituram calli, & inde πώρωσις, quæ callum gignant. Callus neque caro est, neque os, sed inter utrūque ambigit: itaq; deposito metu inflammationis, purgatis vitis, quæ curam tardent, omnino cogitandum vt coëat porus, & inde effractæ partes solidentur. Eaque cura septi-

*Quando gi-  
gnendus cal-  
lus.*

mo primū die ferè suscipitur æstate, decimo quarto hyeme: quo iam tempore id genus periculis perfuncta ossa videantur. Etenim intra ea spacia febres & phlegmonæ magna ex parte sese proferunt: quāquam aliquando latente vitio & maleficio trahente vicesimo die & post vicesimum, nec opinantibus nobis eueniunt. Neminem verò latere arbitror non antè de poro cogitandum, quàm contusa, in pus versa, deterfa vlcera & siccata, ossa quoque bene explorata fuerint. Hic ergo generatur callus, vbi moderanda perfusio, vt inde pars viuido colore floreat, & leniter attollatur: nimium est si subidet, & pallorem ducit. Fistulosa ossa & spongiosa, quæque plus humoris in se continēt, celerius coalescunt, & callum contrahunt: quod in iugulo & id genus ossibus comprobatur.

*Alimenta  
ad poron.*

Alimenta sunt quæ probum sanguinem, crassum, viscidum, multum gignant. Panis triticeus è farina primaria: triticum legatur graue, dësum, vnde ptisana comparetur: cartilagineæ animalium partes, neruaceæ, cutaceæ, pingues, ligamenta, tendines, tetioli, ventres, linguæ, rostra, capita hœdorū, veruecum, & procellorū, agni-

na caro & suilla, palmulæ pingues, castaneæ, vinum astringens, & cætera generis eiusdem. Medicamenta sunt emplastica, lenta, quæ modicè calfaciant, & siccent è gyri similia, manna, gummi, fabrili glutine, mastiche, tragacatha, pingui cera, lachrimis & succis generis eiusdem. Triticeam farinam probat Hippocrates, quæ subacta longiùs trahatur, digitorum sequax: hæc, ut reliqua, liquore oui, myrrino, aqua, vino, mucagine concorporatur, dum lentore quodam bene cohareat. Qualis si deficit, & aridior tantùm ad manum est, thus pingue, eiusque pollinem & fuliginem, liquidam resinã, mel quoque viscidum permiscebis. Sed alia quidem initio, resinã & mel post initia, cum iam excesserit periculum inflammationis. Thus quoque in limacum mucro & saliva: aloë & myrrha, mel etiam, si quidem resicandum magis, in eodem mucro diu volutantur, & in aluta impinguntur. Finge igitur aduersa parte effractum nasum, ut intro desideat. Eodem die aut nō multò post reformare oportet. Itaque quicquid in cartilaginem incidit, excitandum leniter est subiecto crassiore specillo, qua maximè parte delabitur quod fractum est, ut sublatum mollietur suo corpori decenter coalescat. Lene fit specillum non asperum, ad digitelli formam fabricatum è buxo vel ebore: digitis quoque; utitur Hippocrates, sed præfert indices, ut qui narium cauis magis conueniant. Ac suis quisque uti potest: alioqui magnitudine respondeant, sintque molles, quales pueri habent & mulieres. Atque hos diutius insistere oporteat, ut quæ reformatæ iam sunt, contineant. Alioqui in longitudinem implicata linamenta, & molli pellicula cincta cir-

*Medicamentum  
ta porotica.*

*Triticea farina.*

*Exemplum  
in naso fracto.*

*Specillum  
narium fractarum.*

cunfutaque intus adiicienda sunt. Aut eodem modo compositum aliquid est arido penicillo & fimbriis linteorum. Aut grandis pinna gummi vel fabrili glutine illita, & molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilaginem non sinat. Alioqui fistulas & tubos plumbo, argento, canna ad hanc rem comparare oportet. Fruſtulo pulmonis ovis aliquando uſus eſt Hippocrates, quod fortè aderat. Spongia non utendum putat, quia fortasse humore raptò exturgeat, diſſoluâtque iuncta. Abſtinendum quoque omnibus, quæ vel vehementer ſpirent, vel grauius oleant. Omnia verò memoratis medicamentis illinenda ſunt. Vinculis autem & habenis illis exaluta molli non ita opus eſt, etiamſi quod fractum eſt, in latus torqueatur: ſi modò repoſitum aliis artibus contineri poteſt, ut plagulis, quas viſcida illa pharmaca inquinēt, & iis ſimiliter comparatis, quæ intrò naribus inferuntur. Emplaſtra quæ pertinaciùs hærent, ſotu tepidæ reuelluntur. Atque hinc ad catagmatica, de quibus antea. Sed horum materia in præſentia locupletanda nobis. Caninum cerebrum in linteo adhibetur: ſuperdatur lana inculcata oui candido: iam ſqualeſcens commutari debet: quatuordecim diebus ſolidat. In Sardinia fontes eſſe calidos ſcribunt, qui fracta oſſa ſolident. Vinum picarium in lana ſuccida efficit, ut luxata celerius coëant. Purgatur hybiſci radix, atque hinc medulla raſa in ſplenio adalligatur. Poteſt adiici tritici farina, & cum liquore oui ita ſubigi, ut ſit cataplaſma. Radix illa aquam coagulat, in qua ſub diebus aliquot maduerit. Muſco viticis utuntur veterinaij: quernum alij, alij in vlmo lectum præfe-

*Caninum  
cerebrum.*

*Hybiſci  
radix.*

*Muſcum.*

runt. In honore est veteri exemplo quam conferuam vocant. Muscus est densus, herbaceus, spon- *Conferua.*  
 giosus, hærens aquatilibus petris, cuius efficax natura nobili historia consignata est, Putator quidam *Historia*  
 ex alta arbore deciderat omnibus ferè ossibus con-  
 fractis. Præsto aderant amici, qui corpus eius vni-  
 uersum eo musco obligarunt, atq; ita relatum do-  
 mum in quiete tenuerunt: subinde conspersa aqua  
 ex eo flumine, quod muscum alluebat, ne videlicet  
 muscus emarcesceret. Rarò nec nisi deficiente her-  
 ba remedium mutatum est. Atque hac medela in-  
 credibili celeritate conualuit. Æstate bene carnosò  
 duròque corpore, recenti malo exemplum vetus li-  
 ceat imitari. Vetus est & vulgo familiare auxilium  
 in iis, qui ex alto præcipites aliquid fregerunt, aut  
 contuderunt. Pellis ouila recens detracta corpori *Pellis ouilla.*  
 affigitur, quæ myrteo tepido vel rosáceo perfundi  
 potest. Sed eos præcipuè iuuat, quibus aliquid  
 cruoris in cutem diffusum est: concoquit enim ac  
 digerit. Poroticon est, farinæ triticeæ  $\text{℥.6.}$  sanguinis  
 draconis, mastiches, thuris, sarcocollæ ana  $\text{℥.i.}$  om-  
 nia oui candido iuncta in linteo vel aluta alligan-  
 tur. Triticea farina, gummi & manna incoquantur  
 aqua: fit cataplasma quod reprimit, continet, & po-  
 ron gignit. Atque hîc possunt è tragacantha, gum-  
 mi, sarcocolla & aliis id genus mucçagines colligi  
 ad cataplasmata: è pauca materia ferè, sed decu-  
 pla ad mucçaginem conficias. Iam verò celeberrim-  
 um, & medicinæ veteri decantatum remedium,  
 Isis appellatum: quod in nernorum vitiis describe- *Moschionis.*  
 tur. Laudatum quoque Moschionis catagmaticon:  
 in ferto callo vulnera coniungit, contusis testiculis



# INSTIT. CHIRVRGIC.

& aliis partibus medetur: hydropicos liberat. Exerta sedis tubercula reprimat, & rhagadas sanat dilutum butyro: gutturosis remedio est: omnem durtiem dissoluit: luxatis & contortis articulis prodest: clauos adimit, qui in pedibus & manibus sine vlcere excitantur, atque omnino multiplicis vsus est. Cuius mistura sic habet. Lithargyri, picis, seu vitulini ana vnc. viginti: terebinth. vnc. decem: mannae, thuris tantundem: cerae vnc. 5. æruginis vnc. 1. poppanacis vnc. 1. galbani tantundem: olei ricini, aceti, succi mori ana heminam vnam, picis liquidae heminae dimidium. Lithargyrus leuissimè teritur, & fictili vase vel æneo cum ricinino coquitur: vbi efferbuerint, adeps & manna iniiciuntur: assidue mouentur dum coeant & spissentur: hinc pix, cera resina admiscuntur. Iam non inquinantibus galbanum immittitur, deinde arugo & opopanax aceto resoluta. In alio vase mori succus & pix liquida ad crassitudinem cocta cæteris permiscuntur, coquuntur rursus ad puritatem: ex quo in vas aliud quod vinum habeat, deponuntur, atque ita permittuntur triduum: postremò ex eodem vino pista ad vsum reponuntur. Adhibetur pharmacum in linteis, & in aluta fractis ossibus intenditur. Alioqui è duplo rosaceo dissolutum non aliter quàm ceratum album fasciis illinitur & plagulis. Ægyptia Andromachi mollit, digerit, adstringit, vulnera cruenta iungit, & alia adiuuat: vomicas exugit, permagna vulnera ense facta etiam profundissima triduo glutinat, præcisos nervos & musculos committit: luxatis, fractis, contusis, attritis & contortis ossibus remedio est, & contra inflammationes valet:

*Ægyptia  
Andromachi.*

dolentes nervos & musculos lenit : ferarum mor-  
 bus adhibetur:lippientibus & cephalalgicis solatio  
 est impacta fronti : callos emollit, & scirrhus edo-  
 mat : ac breuiter optimum ad plurima remediū est.  
 Describitur à Græcis Galeno & Aëtio, vitiosis iam  
 & corruptis tum Græcis tum Latinis codicibus.  
 Nos ex Galeni sententia ita restituimus. ℥.ceræ,li-  
 tharg.ana denar.144.ammoniacy denar.72.terebin-  
 thinae ℥.4.& semiss.alia ℥.4.succidæ lanæ vstæ ℥.2.  
 & 3.2.aristolochia,thuris, squamarum æris, & sto-  
 matis ana ℥.1.myrrhæ 3.3.alia 3.4.opopanacy de-  
 nar.2.olei ricinini, sicyonij vel antiqui libr.4.&  
 semiss. Sic enim Galenus pro sex heminis olei An-  
 dromachi,Asclepiades autem heminas 3.scripsit.Li-  
 thargyrus oleo coquitur dum concreseat, squama  
 iniicitur: vbi non inquinant, cera conspersa mari,  
 vt voluit Asclepiades, deinde ammoniacum sedulo  
 contusum imponuntur: liquatis his terebinthina  
 additur: auferuntur igne: hinc thus & lanarum ci-  
 nis insperguntur:refrigerata manibus conuoluun-  
 tur,& vsui sunt. Nigrum catagmaticum Asclepia-  
 dis, quod qua optimum, ἀπιδίη vocata est, admi-  
 randa in fracturis,etiam ossibus depressis: immersa  
 hæc & ab aliis seiuncta callo copulat. Litharg. bi-  
 tuminis ana ℥.25.ceræ,picis aridæ ana ℥.12.& semiss.  
 resinæ piceæ, terebinth.ana ℥.6.& 3.2.aluminis,  
 propoleos ana denar.38. ammoniaci 3.3. æruginis  
 denar.10.& semiss.olei sextar.4.Lithargyrus in oleo  
 coquitur, dum non contaminet: cera & bitumen  
 seorsum liquefcunt, neque commouentur, his pix  
 fusa traiectaque colo coniungitur: omnia lithar-  
 gyro vniuntur. Ammoniacum verò bene contu-

ἀπιδίη Ascle-  
 piadis.

sum postea immittitur, atque ita coquantur omnia in solidum corpus: hinc præmollita cera & propolis permiscuntur: ubi probè coierint, subducuntur igne, tumque alumen & ærugo in pollinem trita resperguntur, versantur omnia, & oxycrato mersa subiguntur. Panalithes ad cõtusa, fracta etiam cum vulnere, vulnera neruorum & vertebrarum: purgat collectiones, incisum scrotum solidat, venenatos morsus bestiarum sanat, aliâque præstat plurima. Olei dulcis ℥.9. bituminis, ceræ, resinæ piceæ, picis aridæ ana ℔b. 1. lithargyr. cerusæ, æruginis ana denar. 10. thuris, ammoniaci, myrrhæ, aloës ana ℥.1. opij, succi pomorum mandragoræ ana denar. 6. aluminis, calchanthi, chalciteos, croci ana semunc. aceti quod sufficit. Quæ teri possunt omnia à lithargyro ad crocum in puluerem trita ex aceto cõducuntur in mortario, dum sit luti crassitudo. Oleũ, cera, bitumen in fabales pilulas diuisum nihil versando colliquantur, liquatis pix & resina commiscuntur, colantur omnia, atque reponuntur. Fracturis ossium caluariæ, cartilaginum, vtilissimum est Barbarum, quod capite de hæmorrhagia describitur, & alia, quæ superioribus libris scripta inuenies. In fracturis prima cura sit, vt initio repellas phlegmonem, & dolorẽ prohibeas. Tertio iam & quinto die si quid contusum erit, in pus & saniem conuerteres: suppurationem sedulò purgabis: siccabis vlcus, & si qua ossis vitia sunt, corruptela, caries, malè iuncta squama, ea omnia diligenter adimes: fracturæ partes ritè coaptabis, & callo iunges. At postremũ vlcus implendũ & cicatrice claudendũ est. Contingit aliquando in capitis nuda mēbrana, vt

*Panalithes.*

*Ordo cura.  
tionis in fra-  
cturis.*

minùs tergēdo siccandóq; quàm cōueniat, fungus succrescat, quia videlicet intumorē laxum & mollem membrana extuberat. Hīc ergo siccandum magis, & quæ tergeant, incidant, laxent, intermiscenda. Concreti calli signum est, quum iam sine vlcere exudante sanguine fasciæ intinguntur. Tum enim coactus porus asperginem sanguinis è spongiosis ossium cavernis foras extrahit. Id ferè fit criticis diebus 14. 17. 20. 21. & hinc succedentibus septenariis. Signum quidem à veteribus annoratum, quanquam aliquando sine eo calli concrescunt. Conueniens callus est, qui neque maior, neque minor, durior aut mollior quàm oportet, neque distortus est. Iustus callus confirmari debet medicamentis, quæ ἔναυμα vocant, quæque cruentis vulneribus adhibentur. Siccant leniter, & callum mediocriter confirmant. Ac de his multa capite de glutinantibus. Callum confirmat affusum vinum, quod πεθαλασώρδιον & θαλάττιον Græci, Latini salsum & marinum vocant: quod si desit, salem vino leniter adstringente liquefacere oportet. Idem vinum efficit, in quo balaustia, rosa, myrrha, muscus, qui veluti canities quædam quercui inhæret, absynthium, vîmi cortex & radix præcoxerint. Addunt poroticis quæ callum durant, bolum armenam, galbulos cupressi, & alia id genus. Sed hīc moderatio quædam adhibenda est, ne nimium stringendo nimium atteratur callus. Confirmant poron rosacei ℥. 4. resinæ ℥. 3. ceræ ℥. 2. Colophonix, mastiches, thuris ana semunc. conipressi, radicis erythrodani ana ʒ. i. Melius fiet autis emplasticis, minuto oleo, & adiecto momento

*Conueniens  
callus.*

*Mista que  
confirmant  
poron.*

# INSTIT. CHIRURGIC.

croci. Al. Thuris, farinae pistrinalis, picis, mastiches, boli armenae ana vnc. 2. sepi arietini, cerae albae ana selibr. Liquefactis cerae & sebo reliqua infriantur: in mistura linteum saepius inculcatur, & satis inqui-

*Sparadrapū.* natum fracturae impingitur. Sparadrapum vocant. *Apostolicon,* Utuntur Apostolico & Oxycroceo. *Oxycroceū.* Apostolicon materiam attrahit cogendo poro: siccatur, confirmatur. Oxycroceum duriores poron magis emol-

lit, quàm extenuet: utrumque emplasticum, & gignendo callo idoneum est. Iam verò constare arbitror remedia comparari, ut mollis & dura corporum natura est, ut alio callo tibiam messoris, alio pueri conseras. In hoc enim minùs siccantia, minùs stringentia iustum poron contrahent.

*Callus maior.* In messorum fortioribus omnino utendum est. Callus maior extenuandus est deducta parte alimenti, & mutata qualitate: diu lenitèrque affricanda pars est ex oleo, sale, nitro. Eadem calida marina foueri debet, induci que malagmatis quae discutiant, quaeque contrahant: colliganda arctius: oleribus utendum & vomitu. Alterum membrum perfricandum, vinciendum molliter, & sinapismo illinendum, unde plus sanguinis excipiat. Paulus in recenti callo, qui supercreuit, vehementer stringentia instituit, arctissimè ligat, lamina plumbea interdum apposita. In eo verò qui iam vetustate induruit, si quidem pudendum inde ac deforme membrum est,

*Excrescens  
callus recens  
& vitiosus.*

neque officium facit, cutem aperit, deradit, poron terebra pertundit, lacerat scalpro, quòdque videtur superesse, peramputat. Quòd si nullum naturae munus per callum intercidit, si nullus aut non ita conspicuus membri pudor est, nullus denique

dolor, præstabit abstinere ferro. Qui verò infra modum crescit, aut non crescit quidem, quo iam tempore admotis auxiliis debuit coalescere, alia ratione promoueri debet. Ac ferè tardatur callus, *Vnde tardatur in porus.* quia nimium ac sæpius fouetur locus, parum conuenienter adstringitur, sæpius & ante tempus fasciæ resoluuntur. Non rarò quoque in ratione vitæ peccatum est. Omnia ergo commutanda in melius, ac de integro ad præcepta artis, ad auxilia & alimenta, quæ callum gignant, recurrere oportet. Quòd si atrophia & inopia alimenti totius corporis callus non prouenit, in primis cõsulendum corpori, deinde affectæ parti, postremò ad curam calli decurrendum est. Sæpè etiam astrictioribus linteis *Extenuati membrorum curatio.* effractum membrum vitium contrahit, atque intrabescit. Hic ergo instauranda vita est, distringenda ligatio. Ac de remediis quæ ad hanc rem faciant, dropace, sinapismis, & aliis, dicentur quædam capite de Pyroticis. Sed quia hic casus vitiosa ossa interdum sequitur, pauca quoque hoc loco contra hoc genus mali differemus. Extenuatum membrum vehementer iuuat commoda deligatio, sed contrà quàm in fracturis. Marcescente tibia femur superius alligamus ab inguine ad genu deducta fasciâ: atque initio quidem, quâ scilicet inguen proximum est, arctior, deinde paulatim relaxatur. Sic enim per communes venas quasi riuulos sanguis deorsum exprimitur. At contrabescente dextro femore, vel toto crure, femori sinistro fascias iniicimus à genu ad inguina ductis orbibus: atque initiis astrictior deligatio: astricta quoque, sed minùs, quò propius inguen appetit. Qua quidem arte aliqua

*Deligatio  
extenuati  
membrum.*

pars sanguinis veluti diuerticulo in gracile mēbrū recurrit. Sit autem ea ratione temperata deligatio, vt neque dolorem creet, neque vniuerſum ſanguinem à ſano mēbro reprimas. Hoc enim alere frugaliùs, nutrire tamen certū eſt: quod quum languenti membro aliquid proprij alimenti impertiat, retineat tamen vnde tenuiter, ſed commodè, nutriatur. Eadem ratio in ſuperioribus membris ſeruanda eſt. Areſcente vlna brachium deligamus: contabefcente brachio vel tota manu, ad reliquam manum vincula conuertimus, frictione, perfuſione, metaſyncriticis vocatis, dropacibus, ſinapiſmis ea ratione vtēdum erit, quæ capite de Pyroticis deſcribetur. Sunt etiam acopa ad membra cōfecta macie accōmodata: quale eſt Damocratis. Illinitur à cibo: marcidos exuccoſque ſenes reficit, & calore fouet: Hyeme & in frigoriſus inungitur dormituris veſpere. Ammoniacy, ceræ albæ, mellis recētis, adipis anſerini recentis, thuris ana ꝑ. 10. galbani, medullæ cerui, æſypi, terebinthinę pellucidæ ana ꝑ. 4. vini falerni, alioqui gilui odoriferi ad circiter heminas quinq; , olei heminas 40. Parandum eſt maiuſculo mortario: thus & ammoniacum cōfringuntur, & affuſo vino macerantur: teruntur, circunducuntur duro cochleari, dum ſit mellis craſſitudo: mel, æſypus, medulla cerui deinceps immittuntur, verſantur, circumagūtur, donec cum aliis bene cōeant. Dum hæc ſiunt, cera figulino vaſe cum oleo eliquatur: ex quo adeps, terebinthina, galbanum permifcentur: vnita omnia tranſuaſantur, & ſpatula cōmouentur. Refrigerata pinſuntur manibus, poſtremò aliis in mortario cōiunguntur: ſitque liquidi bonique mellis craſſitu-

*Acopon  
Damocratis  
ad membra  
tabida.*

do : stanneo vase vel buxco reponi debet. Neruorū *Distortus.*  
doloribus, perfrictionibus, inflammationibus vteri *callus.*  
in pestis vtilissimum est. Distortus callus, si quidem  
mollis est, laxante foru & diaphoreticis exinaniri  
debet : fouetur tepida, hydrelæo, althææ, & similiū  
decocto. Discutitur arida sicu mista stercori colum-  
bino. Sed utrūque genus medicamentorum libro *Mollior cal-*  
I. abundè explicatum est. Si verò nimium induruit, *lus et durior.*  
eadem quæ in supercrescente & inueterato poro *Mucosus*  
consilia sunt. Mollior adstringentibus firmari de- *humor.*  
bet. At vix durior esse potest, nisi ea de causa fragi-  
lior videatur, vbi nouo callo opus est. Est quum in  
cartilagine, neruo, ossè muccosus humor colligitur  
infirmirate naturæ, quæ concoquit : albus is est &  
viscidus, qui similitudine puris medico possit im-  
ponere : cedit enim digito pressus atque dilabitur.  
Is si negligitur, sic ossa afficit, vt hæc inde corrup-  
pantur: vicinæ carnes vitiū trahant, & mucco elan-  
gueant. Ex quo fit, vt relinquant ossa, societasq, illa  
& copulatio quæ ossibus est cum carne, dissoluatur.  
Aliquando quoque in tophos humor ille concre-  
cit. Sed de tophis postea differetur, vt de gangliis,  
quæ inde etiam cōmouentur. Contusis neruis, ossè, *Mucosus*  
cartilagine muccus ille magna ex parte nasci cōsue- *humor quo-*  
uit : qui cū crassus sit, lentus & frigidus, & in alto *modo va-*  
desideat, non ita facilè vacuari potest. Curandum *cuandus.*  
tamen, vt laxata cute, fusa incisâque materia in hali-  
tum & vapores sensim expiret: alioqui factō vulne-  
re repurgari debet : quanquam partium ratio prius  
habenda est, alioqui periculum fit, ne vel occidas,  
vel grauitè lædas. Quod in igne similiter animad-  
uertere oportet. Finge igitur cohtusa costa, fracta,



collisa, coisse mucum, & desperatis aliis auxiliis ad ferrum & ignem decurrendum. Periculum imminet, ne venæ, arteriæ, nerui qui interferuntur costis, conuulnerentur: ne vel ferro vel igne intima membrana violetur. Inueterato malo, inquit Hippocrates, & desperatis aliis remediis, si quidem dolor est, & mucum illum caro lateris concepit, optimum in igne remedium est: videndū tamen, ut neque os contingat ignis (nisi iam corruptum atque syderatū videtur) neque superficiem solā transcurrat, sed carni prudenter imprimatur, ut ad membranam non perueniat. In fractis & dimotis ossibus inflammationum reliquiæ disperguntur, ne inde rigent articuli, & ad suos motus colligantur. Disperguntur pharmacis quæ molliant atque discutiant: frictione & motu: frictio sit lenis, mollis, quæ paulatim intendatur circumductis manibus modo sursum ac deorsum, modò in latera & orbem, ut inde musculorum fibræ molliantur, & reliqua inflammatio euanescat. Leniter quoque mouendus articulus, ut paulatim & sine dolore naturæ suæ consuescat.

*De remediis neruorum.*

C. A. P. 2.

*Vitia neruorum.*

SEquitur neruorum locus, in quo tendines & ligamenta includantur: neque subtilius de nominibus disputetur, qua parte præcipuè rerum non verborum doctrina requirenda; & cura sedulò suscipienda est. Igitur vulnerantur nerui, contunduntur, dolent, torpent, rigent, contorquentur. Sauciato neruo conuulnerari caro ferè consuevit. Sauciatur, quia pungitur & inciditur. Quod quum accidit, omnino procuretur, ut ne ante tēpus os vulneris coeat, & iungatur cutis, vnde sanies nerui suo

*Vulnera neruorum.  
Cautio.*

veluti emissario interclusa, nervos laceſſat, atq; hinc oriatur dolor, phlegmone, febris, deliriũ, conuulſio, *Vitanda in nervis.* Excludenda sunt à nervorum cura, qua certè nervos contingant, quæcunque vel natura sua vel aduentitia qualitate refrigerent, quæcunque acria, quæ humectent, laxent, molliant, cõcoquant, putrefaciant. *Frigidum quantum nocet nervis, hystorius ostenditur.* Cuidam ad flexum natium qua in femur definit, coit, abscessus: expurgata forde detectus nervus est, qui frigore perculsus vniuersum crus stupidum reliquit. Alteri vulnus magnum in brachium illatum est cæsis etiam nervis, qui à ceruicis finibus per brachiũ decurrunt. Adhibitis iustis remediis, lanæ quoque oleo calente tinctæ superdatae sunt, iisdemque obstipata ceruix cõtra iniuriam frigoris. At is egressus domo publico se dedit: vbi paulatim frigescere lana oleum quoque refrixit: ex quo dolere cœpit, tensoque membro & ad ceruicem vsque progressio male, totus ferè conuulsione rigit. Omnino ergo vi frigoris vindicandus nervus est, multò magis cum vulnus accesserit. Frigidum enim, inquit Hippocrates, vlceribus inimicũ & nervis. Itaque dum hi curantur, quũque inseruntur pharmaca, non solum *Hippoc. aph. 18 & 20. lib. 5. Aphor.* videndum erit, vt ne hæc imponatur frigida, sed etiam ne vulnus aut certè quàm minimũ frigori exponatur. Inusta ala vetat Hippocrates, ne dum curatur vlcus, brachiũ altius attollatur, veritus scilicet ne ita explicata ala excepto frigore violetur. Idque metuendum magis, quum in vlcere dolor est, quem vstio cõmouit, qualis est vbi cauterium impresseris: deinde etiam si locus neruaceus est, & aliquid nervorum nudũ existit. Grauior quoque iniuria acriũ *Acria quantum nocent.*

est, quæ cùm admota cuti vehementer lædant, ægrum quidem præcipitabunt, si nudato nervo continenter inferantur. Quidam posteriore tibia vulneratus est, qua parte tres illi muscoli in tendinem coeunt, qui calcem cõprehendit, atque hinc in plãtam exporrigitur. Itaque aperto nervo medicamentum quod habet euphorbium, continenter illitum est. Ex quo dolore factõ, conuulsis nervis, atroci

*Vitiosa curã  
de via Thessali.*

morte sublatus est. Tolerabilior fortasse videatur, quæ nihilominus periculosa est medendi via, iam olim Thessalo & antecessoribus Galeni familiaris. Cuidam ergo diuisa cute cõpuncto nervo vulnerata stylo manus est, huic pharmacum Thessalus impegit, quo cutis coalesceret. Atque inde orta inflammatione cataplasma è farina tritici hydrelæo cocta instituit, ex quo contabescens æger intra septimum diem iugulatus est. Gladiator quidam ad genũ quã patella est, & tenuis latúsque tẽdo sese explicat, vulnus acceperat: in quo capta curãdi via vñitata Thessalo, ortãque inflammatione idem adhibitum cataplasma, calida aqua liberaliter affusa conspersum quoque oleum est. Atque hoc genere curandi tum hic gladiator periit, tum alij rapti sunt, alij claudicãrunt, quibusdã manca, contorta, inutilis manus reddita est: multis putruẽre articuli: ac breuiter quibus superesse datum fuit, graue aliquod detrimentum corporis incurrerunt. Colligendum ergo peccãsse Thessalios, qui implexum morbum quasi vñum & simplicem curarent, & quum mederentur morbis, nullam rationem affectũ partis susciperent. Peccatum quoque hac parte, quòd calida fõtus, conspersus oleo, & cataplasmate illo inductus nervus est.

*Explicatur  
peccatũ Thessaliorum.*

Hæc

Hæc enim vt alia genera inflammationum iuuare possint, inflāmatis neruorum vulneribus inimicissima sunt. Atque hæc obiter de vitiosa illa curandi via. Nunc autem legitima medendi ratio explicanda, & iusta neruorum remedia describenda sunt. Atque si lubet, ad curam reuocetur, cui manu stylo vulnerata neruus suffixus est, & alter gladiator, qui ad genu vulnus acceperat. Optimum enim docendi genus atque clarissimū, quod suis legibus quidē & præceptis cōstat, exemplis quoque ita illustratur, vt tota curandi ratio veluti quædam rerum historia sub aspectū veniat, & quasi oculis ipsis vsurpetur. Quæ profectò via hac præcipuè medendi parte cōsectanda nobis, in qua præcipitia multa occurrunt, & non nisi graui iniuria vitæ aberratur. Itaque ponamus cōfixum neruum vulnerata manu, leue quidem vulgari sensu, at reuera periculosum vulnus, etiam si stylus tã subtilis quàm acus pupugerit. Etenim orietur dolor, & ille malorū versus notatus initio cōnectetur, si vel negligas, vel aliena remedia instituas. Quæ omnia duplici ratione defugere oportet. Primū quidem iusta medendi via: deinde vbi remediis nihil proficiat, præfecto neruo, vnde grauioribus illæ iniuriæ cōmouentur. Nam non solum neruo, sed capite muscoli vulnerato, si quidem alia auxilia desperatur, ad ferrū decurrere oportet, omninoq; præcidendus tendo, & neruus est. Sed (si datur) alia prius ineunda medēdi via: primūq; animaduertendū, an os vulneris & via ad neruum satis dehiscat. Vbi enim angustiora sunt, & prætereà metus est, ne celeriter coëant, in crucē vel decussē cōfixam cutem interfecabis: multò magis si quid gra-

*Legitima  
curatio.  
Optimū do-  
cendi genus.*

*Hypothesis.*

*Duplex ratio  
curandi.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

uoris iniuriæ imminet, vt sit, qua sanies effluat, qua transpiret neruus, qua denique vis medicamenti ad punctum neruum permeet. Ac plethorico deplendus sanguis statim initio. Cacochymino vitiũ phar-  
 maco expurgandum est. Dextra manu læsa è mal-  
 leolo dextro sanguinem detrahes: dextro pede vul-  
 nerato, axillaris dextra aperienda est. Intersecta cute  
 vel alio facto vulnere, si quid cruoris inest, lanã, li-  
 noxylon, linteolũ molle specilli nucleo adalligabis,  
 intingẽsque sapa vel melicrato, ne asperitate lædãt:  
 tum exprimes, & cruorem inde molliter exterge-  
 bis. Ac dulci sapa vti oportet, non ea quæ astringat.  
 Post initia loco sapæ vinum dulce, deinde etiam vi-  
 num album, quod minimũ aque sustineat, vtile est:  
 quo iam tempore ad cicatricem vulnus adducitur.  
 Fugiendum vinum quod acre est. Ex quo oleo ca-  
 lente manum vulneratam, carpum, alam, ceruicem  
 totã, sed præcipuè qua in dorsum abit, & dorsi ini-  
 tium largiter fouebis. Sic autem oleum calere de-  
 cet, vt neque mordeat feruore, neq; tepore soluat.  
 Oxelæo similiter vti licebit æstate quidem, & bene  
 carnosio ægro: verũ neque hoc, neque oleũ con-  
 tingat neruum. Atque his locis omnibus superdan-  
 tur lanæ eodem oleo delibutæ, & aliæ siccæ super-  
 alligantur, ne qua parte subeat frigus. Æger domi  
 desidet tepido cõclau: vino interdicitur, parsimo-  
 nia imperatur, procuratur omnia, quibus series illa  
 malorum auertatur. Ac pro lanis complicata linte-  
 æstate: hyeme linoxylon vsurpari potest. Bis tẽrve  
 vno die resoluuntur omnia, sæpius etiam hyberna  
 nocte, & vbi intercidit aliquid nouæ iniuriæ, Repe-  
 titur oleum, & lanarũ calor refouetur, omninóque

*Fotus ex oleo  
 Oxelæo  
 cõpuncto ner-  
 uo in manu.*

*Lanarum  
 vsus.*

*Quando sol-  
 uenda lanæ.*

adhibetur cura, vt ne quid frigeat: quæ omnia ad quintum & septimū diem verſanda ſunt. His rebus ita prouſis, ſimul atque ſanies vlceris exiſtit, de medicamento cogitandum erit. Quorum ferè duplex *Duplex genus medicamentorum in vulneribus neruorum.* Atque illud quidē abundē ſiccāt, leniter aſtringit, digerit, & aliquando extergit: quæ omnia ſine villo morſu & aſpersione efficere oportet: datur hoc in conſcriptis linteis, & expoſito netuo adhibetur. Vbi enim opertus neruus eſt, altero tantū genere vti licebit, quod lōgiùs quidem à neruo, ſuperdatur cuti temperatura molli in plagulis, vt vicina quoque cōprehendat. Atque hoc paulò acrius eſt, *Secundum genus.* ſed vt ne mordeat, tenui natura, valde ſiccāt, moderatē calefacit, apertū vulnus cōtinet, & ſaniem nerui foras eripit. Aperto neruo carptū linteolum primo genere delibutū inferitur. Ac medicamēta iam non oleo, ſed dulci ſapa ſoluenda ſunt: deinde hoc genus acrius in ſplenio ſuperaccōmodatur: ex quo modò cataplaſma impingitur, modò lanæ adalligātur, oleūque & alia, vt priùs, quandiu videlicet res in metu eſt, ſedulò adhibentur. Accedunt ad hæc quæ purgent vlcera neruorū, quæ neruos glutinēt, quæ putredini aduerſentur. Priuatim quoque in pūctis neruis abſceſſus quidem parui, diſtincti ſpatiis ſuboriuntur, & vicina occupāt, quibus remedia inuenta ſunt. Atque operto neruo regenerata carne ad acria veniendum, vt ad ea quæ ex euphorbio, & ſimilia, quæ non niſi periculo nudatum neruum attingant, etiāſi non ignoro, qui experientia freti ( vt affirmant) externum neruum candenti ferro curent, atque ita omni iniuria prohibeāt. Nunc ergo ad ea *Particularia materia.* omnia materia remediorū deinceps explicetur, ini-

# INSTIT. CHIRVURGIC.

*Olea.*

tio ducto ab oleis. Olea cōueniunt ad fōtus, & quibus pharmaca diluantur, dulce, bimum, trimumve, nō astringens, anethinum, chamæmelinū, zambacinum, lumbricinū, hypericinum, canabinū, caryinō, rosaceum, in quo terreni vermes inferbuerint: terebinthinū, ricininum, sicyonium, rutaceum, galbaninum, styracinum, sinapinum, raphaninum, ex ouis pressum, & alia quæ in anodynīs descripta inuenias.

*Medicamenta in nudis neruis.*

Leuiora initio, quādiu dolor metuitur, aciora ubi iam discutiendum est. In medicamentis quæ aperto neruo adhibeas, alia mitiora, alia magis cōtrahunt.

Atque hæc materia secundo libro ferè explicata est.

*Lauanda cera, resina, & metallica quando.*

Cera utimur, resina, & metallicis prius elotis. Calcem ex aqua dulci sæpius extinguimus, sæpius lauamus: ex quo solutā plurimo rosaceo nudato neruo imponimus: at rosaceo sine sale comparato uti cōuenit. Quidam etiā ex matura bacca oleæ confectū volunt. In eodem vsu est *Ἀλαπομφόλυγος*, quod hoc loco ita cōficiatur. ℞. cerusæ, pōpholygos, lith. ana. ℥. 2. cadmiæ ℥. 4. medullæ cerui ℥. 3. ceræ, olei rosati ana lb. 1. olei myrtini lb. 5. metallica trita, cribrata, lota, liquatis aliis intermiscuntur: coquuntur omnia dū non inquinent. In vsu (quod & de aliis crassioribus pharmacis semel dictum sit) diluendum oleo: æstate, rosaceo: hyeme, chamæmelino & aliis generis eiusdem. Phœnicino similiter utendum erit, quod minus habeat chalciteos. Pastillorum eadem ratio, Polyidæ, Andronis, Pasionis, qui in hæmorrhagia describentur. Calchātho loto & reliqua materia minuta in pollinem cōparentur: diluuntur ut prius, & durioribus naturis magis cōueniunt. Calx sub canicula tertiō lauāda mari, atque imbuta oleo,

*Phœnicinū.  
Pastilli.*

operto neruo opponitur. Meliùs elota & magis ne-  
 soluta fapa, vel, vt aliis placet, multo oleo etiam ex-  
 posito neruo adhiberi potest. Aqua verò in reme-  
 diis neruorū omninò abstinendum, nisi vbi calor  
 & acrius medicamentū téperandum: sic enim mis-  
 ceri potest. Efficiendum, tamen est, vt dum liquan-  
 tur illa, absumatur aqua in halitum, & solā vim, qua  
 temperet, relinquat. Amicum neruis διὰ τῆς μέλι-  
 τοϛ tetramyron appellant, quod iam exoletis my-  
 racopis cōfici non potest. Non longè aberit quod  
 hac temperatura cōparetur. Mellis, terebinth. liqui-  
 dæ ana ℥.3. olei nardini, costini, rosacei, chamæmeli  
 ni ana vnc.3. vini odoriferi lib.1. foliorum maiora-  
 næ, calendulæ, florum chamæmeli, anethi, meliloti,  
 rosarum, rosmarini ana drachm. du. cinamomi, ra-  
 dicis acori, cyperi ana drach.1. Hæc omnia nocte  
 integra macerentur vino, postridie olea superaffun-  
 dantur: coquātur omnia dum expiret vinū: reliqua  
 concepta colo traiciantur expressum oleū melli &  
 terebinthinæ seorsum fufis vniatur, moueātur om-  
 nia in cineribus: sublatis igne puluis respergatur ex  
 ambaris & moschiana granis duobus. Sunt & alia  
 id genus, quæ in anodynis describentur, quæ ceræ,  
 terebinthinæ & melli mista ad rem præsentē perti-  
 neant. Sunt qui solo melle ex rosaceo pisto vti so-  
 leant. Est & hoc è melle quod conueniat. Litharg. *Aliud è melle.*  
 olei veteris ana ℥. quatuor: Colophonix, cerę lotę,  
 axungix veteris ana ℥. tres, & ad circiter 3.3. Lithar.  
 oleo coquitur, deinde axungia, postremò cera &  
 Colophonia seorsum fusa coniunguntur: in vsu sol-  
 uitur vt priùs. Aliud. Ceræ ℥.1. terebinth. semuncia:  
 olei mastichini ℥.3. mellis semunc. coquūtur omnia



# INSTIT. CHIRVURGIC.

molli carbone: subductis igne, insperge pulueris lūbricorum, mirrhæ, radicis symphiti ana ꝯ. i. versentur omnia, & sedulò coniungantur. Ægyptia Andromachi, Giluum Haliæ, Isis, quæ in his libris scripta inuenias, soluta rosaceo vsui sunt. Sed quæ parantur melle, magis tempestiua sunt, quo tempore fordescit vlcus. Quæ verò fiunt è metallicis, & siccant magis, leniora quidem initio, fortiora post initia surpanda sunt. Turunda posteris imbuitur terebinthina, oui luteo, & momento croci: inseriturque decliui parti vulneris, quâ emissariū sordis patescit: terget & lenit. Iam verò quæ purgent vlcera neruorum, quæque glutinent, ex secundo libro repetenda sunt. Peculiariter neruos coniungit vocata Cizicene. Thuris quàm optimi, myrrhæ, aristolochiæ, chalcitidis vstæ lotæque, iridis, galbani ana semunc. lithargyri, terebinthinæ ana ꝯ. i. olei ꝯ. 9. Omnia ahenocapta blandis cineribus coquenda sunt, mouendaque sine requie: postremò in frigidam mersa

*Cizicene  
quæ glutinēt  
neruos.*

*E limacilus.*

*E cochleis.*

*Vsitata post  
terris.*

manibus cōiunguntur. Aliud. Carnis limacum ꝯ. 2. myrrhæ, thuris, picis torrefactæ ana ꝯ. i. Tunduntur carnes, reliqua verò in puluerem trita sedulò intermiscuntur. Aliud. Carnis cochlearum bene contrusæ vnc. 3. farinæ pistrinalis, picis siccæ, pulueris lūbricorum & radicis symphyti ana scrup. 2. terebinthinæ è vino lotæ semunc. iungantur omnia. Vsitata sunt vnguentum de vermibus, Basilicum magnum Mesuæ, emplastrum relatum ad Andromachum, Diachylon in linteolo, inciso neruo soluta adhibetur, soluuntur rosaceo & terebinthina mistis. Intestinum terræ per se intritum & appositum, vel aliis cochlearum more intermixtum. Atque hæc obiter.

Nunc autem breui compendio omnia cogamus. *Compendium eorum quæ dicta sunt.*  
 Compuncto neruo prima ratio totius corporis habenda est, vt vel purgetur pharmaco, vel phlebotomo depleatur. Deinde prouidendum, ne diuisa cutis celerius coeat: quod si metuitur, intersecandum atque ampliandum vulnus est: extergendus cruor, & si expositus neruus est, primi generis pharmaco integere oportet. Oleo fouenda manus, carpus, cubiti articulus, ala, ceruix: superalliganda lanæ, iustitanda vita, quæ grauiores casus prohibeat. Qui si iam existant, neque remedio locus est, intercisa cute, satis ampliato vulnere medium neruum præcides: hîc enim detrimentum partis certo exitio vitæ præferendum. Præfecto neruo extra periculum ager est, & communi illa curandi via vulnus claudere oportet. Iam verò intecto neruo & plaga satis hianse, eadem captanda medendi via, quæ aperto neruo exposita est: nisi quoddam relicto primo illo genere pharmacorum, tantum vtimur secundo, de quo iam connectatur oratio. Atque hæc materia in multiplici natura rerum posita est. In cerealibus subtilissimus est orobus: hoc lolium calidius est. Lupinus quoque & cicer in usu sunt. In farinâ commoluntur, incoquantur lixiuium, coguntur omnia in cataplasma. Lixiuum, vt est materia vnde excolatur, ita vel acrius, vel clementius esse par est. Præstantissimum è ficu & tithymalis. In liquabilibus succus est Cyrenai- *Liquabilia.*  
 cus, medicus, scordolascus, quibus Assæ nostræ & Benzotinum successerunt: sagapenum, propolis recens, opopanax, galbanum, pix, resina, terebinthina præcipue & larigna, adeps qui sit tenui & calida natura, ex feris, prædatoriis auibus & rusticis, de quibus

in attrahētibus. In plantis tithymalorum succus & cinis, succus & pulvis maioranæ, calaminthæ, fabianæ, anagallidis, baccarū lauri & iuniperi, acori, maioranæ, aristolochiæ, mei, gētianæ, ireos, enulæ, bryoniæ. Adhęc piper, cardamomū, zinziber, caryophyllon, cinamomū aliáq; id genus. Metallica vñ sunt,

*Planta.*

*Metallica.*

*Formule  
quædam*

myfi, chalcitis, squama, ærugo, chrysocollo, calx, sulphur viuum, vitrioli genera, arrhenicum. Fermentum quoque vtile est, sed quàm vetustissimum: euphorbiū, castoreū, stercus columbinum. Postremò quoque multarum rerum vsus est hac parte, quas in attrahētibus scriptas inuenias. Terebinthina per se in natura molli: in dura cum tantillo euphorbij satis efficit. Eadem ratio propoleos, si quidem pinguis est: durior conueniente oleo vel adipe molliatur. Fermentum vetus per se, cum propoli pingui, melle, pice liquida vel pari terebinthina mistū. Lactē etiā tithymali leniter intingitur: ex aceto pistū efficacius est. Sagapenū, terebinthina, oleum simul liquefcunt, vel cum his, sagapeni loco; galbanum, opopanax & alia id genus: tantūmq; olei intermiscendum, vt sit temperatura mellis. Resinis liquidis, terebinthina abietina, pinea, vtendum siccis, fricta abietina terebinthina, strobilina, quæ durioribus idonea est, pauco oleo soluēdæ sunt. Sulphur viuū, non lapidosum, tenuium partium, aut castoreum ex oleo subigitur eodem temperamento. Molli enim hæc omnia, & compage, quæ consistat quidem, sed non diffuat, esse oportet: sordium instar in mollioribus corporibus, crassitie mellis in durioribus. Tetrapharmaco duodecima pars sulphuris, arrhenici, euphorbij, calcis immiscetur: soluendum prius ex

oleo. Medicamēti ex euphorbio plurimus vsus est: *Ex euphor-*  
 quod quia in ceratis ferè est, de his quoq; breuiter *bio.*  
 nobis differendum. Igitur cerata varie cōcinnantur *Ceratorum*  
 è cera, pice, resina, propoli, adipe & oleo. Simplex *ratio.*  
 è subdupla cera, vt in catagmatico: pari, vt emplastro *Simplex.*  
 de subtripla & subquadrupla ad oleum, vt in aco-  
 pis, temperatur. Miscetur adeps & terebinthina li-  
 quida, sed vtróque misto oleum iusta ratione mi-  
 nuendum est, ne temperamētum liquidius diffuat.  
 Picatū, quódque aridam resinam capit, è cerę parte *Picatum.*  
 vna, tribus & quatuor olei, subdupla pice vel resina  
 ad ceram compingitur. Quæ ratio seruari potest in  
 ceratis, quę galbanum, propolin, sagapenum & alia  
 id genus concipiant. Terebinthina & quæ liquida  
 sunt, subtripla cera commiscentur: duplo interdum  
 misto oleo, interdum triplo. Iam verò euphorbij *Modus eu-*  
 bimi & trimi ferè æquale pondus, & ceræ tempe- *phorbij.*  
 ratur ad  $\frac{3}{4}$ . i. ceræ  $\frac{3}{4}$ . 6. euphorbij recentis sexta pars  
 satis esse potest. Quarto, quinto & sexto anno equa-  
 le sit ceræ euphorbium: vetustiore vtendum non  
 est. Sextula euphorbij aliquando satis esse potest.  
 Et vt sunt corpora, vt vicina cuti, vel longiùs ab hac  
 punctura, ita lenius & acrius pharmacum misceri  
 debet. Ac quātò plus ceperit euphorbij, tātò acrius  
 futurum est. Sed omnino in euphorbio annorum  
 habenda ratio. Neque aliter stercore columbino  
 & puluisculis acrioribus, qui ceratis inspergantur,  
 vtendum erit. In cerato è stercore columbino mo- *E stercore*  
 dus stercoreis interdum deciditur, tantúmque æru- *columbini.*  
 ginis crudæ sufficitur, quantum stercoreis subtraxe-  
 ris. Ceratum aliquando succis illis plantarum im-  
 buitur, aut puluisculis permiscetur. Verùm exempla

# INSTIT. CHIRVRGIC.

quædam subiicere melius est. Acerrimum erit, ceræ  
 sesquuncia, olei vnciæ quatuor & β. euphorbij re-  
 centis semunci. In medio tantum drachmæ tres eu-  
 phorbij : in infirmo ad circiter ʒ. 2. Satis vsitatū est  
 veteribus quod sequitur. Ceræ ʒ. 1. terebinthinæ li-  
 quidæ, picis ana semunc. euphorbij recentis drach.  
 2. Euphorbiū liquatis aliis permiscetur, vel ex oleo  
 tritum confusis cæteris coniungitur. In vsu vim me-  
 dicamēti sensus iudicabit. Acrius arrodit, & os vul-  
 neris amplificat : hinc quoque rubor & dolor gra-  
 uis in ambitum excitatur. Hoc ergo celeriter reuel-  
 lendum, relictoque linamēto quod fortasse incum-  
 bat neruo, oleo paregorico fouendus locus est, do-  
 nec acquiescat dolor. Hicque benignius ceratum  
 misto adipe, deducta parte euphorbij, imponendū.  
 Languidius neque sensum vllum, neque calorem  
 mouet, auctoque euphorbio acuendum est. Iusto  
 verò pars molliter incalescit, & leni quasi prurigi-  
 ne titillatur. Atque hæc in cerato de euphorbio de  
 probando pharmaco in toto hoc genere cōmunia  
 sunt. Cæterum falli contingit quod à languidiore  
 medicamento pariter atque ab acriore dolor exci-  
 tatur & inflammatio, idque præcipuè vbi vulnus  
 cutis angustius est. Nam cum medicamentum non  
 attrahat, aut attrahat quidem, sed minùs quàm cō-  
 ueniat, sanies multa colligitur, quæ insidens neruo  
 eas iniurias accersit. Sed ab acriore paulò pòst quā  
 adhibitum est, à languidiore multò pòst dolor &  
 alia id genus commouentur. Atque hæc medica-  
 menta bis tēve interdiu absolui debent, nocte non  
 mutantur nisi longiore, In medicamento quod è  
 metallicis conficitur, vsitata veteribus, Misy, erugo,

*Probat in me-  
dicamenti.*

chalcitis & squamæ æris. Misy & chalcitis exoleta sunt, nisi ad vitrioli & cuprosæ genera decurras. In his thus additur, adeps, resina, galbanum, quæ vim metallorum emolliant. Oleum sesquialterum ceræ, cera dupla, tripla, media inter hæc ratione ad metallica. Eadem resinæ sextupla est: thuri vero & galbano noncupla, quintupla & septupla est. Validissimum est, ceræ lb. 1. olei veteris sesquilibra, hyeme etiam ad circiter lb. 2. chalciteos crudæ ℥. 1. misyos ℥. 2. squamæ æris ℥. 3. terebinth. ℥. 2. galbani sesquūcia, thuris ℥. 3. hic cera quadrupla thuri, octupla galbano, sextupla resinæ, dupla metallicis. Infirmū ceram triplam capit ad cremata metallica, augétque modum thuris & galbani, vt vtriúsque pondus ferè subduplum sit ceræ, ad libram vnā ceræ, galbani vncias duas, thuris vncias tres. In medio media seruanda ratio. In his cera sit mollis, resina liquida, thus & galbanum vtrāque pinguiā. Metallica modò cruda, vt sit acrius pharmacum: modò cremata, vt sit clementius, vsurpantur. Eadem sub canis ardoribus ex aceto acerrimo pluribus diebus interuntur. Acetum vetus præferédum, quod nihil austerum, nihil vinosum resipiscat. Sed hac arte squama præcipuè elaboranda est. Thus quoque eodem aceto leniter interi vtile est Cera, oleum, resina colliquantur: thus & galbanum intermiscétur: metallica in aridum pollinē versa paulatim resperguntur, voluuntur spatha in prunis, & sedulò coniungūtur. Aliud est è metallicis, quod à Galeno descriptum est. Ceræ vncie sex, olei vncie nouem, misyos ℥. 6. chalciteos denarius vnus, squamæ vnciæ duæ & sem. thuris sesquuncia, galbani vnciæ 2.

*At d. camē-  
tum ē metali-  
cis.*

*Proportio  
ceræ ad oleū,  
metalla, &  
alia.*

Magdalides inde fictæ vſus tempore diluuntur, & inlita linteolis applicantur. Eſt & tertium genus *Ἀγὸ τῶν τηκίῶν*, è liquabilibus: quod & punctis neruis, & canum morſibus auxilio eſt. Sed hoc vt alia è metallicis, duris corporibus idoneũ eſt: quanquàm aliquando in teneris naturis infirmo pharmaco vtimur, cerato διὰ τεράτων temperamus, oleo deniq; prolixiũs hebetamus Picis  $\zeta$ . 4. aceti acerri-  
 mi  $\zeta$ . 6. & ad circiter  $\zeta$ . 4. opopanax  $\zeta$ . 1. Pix ſit mol-  
 lis, inferueſcat aceto dum cõliſtat: opopanax aceto fuſus aliis coniungatur in calidis cineribus. Dilata-  
 tum manu in magnitudinem vulneris interdũ ap-  
 ponitur, ſi quidẽ durum corpus eſt: in molli dilui-  
 tur oleo, & in ſplenio accõmodatur. Ægyptia An-  
 dromachi, Giluũ Haliæi & alia, verũ paulò craſ-  
 ſiora, nec ita diluta, in eodem vſu ſunt. Sequitur Iſis  
 illa ſacra, & ex templorum adytis repetita, quæ iu-  
 dicio veterum omnia emplaſtra ſuperat. Ex Vulcani templo Ægypto translata eſt, hieroglyphicis pri-  
 mũ deſcripta. Erant hieroglyphica monumenta rerum in myſteriis Ægyptiorum deſcripta, non li-  
 teris, ſed formis animalium & mutarum rerum, ne prophano vulgo innoteſceret: qualia Orus Apollo Græcus author cõmemorat. Scribonius Glichoni, Græci Epigono, alij Hermioni hierogrammateo attribuunt. Neruis punctis & venenatis morſibus vtiliſſima eſt: curat artuum fracturas etiã cum vul-  
 nere: effractam caluariã perſanat: facit ad detectam membranam tegentẽ cerebrum diluta roſaceo, de-  
 merſas ſquamas oſſiũ, & teſtulas caluariæ extrahit. Cephalalgias veteres perſanat, ſi raſo capiti dies vi-  
 ginti inſideat. Imponitur fronti contra hæmorrhæ-

*E liquabili-  
 bus.*

*Iſis.*

*Hierogly-  
 phica.*

*Virtus Iſi-  
 dis.*

gias narium, & fluxiones in oculos. Anginosus affigitur collo: glutinat, incarnat, mollit, & fistulis inditur, dilutum rosa, in collyriis. Celeriter pus generat, idemque per spiracula exorbet latente via: gangrænas & putredinē compescit. Suppurationibus mamarum prodest: prolapsis intestinis è vulnere ac repositis, post arctatū vulnus fibulis, aut sartum acia, vtilissimè imponitur. Lateris, stomachi, ventris, iecinoris, lienis frigidum dolorem sedat. Ad luxatum omne, & eiectum, & repositum articulamentum bene facit. Podagricis mirificè prodest. Cæcos serpentes, & carbunculos reprimat, purgâtque. Ad nervorum vitia omnia acopo melius facit: trahit aculeos, parotidas & callos discutit. Adenas vlcera & membranas ita eliquat, vt per se decidant: vacillantes vngues vel confirmat, vel extrudit. Commotum dentē stabilit, vlceribus narium medetur, ac breuiter præter cetera admiranda est. Sed variè describitur: mistura hæc magis placuit. Ammoniaci, æruginis rasæ, salis ammoniaci vel fossitij, squamæ æris *Mistura.* more veterum vsti, aluminis, aristolochiæ rotundæ, & vt Scribonius, farmētitię, thuris ana ʒ. i. myrrhæ aloës, galbani, aut vt Asclepiades mannæ ana sesquuncia: Scribonius sextans: cerę lb. i. & semunc. vt Heras, Andromachus, Asclepiades: Scribonio triēs: aliis ʒ. i. Colophoniæ, terebinthinę ana lb. 2. & ʒ. i. vt Andromachus, Heras, Paulus: alij scribunt denarios sex, alij denarios sexaginta. Quidā codices habent denarios centum. Scribonius terebinthinam omittit, & Colophonię scribit pōdo quatuor, aliàs pondo duo. Adhæc olei veteris sesquilibra, cui rationi consentit Scribonius, & sextarium scribit: alij



# INSTIT. CHIRVRGIC.

lib. 1. ponunt, alij felibram, heminas duas, heminae demidium, ʒ. 3. Certum est autem copiosum oleum esse necessarium, ut pharmacum consistat. Epigonus addidit succi radicis dracontij sesquunciam: alij praeterea succi seridis ʒ. 1. succi marrubij sesquunciam. Galenus sine succo seridis aliquando confecit, & alumen sustulit. Veteres ferè tantum sex denarios vsti aluminis miscuerunt. Alia teruntur, alia liquefunt pro sua quæq; natura, excepto galbano, quod in mortario cum tritis pharmacis circumagitur, aceto paulatim fuso, idque melius in sole: ex quo aliis liquatis intermiscuntur omnia: ubi verò sublata foco intepuerint, manibus aceto tinctis diu versantur: ærea pixide ad vsus reponuntur. Medicamentum diluitur vino, vel aceto, ubi glutinandum: aceto, ubi molliendum, In gangræna & putredine succos illos recipit: in vulneribus neruorum succum dracontij: alumen ubi repellendum. In punctis neruis sit compage mellis: in aliis modo crassius, modò liquidius, ut res & corpora postulabunt. In proxima laude est *αἰκνπν*, cui propter insuperabilem virtutem nomen inditum est. Parem Isidi vim habet: diluitur ferè oxelæo, immittitur fistulis, contractos articulos laxat, mollit, digerit. In abscessu ventris, coli, crassius dilatatum manu imponitur: thorulus oxelæo calente madens superimponitur, qui bis quotidie eodem oxelæo irrigandus est: tertio primum die vel quarto absolui debet. Hic si quid exasperauit, fotu olei mitigatur: ita efficit, ut ne purulenta vomica colligatur. Iam collectam extenuat, & per intestina quasi miraculo depellit. Reliqua verò Isidi similiter efficit, mistura sic habet. Squamæ æris ʒ. 7. & ʒ. 2.

aliàs  $\mathfrak{z}$ .6. & semis. in aliis sesquuncia: pyrethri, herbe  
 pedicularis, cocci cnidij, seminis sinapi, cachryos,  
 alioqui granorū paradisi, stercoreis columbini, ari-  
 stolochiæ sarmētitia, æruginis, cyperi, seminis eru-  
 cæ, cumini ana  $\mathfrak{z}$ .2. aliàs denar.6. nitri, salis ammo-  
 niaci ana  $\mathfrak{z}$ .4. baccharū lauri, mannæ, iridis ana  $\mathfrak{z}$ .15.  
 al.  $\mathfrak{z}$ .2. & semis. aceti acris sextarij 16. al. 12. decocti  
 caricarum cyathi 4. & sem. hoc est, ad circiter  $\mathfrak{z}$ .7.  
 olei heminas 5. hoc est, ad circiter lb.4. Tunduntur  
 primū quæ teri possunt: ex quo aceto sparso ite-  
 rum contunduntur sub canicula: vbi versata diu  
 exarescant: hinc iniecto ficuum decocto & oleo om-  
 nia coniungantur. Reposita in ære rubro per inter-  
 ualla aceto respergantur, vt seruentur mollia. In  
 vsu  $\mathfrak{z}$ .2. dissoluuntur aceto, & cum sextuplo cerato,  
 quod resinam habet, octuplo, quadruplo permi-  
 scentur. Descriptum prius decoctum caricarum &  
 ceratum, quod resinam habet. In cæsis neruis non  
 alia pharmacorum ratio. Linamenta primo gene-  
 re delibuta nudato neruo imponuntur: aliud è se-  
 cundo genere superdatur in plagula: cataplasmata,  
 lanæ, & alia similiter comparantur. In transuerso  
 vulnere vt periculum maius est, ita liberalius deple-  
 tur sanguis, seuerior vitæ lex ponenda est. Iam sit  
 exemplo gladiator ille, qui priore femore, qua mu-  
 sculi in patellam abeunt, transuerso vulneratus sit.  
 Magnum sit vulnus & profundum: vacuandū cor-  
 pus. Purgandum vulnus cruore terfo, nudus cæsus-  
 que neruus bene diluto pharmaco è primo genere  
 in carpto linteo obstipandus est. Superdandæ lanæ  
 oleo vel oxelæo delibutæ, totum crus oleo fouea-  
 tur, inguem, ile, pubes, spinæ pars, quæ lumbis &

*Transuerso  
cæsi.*

*Hypothesis.*

cœccyge intercluditur : ac breuiter tota spina dorſi  
 & ceruix calente oleo irrigentur : contegantur lana  
 ſuperiore ratione. Sæpiùs abſoluantur vt priùs, præ-  
 ſcribatur quies, vinum excludatur, decumbat lecto,  
 omnes aditus frigoris intercludantur. In eam figurã  
 componatur femur, in qua citra dolorem perman-  
 neat, quod & puluino molli innitatur, leniter pro-  
 clinetur parte aliqua, vt cùm cœperit eſſe ſanies, cõ-  
 modè repurgetur. Quo tempore ad ſecundum ge-  
 nus pharmacorum veniendum, quale eſt quod ha-  
 bet euphorbium. Sed hîc labris nimium deſſiden-  
 tibus futura opus eſt, quæ & muſculos capiat, &  
 ſubiectas membranas intertextas carni, & carnem  
 ipſam altiùs cõfigat. Verùm adhibenda cura, ne vel  
 neruus, vel tendo, vel vas denique magnum tranſ-  
 curſu acus vulneretur: deinde etiam vt decliui par-  
 te emiſſarium relinquantur, quã ſanies deſſuat, quã-  
 que medicamenta vulneri inferantur. Iam verò vbi  
 & vulnus purum, & inteectus carne neruus eſt, vbi  
 iam omnia in tuto poſita ſunt, ad comunem vul-  
 nerum curationem te conuerſes. Longa quidem  
 medendi via : ſed hîc præcipuè cogitandum, vt ne  
 cùm nimium properes, tardiùs abſoluas. In rebus  
 dubiis, & quæ non vrgent, ſat citò, veteri ſententia,  
 ſi ſat bene. In recto vulnere minor metus eſt : deli-  
 gatione vtendum, parciùs depletur ſanguis, neque  
 ſaturis opus eſt, ſi quidem faſciis coniungi poſſit: in  
 pharmacis ea ſeruetur ratio, quæ in tranſuerſo præ-  
 ſcripta eſt. Nunc de putredine & abſceſſu, quæ vul-  
 neribus neruorũ malè curatis ſuboriri ſolent. Ado-  
 leſcens Galeno cõmiſſus eſt, cui ex contuſione me-  
 dij digiti articulus computruerat. Itaque Galenus  
 contuſum

*Sutura.*

*De putredi-  
ne.  
Hiſtoria.*

contusum locum cataplasmate ex hordeacea & lixiuio induxit, tensa verò in ambitum, & cognatione dolètia oleo calète liberaliter perfundit: substracto deinde cataplasmate madentem locum molli-ter exterfit lana quidem sicca: ex quo subiecit catagmaticum ceratum, quod oleo ad ceram duplo conficitur, misto euphorbio. Communis enim curandi ratio puncti, cæsi, contusi nerui & tendinis. Adolescens ergò postridie meliùs habere cæpit, dólorque & tensio ad brachium satis remissa est: quo die pro hordeacea orobi farinā lixiuio iunxit. Terti-  
tio die omnia repetita sunt, forus, ceratū, cataplasma. Hícque superior manus & brachium omni iniuria liberata sunt. Sed in contuso articulo semiput-  
tre corpus membranaceū apparuit, ex iis quæ mediis tendinibus cónexa in seriem digitorum extenduntur: quod leniter cōmotum facile decidit. Rectè quidem quod computruerat leni tractu cōmotum est: etenim tum demum rescindi ferro aut vol-  
fella, vel digito putrefacta reuelli debent, quo iam tempore veluti maturitate quadam facile sequan-  
tur: neque maior vis nondū maturis inferenda est. Itaque separatis putridis membranis, cū incolu-  
mis tendo nudatus esset, Polyidæ pastillus sapa di-  
lutus in carpro linteo adhibitus est: & ceratum su-  
perdatum, quod capit euphorbium: cui cataplasma ex orobi farina & lixiuio adiectum est. Quarto die non aliud superesse visum est, quàm vt reliquias in-  
flammationis discuteret: alioqui ad cicatricem sese conuerteret. Cū ergò nescio quid durum relictū esset, abundè siccantibus vti instituit: vsusque est  
Iside medicamēto, postremò ad epulotica transiit.

# INSTIT. CHIRURGIC.

Atque hoc exemplum tibi positum sit ad contusos  
 neruos & putria. In utrôque conferunt initio cata-  
 plasmata ex hordeacea vel fabacea cocta oxyme-  
 lite, postea aliquid lixiuij additur, & reliqua farina-  
 rum genera vsurpantur orobi, lolij, cicerum, lupino-  
 rum: postremò solum lixiuium sine oxymelite co-  
 quendis farinis vtile est. Plura contra putria in pur-  
 gantibus. In contusis sed opertis neruis & cute in-  
 tegra oleum satis esse potest, quod laxet, discutiat,  
 & dolorem leniat: qualia in anodynis scripta sunt.  
 In dolore pix liquida & paregorica misceri possunt.  
 At simul contusa cute & vlcerata, siccandum simul  
 & constringendum: vbi salutare cataplasma athle-  
 tarum ex oxymelite & fabacea farina coctis. Recens  
 contusum membrum, fluentè calidum sanguinem  
 à recens casso animali excipiat, eoque immergatur:  
 aut in thoracem animalis via facta immittatur. In  
 abscessu, qui puncturæ in ambitum enascitur, Ori-  
 basij pharmacum accommodatum est. Ceræ, Co-  
 lophonix, butyri ana ʒ. i. picis aidæ, mellis ana fe-  
 munc. ærug. ʒ. 2. ærugo in puluerem trita diutissi-  
 mè in aceto volutatur, & liquatis aliis sedulo per-  
 miscetur: coquuntur omnia mota assidue dum cō-  
 sistant. Iam ad reliqua neruorum vitia properemus:  
 ac de dolore in anodynis. Torpor motus & sensus  
 iniuria est, qui & stupor appellari potest: vbi præ-  
 cipuè anatomica ratione recognoscenda neruorum  
 radix est, quæ semel læsa suum vitium longè latè-  
 que disseminat, cuique remedia primùm adhiben-  
 da sunt. Frustra enim digitum acopo fouebis, vbi  
 ex eo obtorpuerit, quia in alio ceruix, quo loco dor-  
 sum exterminat. Et ante remedia de causa mali quæ-

*In contusis  
 & putribus.*

*abscessus.*

*Torpor.*

stio habenda est. Torpor ergo & in totum corpus *Speſtanda*  
 ſpargitur, & in membra præcipuè, crura & manus: *in torpore.*  
 plurimum quidem à refrigeratione, deinde neruo-  
 rum anguſtia, quia vel luxata vertebra, vel innato  
 tuberculo opprimatur. Aliquando quoque exce-  
 pta aura torpedinis genus hoc vitij nervis inuexit.  
 Quòd ſi nihil horum incidit, ad ignauiam referen-  
 da, & in erroribus vitæ cauſa quærenda eſt. Quibuſ-  
 dam ſolennis vacuatio: arthriticis, ſtatus materiæ  
 curſus recurrente periodo in neruos corporis re-  
 ſpergitur. Quartanæ & alij morbi id genus in ſtu-  
 pore, reſolutionem corporis degenerant. Intem-  
 peries quoque hoc genus vitij nonnunquam gi-  
 gnit. Itaque in torpore, in obſoleto ſenſu corporis  
 & motu, de cauſa mali, de origine neruorum, qui in  
 læſas partes abeunt, quæſtiones primùm habeant-  
 ur. Calefaciendum quod refrigit, reponendū, con-  
 ſtituendūque quicquid loco ſeceſſit: incidendus  
 humor, atque diſpergendus, qui acetabula, vincula,  
 neruos, articulamenta denique infarcit: curanda  
 tubercula, laxandæ anguſtiæ, reformanda vitæ lex:  
 incitanda vacuatio, diuertendus materiæ curſus, &  
 omninò contraria reimedia contrariis vitiis adhi-  
 bere conuenit. Quæ calefaciant, & hinc neruorum  
 iniuriæ repugnent, ampliter ſcribentur in dolo-  
 rum remediis. De luxatis oſſibus ſuperiore capite  
 ſatis diſputatum eſt. Reliqua auxilia partim ex pri-  
 mo libro, partim ex adytis medicorum repetenda  
 ſunt. Quod autè ad originem pertinet, vt ſuo quæ- *An ſeruat*  
 que loco medicamenta imponantur, meminiffe *motu pereat*  
 decet, nonnunquam motum oboleſcere ſeruato *ſenſus, &*  
 ſenſu: aliquando verò permanente motu abo- *contrà.*

leri sensum : vtrūque etiā interdum obtorpesce-  
re. Atque vbi idem neruus tum ad sensum , tum ad  
motum à natura parti datus est, seruato motu incol-  
lumem sensum esse oportet. At incolumi sensu non  
protinus motus integer est. In multis corporis par-  
tibus neruorum fibræ ad sensum in superficiem ex-  
plicantur : rami verò musculis inseruntur , vt mo-  
ueāt : vbi saluo altero motu, si lubet, sensum exole-  
scere contingit : multò magis quum alio atque alio  
ortu vtrūque enascuntur. Multis quoque partibus  
ad varios motus multi nerui, tendines, musculi à  
variis locis inuecti sunt, quod in capite, artubus,  
ore, thorace, & maxillis, atque adeò toto corpore  
facile intelligat, quicumque in anatomica discipli-  
na fuerit exercitatus. Vt ergo iniuria paris est, ita re-  
quirendus neruorum ortus, cui ( si opus est) reme-  
dium instituas. Ridiculum enim intremiscentibus  
vel contortis labro & genis ad eos neruos confu-  
gere, qui à tertia cerebri propagine in totam ferè  
faciem disperguntur. Motus enim in vitio est, ne-  
que sensus iniuria ad quæstionem proponitur. Re-  
quirendum ergo, nunquid detrimenti ceruix acce-  
perit, qua parte latus ille musculus longè latèque  
in faciem explicatur : num qua relaxata vincula,  
nunquid iniuriæ à temporalibus musculis & neruis  
primùm ortum sit. Neque absurdum minùs quod  
sequitur. Cuidā in itinere è pluuiā & frigido Aquilone  
suprema ceruix inalserat, læsa quoque graui-  
ter ea iunctura, quæ ad vocatum dentem articu-  
lata est. Atque hinc optimo iure sensus caluariæ  
obtorpuit, quia ab ea vertebra sublati neruis, vis  
sentientis animæ capiti inspiratur. Igitur cū fru-

*Exemplis res  
declaratur*

*Historia  
quedam.*



fra calidis medicamentis pugnatum esset, quæ ca-  
 piti impingebant: accersitus Galenus ad dentem  
 vocatam vertebam remedia conuertit. Igitur re-  
 calfacta parte, quæ primùm inalserat, sensus calua-  
 riæ celeriter instauratus est. Multis iunctura illa  
 frigore perculsa, vt & tertio & quarto articulo col-  
 lum modò constans, modò intortum dolénsque  
 riger, neque pro libidine conuertitur, vbi frustra  
 capiti remedia imponas. Sed adhæc designandæ  
 partes, vnde vincula procedant, oriantur nerui, in-  
 ducantur muscoli, quibus ceruix capiti colligatur.  
 Sed & post dentem articuli vel pelluntur loco, vel  
 frigore percelluntur: atque hinc laborant muscu-  
 li, qui è collo in thoracem sese explicant: ex quo  
 efflatu intercepto materia vocis, vox quoque in-  
 terdum supprimitur. Verùm omninò meminisse  
 oportet in tota spina leues esse iniurias, quas fri-  
 gus intulit: grauiiores quæcunque vel phlegmone,  
 vel tuberculo commouentur. Asperissimum malum  
 est luxatis articulis, multò maximè quum intrò  
 pulsa, & in obliquum vel angulum torta verte-  
 bra est. Sic enim nerui angustius comprimuntur,  
 qui è spina quidem exigui paucique foras discur-  
 runt: plurimi verò atque præcipui feruntur intrò,  
 & semel læsi longè grauissima pericula intermi-  
 nantur. Quidam subsectis strumis obmutuit nuda-  
 to nerno, eoque perfrigerato, qui vocem fingit.  
 Alteri in dorsum deturbato vox intercepta est. At-  
 que hic curato dorso, ille concalfacto vocali ner-  
 uo vocem recuperauit. Pausanias sophista in dorsi  
 initium præceps corruit, atque hinc seruato mo-  
 tu, inter mortuus sensus est, qui vltimis duobus di-

*Efflatio laesa.  
 Comparan-  
 tur inter-se  
 spine iniurie.*

*Nerui è spi-  
 na foras &  
 intrò.*

*Historiis  
 explicatur  
 locus, cui re-  
 media im-  
 ponantur.*



*Accidentia  
manuum in  
gravi pleu-  
ritide & pe-  
ripneumonia.* gitis & dimidio tertij inspiratur. In graui peripneu-  
monia & pleuritide, ad extremos vsque digitos  
sensus quibusdam violatus est, plurimis brachium  
condolefcit, aliis quoque motus leniter obtun-  
ditur, læsis scilicet neruis qui à dorfi initio prima  
costarum spatia intercurrunt, & in brachium, vl-  
nam, extremos quoque digitos sparsi deferuntur.

*In vitij  
manuum.* In torpore & tremore manuum recognoscen-  
dum, num quid vitij ea parte spina fecerit, quæ  
quarta & nona vertebra intercluditur. A sexta qui-  
dem, septima & octaua in totam manum nerui  
dimittuntur intermixtis fibris à superioribus arti-  
culis. Sed è septima & initio dorfi, interiore ma-  
nu & posteriore plures decurrunt: in vlnam, vlti-  
mos digitos & dimidium tertij dispescuntur. A su-  
perioribus coniugiis vertebrarum in superius bra-  
chium, exteriorem, priorémque manum, maiores  
quoque digitos nerui disperguntur: quanquàm  
ita hi omnes sese implicant, vt non facilè in me-  
dio cursu & finibus separentur. Cervice læsa, quæ  
quintum spondylium quarto conferitur, offendi-  
tur respiratio, quia hinc diaphragma neruos ex-  
cipit. Affecto dorso & neruis, qui costarum spa-  
ciis interferuntur, vox hominem deficit: quia ma-  
iôr vis illa spiritus, qui materia vocis est, non effla-  
tur. Lumborum iniuria & inde laborante abdo-  
mine ingrauescit respiratio, & excrementa segniùs  
depelluntur. Quidam è scala præceps in lapidem  
impegit, quæ lumbi facium os exarticulant, isque  
locus intrò compulsus & obliquè luxatus est. Ex  
quo cœpère crura frigescere, ortaque inflamma-  
tione alui excrementa & vrinæ restiterunt. Puero

*A dorso &  
lumbis iniu-  
ria.*

*Suppressa &  
sine volunta-  
te micta vri-  
na.*

in captura piscium spina perfrixit, quâ lumbi deficiunt: condoluit vesica, alius sine voluntate ster-  
cus deiecit. Alter in eadem iniuria inuitus omnia  
commingebat. Cuidam puero in osse sacro exarti-  
culata & intrò pulsa vertebra est. In quo neglectū  
malum occalluit, atque inde factū, ut non nisi ægrè  
& in stillicidium vrina exprimeretur. Alteri obliquè  
torta articulatione, vrina in totum suppressa est. At-  
que hæc nō iniuria, si quis intelligat è finibus lum-  
borum neruos in crura plurimos, quosdā in vesicā,  
podicem & genitalia dispergi: maximos posteriore  
parte rectā in poplitem decurrere: minorum alios  
quidem, quâ pubis os foratum est, in priora crura  
disseminari: alios verò obliquè ad inguina diuer-  
ti, vnāque cum magna vena & arteria, atque extra has  
in anteriores partes femoris deferri. Ab osse sacro  
alia quoque neruorū soboles superiorib⁹ intexitur,  
vnde vesicæ & aliis partibus perplexæ fibræ inserā-  
tur. Atque hæc obiter. Neque enim huius instituti  
est anatomiam describere: sed parum explicata re-  
media videri possint, nisi etiā designetur locus, cui  
applicentur. Frustra enim torpentem pedem exci-  
tes, & anum vesicāmq; refoucas, quū à lumbis pri-  
ma mali labes orta est. Atque hoc in lumbis semel  
explicatū, in aliis spinæ partibus & inde factis iniu-  
riis seruare cōueniet. Et quæ de torpore, de paraly-  
si quoque & tremore dicta putētur. Cōtra quæ om-  
nia in dolorib. Acopa scripta inuenias. Ipsi, aniceto,  
aliisque generis eiusdem vti liceat. Nunc ad reliqua  
transcundum. Igitur rigēt nerui, atque cōtorquen-  
tur: vtrūque quia conuulsi, gangliis occupati, &  
eo vitio impediti, quod inflexis neruis ἀγκύλω,

*Nerui crum-  
tum.*

*Rigor & cō-  
tortio.*

quódque tenfis atque rigentibus ὀρθόκυλον appell-  
lant. In ancyle contendí membrum non potest, &  
quasi reuulsum mancúmque manet. γαλιασκῶν  
Hippocrati qui inde cubito est breuiore, ἄσκος Ga-  
leno appellatur. In altero vitio exertum est, rigidú,  
nec iam inflectitur: quia videlicet veluti alternante  
imperio, motú efficiunt, cedúntque nerui, tendines,  
musculi quicúmque à natura ad membrorum flexus  
cōtentionésque instituti sunt. Atque hæc quidem in  
totum corpus incidút, in neruos, tēdines, musculos  
& articulata coniugia, per quæ collú capiti copula-  
tur, sed præcipuè in digitos, cubiti iuncturas & po-  
plitis. Familiaria arthriticis è materia crassa, quæ in  
articulis cōcreuit. Eadē efficit cicatrix magna, quæ  
in callum obduruit. Iisdem immoderata siccitas, &  
flatus aliquādo causa est. Atq; hîc facilè discutitur.  
Siccitas hydrelæo, in quo semen lini, althææ, fœnu-  
græci & horú folium & radix inferbuerint, balneis  
aquę dulcis, in lito dulci oleo & similibus téperatur.  
Rescinditur cicatrix, vt cōtractæ partes relaxentur,  
vitatis neruís & tendinibus. At scirrhus frequētissi-  
ma causa est. Is ergo statim initio laxante materia,  
quæ prætereà remolliat, tentari debet: hydrelæo in  
quo tum illa, tum cucumeris syluatici radix, & lauri  
folia præcoxerint. Irrigādæ partes, fouendæque si-  
cyonio, irino, aliísq; id genus, ex quo lenioribus aco-  
pis vtendum erit, quæ molliter affricentur: atque  
hinc superalligantur lanæ, modò succidæ, modò o-  
leo delibutæ. Blandè cōmouetur articulus, vt pau-  
latim assuescat naturæ. Itaque initio diachylon &  
leniora malactica oleo lirino, irino, anethino, sicyo-  
nio, & aliis id genus dilues, atque hinc articulum

*In quibus  
partibus an-  
cyle est.*

*Causa.  
Curatio.*

molliter affricabis. Postea verò Amythaonis pharmacum, Cathægetæ, Asclepiadis, Aniceto, Iside, emplastro de meliloto, immisto quidē oleo, sed paulò crassiore temperamento, utendum erit. Atque omnino ea cōsectanda curandi ratio, quæ in malacticis pluribus explicata est. Conuulsio, inquit Hippocrates, exinanitione fit & repletionem: at illa ferè in desperatis ponitur. Hydrelæo tamen, balneo è media materia, & iis quæ tepido humore laxet, uti licebit. In repletionem qualitas quoque materiæ includenda, quæ vel acrimonia, ut sanies in neruis, vel frigore mordeat: de quibus ex Hippocrate quædā iam antè annotata sunt. Adhibetur medicus, irrigatur olea quæ leniant, laxent, discutiant, qualia multa in doloribus resoluentibus, attrahentibus scripta sunt: affricantur acopa, illigatur lanæ, impinguntur emplastra eiusdem naturæ, quæque omnino contra causam mali depugnet. Malagma Scribonij quod Cathægetæ pharmaco simile est, ad omnem rigorem, conuulsionem, tensionem, contractionem, dolorem neruorum & caninum spasmodum, ad ancyilas denique & ganglia utile est. Bdellij, sepi vitulini, ireos ana ʒ. 2. opopanax, galbani, ammoniaci, cachryos, aut baccarum lauri, vel granorū paradisi ana vnc. 1. piperis grana centum viginti, ceræ vnc. 7. terebinth. vnc. 6. Trita arida cribrantur: quæ succum habent, cum resina subiguntur: cera particulatim fracta in feruentem aquā demittitur, subacta manibus aliis intermiscetur in pila: versantur omnia: sed pilam conuenit subinde perungere oleo cyprino, vel terebinthino, alioue generis eiusdem. Liquefcit pharmacum in oleo, ut sit acopō, quum res exigit. Gan-

*Hippocra.  
aph. 39. li. 6.*

*Malagma  
Scribonij ad  
multa.*

*Ganglia.*

glia vocamus concretiones quasdam & contortion-  
nes ad cartilaginem vel neruum, ex lenta crassa que  
materia, quale neruorum alimentum est. Alij gan-  
glion definiunt tumorem nerui à vi externa, casu,  
ictu, laboribus: nam raro sponte prouenit. Extremis  
membris ferè nascitur: rariùs in cubito, capite & re-  
liquo corpore. Atque hic tumor inæqualis est, re-  
nititur, & in latera pressus diuertit, nec in orbè cir-  
cumagitur.

*Curatio.*

Quibusdã partibus curantur ferro, aliis  
vt pedibus & manibus, non nisi cum periculo cul-  
tro vulnerantur. Ammoniacum ergo ad ignem di-  
latandum manu, molle atque vnguinofum, aut eo-  
rum medicamentorum aliquod, quæ in malaëcticis  
descripta sunt, emplastri temperatura. Calidum &  
ita diductum, vt totum gâglion comprehendat, af-  
figi debet: superdatur plumbi lamina, eaque arctis-  
simè constringenda, alligandaque, vt nullo modo  
ganglium diuertat. Alij solam laminã sine pharma-  
co adalligant. Atque vbi dierum aliquot interiecta  
mora emollitum ganglium videatur, detractò plũ-  
bo & pharmaco statim pollicem dextrum ganglio  
infiges, reliquos digitos in ambitu cõstitues, omni-  
no premes, & quãta vi poteris gâglion vrgebis, do-  
nec solutum diffluet. Hæc quidẽ veterum iam exo-  
leta ratio est. Nostri meliùs: pediculum membrana-  
ceum, glandulas, venarum nouam propaginem vn-  
de gâglion coit augeturque, annotant: viam ferro  
aperiunt, nudât omnia, filo vasa intercipiunt, neruos  
delineant, pediculum, glandulas, venas vnde nutri-  
tur vitium, ligant, siccant, tabefaciunt, vrunt, præci-  
dunt, atque ea ratione quasi radicẽ mali extirpât: vt  
ne postea noua regenerata, suffectaq; materia nouũ

ganglium renascatur. Quanquam hæc curandi ratio non sine periculo est, si quidem & gangliū magnū est, & eo loco, vbi insigniū vasorum neruorumque coitio fit. Subsunt quoq; aliquando putrefacta corruptaque vasa insignes venæ aut arteriæ, quæ nudatæ sanguinē effundunt, quem nemo supprimat: vnde æger paulò pòst extinguitur. Terebinthina, calx viua, adeps anserinus bene temperata gāglion dissoluunt. Aliud quod etiā facit ad ancyas. Cerusæ, olei veteris, picæ ana libr. 1. ceræ  $\bar{z}$ . 2. galbani, ammoniaci ana  $\bar{z}$ . 1. Cerusa oleo coquitur ad puritatē: hīc ammoniacum immittitur, deinde resina & cera: postremò galbanū præmollitū igne. Alij quoq; aliter cōparant. Plura ad ancyas, & quæ conuulsis & gangliis bene faciāt, septimo  $\chi^i$  γέν: quale est Tramyrōn antea notatū ē melle, quod contractis & cōuulsis vtile est: &  $\delta\sigma\omega\delta\epsilon\varsigma$  acopon. Ceræ, terebinthina, medullæ cerui ana  $\bar{z}$ . 1. galbani, ammoniaci ana denar. 6. olei veteris sesquiquilbra: & quæ proximo capite describētur. Atq; hīc terminetur oratio, vbi monuerimus ligamēta duriora, eaque præcipuè, *Ligare ita.* quibus inter se ossa cōingātur, in minori esse periculo. Neque ab aliis metuendū, quæ musculis inferuntur. Vtrūq; genus vulneratū valde siccantia medicamēta perferre potest. Tendonū media natura est.

*De dolore.*

CAP. 3.

**A**ccidunt multa in opere chirurgiæ, quorum remedia aliquot conspersa locis obiter annotata sunt: contra callos, gangrænas, putredines, can-cros, contra vermes, rheumata, & alia. Iam de dolore simul & intemperie atque hæmorrhagia instituenda oratio, à quibus curandi consilia sæpe-

*Doloris cau-  
sa.* numero conturbantur. Dolor ergo omnino fit su-  
bita alteratione & soluta corporis continuitate. Al-  
*Alteratio  
calida & fri-  
gida grauis-  
simos do-ores  
infert.* teratio intemperiem facit elementorum, sed à calo-  
re & frigore dolor acerrimus: à siccitate medio-  
cris: ab humiditate propè nullus vel stupidus exci-  
tari solet. Atque hæc ferè non tam qualitate quàm  
copia doloré facit. Est quum intemperies sola par-  
tem afficit, quæ si inualuit & radicem fixit, ægerri-  
mè percuratur. Est quum collectus humor etiam  
excruciat: acerrimus quidem, vt feruida bilis: & fri-  
gidissimus, vt qui vitreus à Praxagora appellatus  
est. Id quod ad curandi rationem maximè pertinet.  
*Dolor ab  
intemperie.* Atque omninò qui contumacior dolor est, nec fa-  
cilè mansuescit, intemperiem ostendit. In quo sum-  
mopere cauendum erit, ne (quod ferè fit ignoran-  
tia artis) frequentibus phlebotomiis, sæpius reuo-  
catis catharticis cucurbitulis ægros excarnifices: in  
quibus solis summa morborum præsidia medico-  
rum vulgus collocare solet. Primùm ergo quæstio  
habeatur de prægressis & continentibus dolorum  
causis, deinde curandi consilia ineantur: comparen-  
tur remedia quæ præsentibus vitiis, vsui esse videas.  
*Solutio con-  
sili.* Dissoluunt corpus acria, vt quæ corrodat, secantia,  
ferrum, lapis & alia: quæ contundunt, vt obtusa  
quædam corpora, in quæ incurras, aut quæ aliunde  
mota vi maiore corpus appetant. Adhæc quæ distē-  
dunt, vis flatuum & humorū copia: postremò quæ  
vel calore vel frigore vehemèter lædunt. Iam verò  
contraria omnibus querenda remedia: qualia certè  
antegressa causa & doloris proprietas, pars denique  
ægra dolénsque præcipuè indicabunt. Ac dolori  
quàm celerrimè occurrendum, neque committen-

dum, vt diutiùs cruciētur ægri, quibus in desiderio vel magna celeritas mora est. Neglectus dolor labefactat vires, fluxiones attrahit: vnde exarcerbatur, phlegmonæ incenduntur, cōuulsiones rapiunt ægros, ac sæpè mortes: aut certè vlcerata madescunt, quæ sicca esse seruata naturali ratione, & vacua excremētis necesse est. *Ανώδυνα* vocāt *παρηγορικὰ* & *λυσιπρόνια*, quæ dolorē sedent, tenui substantia, primo gradu calida, vel ita temperata, vt familiaritate elementorum naturā partium consentiant: oleum *Olea.* dulce, ætate medium, chamæmelinum, anethinum, è semine lini, althææ, fœnugræci, è dulcibus amygdalis, è lumbricis, vulpecula, meli, lutra, erinaceis, limacibus, & pullis cygni oleo tabefactis: è floribus zambaci, hyperici, sambuci oleo immersis, persolatis, ac subinde commutatis. Oleum extortum è tritico incude & candente ferro, ex ouis pressum, è farmentis vitium: alia quoque plurima, quæ primo libro descripta sunt. Atque hæc omnia tensa, constricta, refrigerata iuuant. Rosaceum lenit, repugnâtq; *Rosaceum.* causæ, vbi à calore dolor, vel à dolore calor cōmotus est. In anodynis butyrum est, æsypus, lana bene succida, suillus adeps, vitulinus, asininus, felinus, vulpinus, mellinus: è cercopitheco, simia, cuniculo, ciconia, catello, sciuro, quo ad auriū dolores Archi *Sciuri adeps.* genes vsus est, Otide, phalacrocorace fortilegarum superstitione, anatinus, anserinus, gallinaceus, olorinùs, ex anguill. & dulcis aquæ piscibus: sed præcipuè humanus. Hæc omnia sunt recētia, bene purgata & conuenienter lota, si quid rancoris, situs, saluginis, acrimoniæ, aut alieni vitij conceperint. Lenit diachylon minus solutum rosaceo & chamæ-



# INSTIT. CHIRVRGIC.

*Malaſtica & peptica anodyna ſunt.* melino. In ſumma, quæcunque coquunt & moderanter emolliunt, doloribus medentur. Sed confectis recens vtendum erit ſolutis roſaceo, vel conueniente oleo. Liquidiora ſunto, ſi quidem cuticularis dolor eſt: non ita liquida, ſi is altiùs cruciat, id quod in anodynorù vſu ſemel dictum ſit. Eo modo parygro recente & tetrapharmaco dilutis roſaceo vtilicebit. In hoc genere mucaggines ſunt è ſemine lini, althææ, fœnugræci, nucleis, cydoniorum, maluæ, althææ, loliorum radicibus, gummi arabico, tragacantha, atque omnino media materia, quæ aliquid medullaceum habeat & vnguinoſum. Colliguntur aqua maluacea, hiliacea, chamemelina. Eſto quadrupla aqua. Semina adcirciter duplam mucagginē efficiunt inieſta aquæ calidæ. Paucum gummi multam mucagginem reddit, quo modo etiam radices, quæ quaſi medulla pingui præditæ ſunt. Iunguntur oleo, quod ſit ſeſquuplum, & ceromatis. Lac muliebre & vaccinum ad dolores facit. In lacte chamæmelum, althæa, malua, melilotum, anodyna ſemina, interanea, pedes, capita hœdorum & veruecū percoquuntur ad inſeſſiones, fatus & balnea. E materia piſta, & butyro, vel paregorico oleo iuncta ſunt cataplaſmata. E farinis hordei, tritici, mica panis ſimilaginei, incoctis ſapa, vinis dulcibus & lacte ſinguntur epithemata, iunctis, ſi lubet, vitellis oui, affuſo roſaceo, reſperſo croci puluiſculo: leniēt hæc omnia & concoquent. Tenella fraxini folia aqua cocta piſtâque, malignis, cancroſis & dolentibus vlceribus remedio ſunt: decoctum in eundem vſum ad fatus adhibetur. In magnis doloribus & vehementer intentis locis affiduè fouendum tepida, hy-

drelæo, interaneorum hædi & veruecis decocto, aliisque generis eiusdem, deinde impingendum cataplasma lene & molle. Gravitas enim, durities, asperitas omnino declinanda sunt. Iam verò in hoc genere pharmacorū vitium est, quòd quæ leniunt, ferè relaxant, fundunt, liquant, vnde in plethora & cacochymia, materiâ calore fusâ locus infirmus dolensque opprimitur, grauius dolet, ampliùs distenditur: sæpè etiam viribus suis concidit, atque enervatur. Ex quo rosarū folia, absynthij summitates, aliæque generis eiusdem commiscēda putant, vbi ad forus, balnea, infusiones, epithemata pharmacum præparatur. Sed hîc astringentibus abutendū non est. Etenim nimia astrictio dolorem auget. Modus *Astrictio.* est, vt inde fluxio molliter reprimatur, contineantur vires, & iustum dolori solatiū adferatur. In balneis dolentes articulos præligari iubent, obstipantque repellente auxilio, priusquam in solium descēdatur. Atque omnino vacuandum prius corpus est, *Virium ratio.* si quidem postulat casus: ex quo ita mitigandus dolor est, vt ne quid inde vires, aut quàm minimū detrimenti patiantur. Sed tum maximè cura virium suscipi debet, vbi aliquid vrget, quod naturæ viribus excludatur: qualis est fœtus in dolore partus, qui vt *Fœtus.* edatur, firmo abdomine, robustis lateribus, vtero valente, cōtentis nervis omnibus matris, suis denique viribus opus habet. Itaque in laborioso puerperio dum laxamus vias, & dolores consolamur, summa ratio virium semper habenda est. Eadem cura sit in calculis & doloribus thoracis, vbi sputum crassius, & suppuratio repurganda est. Atque hæc de iis, quæ reuera anodyna sunt, dicta fuerint: quo-

*Dolorem le-  
niunt.*

rum multa ad ea quæ postea dicentur, referri pos-  
sunt. Itaque genus aliud effingunt, quod sublata  
causa dolorem vincat: quale est oleum laurinum in  
refrigeratis: violaceū calefactis: siccatis hydrelæon:  
sinapismus, ubi pars aliqua humiditate elanguit.  
Adhæc quæ contra copiam & vitium materiæ ad-  
hibentur, ex quo medentur doloribus, phleboto-  
mia, cathartica, clysteres, commansa & naribus in-  
serta, *Ἀγματοσήματα* & *ἐρρηνα* Græci vocant, a-  
pophlegmatismi, *πλάσμα*, hoc est sternutatoria,  
que lachrymas, menses, mariscas emoucant, sudo-  
res eliciant, aliâque generis eiusdem. In doloribus,

*Hippocrat.  
6. Epid.*

inquit Hippocrates, remedia sunt, phlebotomia,  
purgatio, vstio, sectio, sternutatio, calfactio, refrige-  
ratio. At caloris in sedandis doloribus frequentior,

*Calor & fri-  
gus quanta  
teneatur cō-  
trarietate.*

frigoris autem rarior vsus est. Calor enim naturæ  
familiarissimus, quique vim frigoris possit retunde-  
re, & graues æstus partium attemperet. Inimicum  
vitæ frigus est, eoque solum vitimur, ubi intemperies  
calida sine materia est, ut in erysipellate quodam, æ-  
stuante capite, aut alia parte corporis ab ardore so-  
lis, & ambustis. Ac tertium genus, si lubet, statuatur  
eorum, quæ stupefacto sensu dolorem fallunt, quia  
quod doleat, sentire necesse est: & extincto sensu  
dolor necessariò conquiescit. *Ναρκατικά*, *ὕπνω-  
τικά* & *χαρωτικά* talia appellant. Ac de omnibus  
ordine differamus. Calore dolorē sedant, tum quæ  
reuera anodyna sunt, tum oleum laurinum, iunipe-  
rinum. Baccæ macerantur vino, deinde oleum ex-  
tunditur mola, quod coxariis & frigidis articulorū  
doloribus confert. Adhæc galbaninū, sulphurinum,  
styracinum, piperinum, è cinamomo, cardamomo,

*Calida ano-  
dyna.*

nuce

nuce myrepfica & caryophyllis expreffum. Nardinum,coftinum,cnidelæon,finapinum,è fabina, ruta,maiorana,rosmarino,ſaluia,centaurio, enula,iri, gentiana,ariftolochia,bryonia,acoro & alia materia,quæ iam antè capite de reſoluentibus & attrahentibus deſcripta eſt. Oleum terebinthinum è terebinthinæ ſb. i. laterum antiquorum,vel,vt Albu- *Oleum tere-*  
caſis, recentium,(quò plus olei imbibant) ℥. i. anaſti. *binthinum.*  
ches, ſtyracis ana ℥. i. Lateres igniti extinguntur oleo, & infriati cæteris commiſcentur. Capiuntur omnia capsula vitrea, ita reſoluuntur igni. Triplex *Oleum è flo-*  
liquor deinceps effluit, quorum tertius optimus eſt. *ribus roſma-*  
Aliud. Flores roſmarini amphora vitrea includun- *rini.*  
tur,quæ incerato duplici linteo obſtipanda eſt: elicitor oleum calida arena. Oleum philoſophorum, petrelæon de lateribus, Sabininum, & alia permulta, quorum deſcriptio ex Arabum libris petèda eſt. Eiufdem generis eſt oleum ſæcarium, quod de tartaro appellant. Efficaciſſimum baſaminum, quod variè conficiunt. Thuris candidiſſimi, maſtiches ana *Baſaminum.*  
vnciæ duæ, ligni aloës ℥. i. caryophyllorum, galangæ, cinamoni, zedoariæ, nucis myrepficæ, cubebæ ana ℥. i. myrrhæ, aloës, ladani, ſarcocollæ, caſtoreiana ſemuncia, baccarū lauri ſeſquuncia, ireos, ariſtolochiæ rotundæ, dictamni, ſymphyti maioris ana ſeſquuncia: gummi elemnij ℥. 6. terebinthinæ ad pondus omnium: cōcorporata omnia reſoluntur igne in alembico chymicorum arte. Primùm extillat aqua, deinde oleum, poſtremò pinguiſ meligo. Contra omnia vitia & cauſas neruorum valere dicitur. Sunt qui addant aliquid olei roſacei & myrtini, vermes terræ lotos è vino albo, & aquam

# INSTIT. CHIRVURGIC.

illam, quæ folliculis vltimi includitur. Contra dolores & flatus vteri, ventris, coli singulariter facit. Olei anethini lb. i. seminis agni casti, seminis rutæ ana ʒ. 3. cinamomi ʒ. 6. concassata hæc oleo immerguntur, & diebus quadraginta insolantur sub caniculæ ardoribus: alioqui loco tepido ad focum diutius continentur, dum vim materiæ oleum abundè cōbiberit. E decima parte castorei vel euphorbij & oleo remedium comparatur: singulare perfrigeratis. Atque euphorbij magnus omninò vsus est aliosis partibus, quæque doleant, & vehementiùs perfrixerint. Cuidam à genu acerbissimus dolor hyberno frigore commotus est, cui Galenus ceratū quod euphorbium capit, vngēdo loco à balneo instituit: quod cū successisset, dolore protinus cessante, idē remedium prospero semper euentu in aliis perfrigeratis, atque hinc dolentibus particulis vsurpauit. Adhibetur remediū & à balneo, & ante balneum. Sed iam ferè exoleuit lauandi consuetudo, eaque res multis curiosior visa est. Loco eius fouenda pars est decocto meliloti, rutæ, chamæmeli, quæ in vino præferbuerint. In cephalalgis à frigore & hemicraniis, laudatum veteribus auxilium, quod paratur cera, oleo & euphorbio. Ac misturæ ratio superiore oratione abundè notata est. Duplo veteri euphorbio loco recentis vtendum est, postquàm sedulò animaduuerteris ætatem euphorbij, & legitimum ab adulterato satis distinxeris. Alij naturali proprietate hemicranicos iuuari euphorbio prodiderunt, si ex aceto tritum aduersis fronti & tempori illinatur. In eundem vsum drachma recentis euphorbij in ʒ. 3. olei dissoluitur, atque instillatur au-

*Ad dolores  
coli, vteri,  
ventris.*

*Euphorbiū.*

ri. Sunt qui mistis vino tenui, giluo, odoro, & cha- *Mistura vi-*  
 mæmelino oleo omnium partium dolores perfa- *ni & chama-*  
 nent. Radix cucumeris agrestis in taleolas cæditur, *meleni olei.*  
 & cum cauliculis absynthij hydrelæo coquitur. Ex- *E radice cu-*  
 perimento veterum singulariter iuuat hemicra- *cumeris cata-*  
 plasmâ.  
 nias: decocto fouentur partes, materia ad cataplas-  
 ma subigitur. Calidum, vt reliqua, vsurpatur, adhi-  
 bita cura vt ne refrigescat. E sex vitellis assis, myr-  
 rhæ semisse ellebori nigri drachm. granis 4. oleum *Oleum ex*  
 exprimitur ad focum in sartagine, singulari reme- *ois.*  
 dio vlceribus puerorum, & omnino dolentibus cal- *Ad dolen-*  
 lis, putredini, vermiculationi, scabiei. Callis dolen- *tes callos.*  
 tibus styracis vnciæ duæ, vel eo plus in sesquilibra  
 olei diluuntur. Ex asserculis iuniperi, lauri, abietis,  
 ramentis cinamomi, calami aromatici, ferragine li-  
 gni sancti, oleo immersis exprimitur oleum ea arte;  
 quæ primo libro designata est, vel qua è iunipero  
 Mesue, è cinamomo Nicolaus elicit. Diuturnis do-  
 loribus, & qui intus crucient, efficacissima acopa à  
 veteribus prodita sunt. Quorum alia leniora, quæ *Acopas*  
 externis doloribus adhibentur, quale oleum est: a-  
 lia mediocria, quibus etiam compages crassior est.  
 Atque hæc ex oleo, laxante materia & moderatè  
 calida temperantur, adipe, galbano, terebinthina,  
 Colophonia, inueteratis atque internis doloribus  
 accommodata. Tertium genus iam acrius, idém-  
 que corpulentum magis, quod contumacioribus  
 vitiis & in alto corpore latentibus imperatur. Aco-  
 pa duplo, triplo, quadruplo, pari interdum ad reli-  
 qua, quæ solida sunt, oleo permiscuntur. Myracopa *Myracopa.*  
 sola odoris suauitate ab acopis distinguuntur. Ac  
 iam subliciamus formulas, ad quarum instar infini-

*Scopon  
Asclepiadis.*

ta propè acopa comparentur. Maioranæ, rosmari-  
ni, fœnu-græci ana lib. dimidium : fuscilorum lau-  
ri libr. 2. flores iunci odorati vnc. 1. vini veteris, olei  
dulcis ana sesquilibr. stirpes contusæ triduum ma-  
cerantur vino. Sed adhibenda cura est, vt ne hoc  
vapescat: tertio die oleum superiniicitur, coquuntur  
omnia in diplomate moderata pruna. Atque vbi  
vinum expirauit, exprimuntur omnia, vt simul o-  
leum in vas nouum diffluet. Ex quo capitur olei  
libr. 1. ceræ vnc. 2. vel eo plus, vt fiat cerato malag-  
ma. In quibusdam codicibus adduntur radicis cu-  
cumeris agrestis, nardi Celticæ ana libr. 2. quæ cum  
aliis vino maceranda & oleo coquenda sunt. Aliud  
ischiadici, opisthotonicis, & omnibus doloribus  
neruorum vtilissimum. Ceræ selibra, terebinthinæ  
libr. 1. guttæ ammoniacæ in aceto dissolutæ vnc. 1.  
opopanacis vnciæ duæ, galbani, medullarum cer-  
ui & tauri, æsypi ana vnciæ duæ, olei irini vnc. 9.  
mellis. vnc. 3. Cera oleo colliquatur, terebinthina  
additur, deinde medulla & æsypus, reliqua igne  
remollita & cum aliis fusa permiscetur. Quod se-  
quitur paralyticos sanat, & neruorum doloribus  
medetur. Rutæ viridis vnciæ 3. pulegij sicci, cy-  
peri ana vnciæ 3. salis, nitri vnciæ duæ, fœnu-græci,  
mercurialis, succi marrubij, rosmarini, aristolochiæ  
ana vnc. 3. amygdalarum amararum desquamata-  
rum libr. 3. iris illiricæ vel florentinæ, terebinthinæ,  
baccarum lauri, radicis cucumeris agrestis, guttæ  
ammoniacæ ana selibra, ceræ lib. 1. olei libr. 9. vini  
modus controuersus: tamen iusta mensura fuerit  
libr. 12. In quibusdam exemplaribus adduntur sa-  
binæ selibra, ellebori albi sesquilibra, myrti viridis

*Ad ischiadi-  
cos, opisthoto-  
nicos, & om-  
nes neruorū  
dolores.*

*Ad paralyti-  
cos.*

vnc.9. foliorum lauri siccorum vnc.9. bdellij libr 1. quæ si adiicientur, efficacius fiet acopon: sed ita vini & olei demensum augendum erit. Interuntur quæ contundi possunt paulatim affusa aqua: ex quo iterum tundenda sunt: contusis vinum oleumque insperguntur, vt integram noctem madeant: postridie incoquantur. Atque vbi vinum exhalauerit, omnia concepta sacco extringantur, vt eliquetur oleum: cui excolato cera, resina, bdellium, ammoniacum deinceps cōfundantur. E crocino, nardino, enulato, costino, quæ à Mesue describuntur,ingas acopa: condienda moscho, ambare, & aliis aromatibus, vt sint myracopa: cera additur, liquida terebinthina, styrax, galbanum, opopanax. Similiter & ex laudatis oleis, quæq; suauiter oleant. Terrestrem testudinem acuminata canna veteres transfigebant, qua parte ceruix clauiculæ cōmissa est, & inde ducto sanguine acopa perfundebant, eoque meliora putabatur, quò plus sanguinis combiberent. Stanneis vasis, vitreis, plumbeis & buxeis reponenda sunt. Sunt qui mirabilem vim tribuant renascentibus corniculis ceruorum, vbi primùm extuberant, & quasi plumata lanugine integuntur. Coquunt vino, dum mollietie diffuant. Singulariter excitat torpentes neruos, atque paralyticos. Saluiæ, chamæpyteos, maioranę, florum meliloti & chamæmeli ana vnciæ duæ, olei nardini lib.3. vini gilui, tenuis, odori, subausteri sesquilibra: omnia illa vino resperguntur, macerantur nocte, postridie oleum superfunditur, coquuntur in diplomate: consumpto vino diploma subducitur, materia rariore sacco excipitur, vt purum oleum diplomate relinquatur, in quod materia ve-

*Acopa è qui-  
bus fiant.*

*Cornua cer-  
uorum.*



# INSTIT. CHIRVRGIC.

hementer exprimēda est. Postremò oleo misceantur corniculi cerui vt priùs tabefacti  $\mathfrak{z}$ .3. mastiches  $\mathfrak{z}$ .6. croci drach.1. Al. Olei costini, olei nardini ana  $\mathfrak{z}$ .2. terebinthinæ  $\mathfrak{z}$ .1. ceræ sesquuncia, moschi grana sex. Al. Extremitatum ebuli, surculorum lauri & rosmarini, maioranæ, calendulæ, saluiæ, chamæpyteos ana vnc.2. florum chamæmeli, rosmarini & lauandulæ ana  $\mathfrak{z}$ .1. baccarum lauri & iuniperi ana vnc. dimidium, radicis enulæ, ireos, acori, aristolochiæ ana drach.6. pyrethri drach.2. feminis lini, althææ fœnugræci, sinapi, cardamomi, nasturtij ana drach.1. cōquassentur omnia, & noctem integram madeant in vino, postridie coquantur in duplici vase. Atque vbi totum propè vinum euanuerit, omnia magno conatu exprimantur: expresso succo immisce olēi lumbricorum, olei terebinthinæ ana vnc. 4. coquantur ad crassitudinem: in alio vase seorsum liquentur igne molli, olei costini & nardini ana selibra, styracis, galbani, resinæ, terebinthinæ ana vnc.1. opopanacis, Benjeoin vocati ana semuncia, mastiches, sarcocollæ, thuris ana drachm. 2. liquata aliis vniantur, & rursus coquantur puris carbonibus, sedulò versentur spatha. Subducta foco rursus circumagantur, vt paulatim refrigerescant: quod cū fit, aqua miscellanea, quæ odorem moschi rapuerit, respergantur: aque ita reponantur aliosis, inueteratis neruorum causis & profundis doloribus. Ad venena frigida, & inde dolentia præcordia nihil præstantius vino tenui, giluo, acri & odoro: feruefacto vtitur Hippocrates & condito. Alij aromatite, veteres etiam allio & sale: Alexipharmacis, theriaca, antidoto Mithridatis.

*Cōtra venena frigida.*

Nec omittendum nostra memoria vſitatum remedium è ramentis & delimata ſcobe Gaiaci, vel ligni *Gaiacum.* ſancti. Eligatur graue, denſum, vnguinoſum, quod *Probatio.* ad lucernam pingue quid reſudet: nihil expiret graue, *gaiaci.* nō ſit obductum ſitu, arroſum carie, aut euani- dum, quæ vitia ſubterraneis locis non perflātis, vbi diutiùs latet, & à cortice celeriùs, ferè contrahit. Ac dum eliminatur ſcobina, contumax eſſe oportet, & odoro halitu quodam euibrare nares, ſternutamen- tūque cōmouere, guſtu acri & aromatico: quod enim dulce vel acidum eſt, minùs probatur. Recēti ferragine vtendum eſt: expirat enim, & vim amittit vetuſtate. Cæſa ſit materia (ſi quidem reſciri poteſt) ad æſtium ſolſtitium, ætate media, quia tenella arbor crudo humore aqueoꝛque plena: vetuſta verò exucca & arida eſt. Mediis annis plus habet olca- menti, quod in præſentia deſiderandum eſt. Mace- ratur die vno breuiùs atq; diutiùs, vt vel acrius vel clementius pharmacum deſideratur. Meracum co- quitur ad dimidias plus minùſve, & aliis intermi- ſtum, vt ſunt conſilia medicorum, igne puro, fideli vaſe bene operculato, vel quod inflexo tātum cor- niculo foras hianti leniter exhalet. Ac cute quidem *Vi gaiaci.* magis reſiccat: ſumma vis tamen in carne, & intelli- na pulpa pingui, vnguinoſa, ſuauiſſe olēte. Incidit, terget, tenuat, calefacit, ſudorem mouet: quā qui- dem amarum & acrimonia præditum eſt, terreno elemento corroborat: vnguinoſa parte & aërea la- xat, mollit, anodynum eſt. Ex quo frigidis articu- lorum, & neruorum doloribus auxilio eſt, mede- tur tophis. Reliquias quoque luis venereæ partim attemperat, partim ſudoribus extringit: eāſque fre-

quenti exprimento paucis diebus obliterat: de quo iam à multis iusti cōmentarij editi sunt. At suo quisque vtatur modo, eligat, diuidat, maceret, coquat, temperet, exhibeat. Sit aqua sextupla, octupla, decupla, duodecupla. Nam in his omnibus controuersa res est, quā facillè dirimet, quicunque nouit omnia ferè remedia integris viribus multifariam posse deformari, eaque oportere vitiis & corporibus, ætati, cœlo & aliis variè accōmodari. Igitur sua quisque probet, nec damnet aliena. Meminisse tamē conuenit, vt attenuatium omnium, sic huius ligni immoderatum vsum admodum periculosum gracilibus: deinde quoq; iis quibus mediocre corpus est. Hinc enim calor acrior effectus tabem inducit. Eadē ferè ratio Iuncati ligni, Varini aut Synarini, quod recēs cognitū est. Decisis frustulis, alij etiā puluere vtuntur in duodecupla, vigecupla, & eò copiosiore aqua maceratis, & dum pars tertia vel quarta expirauerit in diplomatis vapore, vel clementi igne coctis, cui in vfu quadrantē vini albi, tenuis & odori infundi iubent. Atque hæc in præsentia de medicamentis, quæ calore suo dolorem leniāt, & frigidam intemperiem corrigant. Nunc ad ea trāseundum quæ refrigerent, & anodyna sunt. Duplex horū genus est: alia enim tantū refrigerant, alia etiam stupefaciunt. In primo genere sunt, aqua etiā tepida, oleum conditum rosis, violis, nymphæa, papauere, mandragora, cucurbita, cucumere, alterco, lactuca, portulaca, lenticula palustri, psyllio, polygono caphura, floribus herbæ, quæ primula veris appellatur, & millefolio: & ea omninò materia, quæ reprimat, nec ita astringit. Ex oleis & cera alba cerata fiunt: cera

*Gaiaci vsum  
gracilibus  
periculosus.  
Iuncatum  
lignum.*

*Quæ refrigerando sunt  
anodyna.  
Olea.*

*Cerata.*

mollitur igne, manibus versatur, & immersa aqua modò rosacea, modò violacea circumdeditur. E descripta materia aquæ resoluuntur igne, quæ vocant *σαλάγματα*, colliguntur mucagines, exprimitur *Aquæ, nunc succus*: omnia ceratis permiscetur. Recenti succo *gines succo*. utendū est, quia celeriter acorem trahit, atque corrūpitur. Muccago quoque paucos dies sustinet. In his lintea inculcātur, applicanturque dolenti loco. Subinde commutantur, dum ardor simulque dolor conquiescat Sitque hæc cerati formula. Ceræ albæ *Cerati formula*. ℥.1. olei violacei ℥.3. misceto in vase duplici: subductis vapore ignis mucaginis seminis psyllij sesquunciam coniungito, & affusæ rosacæ semuncia respergito. Sunt qui cerusæ è violacea lotæ vnciam vnam plus minùsve adiiciant. Idem præstant vnguentum rosatum, violatum, papaverinum & alia, quæ ad horum instar cōficias. Nutritū Rhazæ, populneum tum vnguentum tum oleum. Populnei oculi vere collecti pari rosaceo infunduntur, vini paulò plus quàm olei adiicitur, macerantur omnia diebus septem, & quotidie commouentur: octaua coquuntur die mollibus prunis, donec vinū absumat. Licebit quoque caphuræ momentum immiscere. In feruidis doloribus auriū, palpebrarum, mammarum, pedum, manuum, tendinū & nervorum, vtilissimū & inuentu facile Galeni auxilium. *Parabile Gal. remediū ad multa.* Ouum crudum optimo rosaceo permistum. Oribasius cocto utitur & è vino pisto. Alij coctura durum & constans emplastri modo calidū apponunt. *Contra cantharidas & venena.* Æstuosis interaneis à cantharide & venenis lacte utendū præcipit Hippocrates. Reuocādum in mētoriam quod antè dictum est, in ardore graui, ut

# INSTIT. CHIRVRGIC.

feruente erysipelate, parcédum esse oleis, & iis omninò, quæ celeriter flammam concipiant: hoc enim est veteri sententia incendiū oleo restinguere. Optimum est Galeno & antiquis celebratū, quod Asclepiadi tribuunt: laudauit Octauius. Nutrito Rhazæ, quod cerusam capit, finitimū est: facit ad ani vitia dolentia, achoras, herpetas, acrem serpiginem, erysipelata: exasperata pharmacis delinit, extinguit canculos, pudendis & genitalibus cancro, maligno vlcere & dolore læsis, solatio est. Paratur hoc modo. Oleum dulce, rosaceum, myrtinū, demenso nouem vnciarum pistillo & mortario plumbeo tādīu versatur, dum sit strigmentosum ac liuidum. Hic lithargyri & cerusæ vtriúsque tritæ pondo cōiungitur, & vsui in plumbeo vase reponitur. Dolētibus cerebri mēbranis in vulneribus capitis, optimo rosaceo, vel sanguine colūbino, vtrisque tepēribus Galenus vsus est. Semina papaueris, alterci, psyllij, cydoniorū, cucumeris & similia cōtunduntur affusā rosarū aqua, lactucæ, violarū, aliorūque id genus donec fiat quasi pulicula: aquarum loco succus ex alterci, lactucæ & papauerum foliis affundi potest: folia quoque sub cineribus cocta, vel ad ignem emollita & calida adhibita, dolorem sedant. Succi foliorum & capitum papaueris, alterci, cicutæ, violarū, lactucæ, pomorum mandragoræ oleo dulci vel optimo rosaceo infunduntur, diebus aliquot insolantur, & quotidie agitantur: deinde coquuntur blando igne donec solum oleum reliquum sit. Ac sint olei lib. 5. succorum 2. coctis probè permisceatur opij, styra-cis ana ʒ. i. calidis doloribus, phreneticis, cōciliādo somno, fronti, téporibus & naribus illinitur. Psylliū

*Paragoricon  
Asclepiadis  
vsus est mul-  
tiplicia.*

feruida immerfum inflammato oculo applicatur. Ceratum è psyllio aliis partibus dolore pressis atq; *Ceratum è psyllio.* calentibus idoneum est. Cydonia & alia quædam *Asiodus con-* genera malorû, vt persica, hoc modo concoquenda *quendi cydo-* sunt. In ollam nouam aqua diffunditur, subiicitur *nia & alia* focus: malum è figlini ansâ vel aliter suspenditur, vt *id genus.* ne contingat aquâ, sed sublatis vaporibus infumetur, & eo anhelitu emollescat: eximitur cutis, mollita caro & medullaceum corpus tēperanter calens dolenti loco adhibetur. Eadem arte quæ refrigerēt meliùs in diplomate & vaporibus cōparantur. Iam familiare est podagricis epithema Asclepiadis. *Epithema Asclepiad.* Medulle panis similaginei lb. i. incoquatur lacte, dein- *ad podagrâ.* de cum tribus vitellis oui, sesquūcia rosacei subigatur, & drachma croci intingatur. Quòd si asperior *De narcoticis.* dolor est, immisceatur opij soluti sapâ semūcia. Sed ad narcotica nō temerè decurrendū, de quibus hinc sermone ducto disseramus. In narcoticis potentissimum est opium, deinde cicuta, altercum, mandragora, torpedo piscis. Opium succiso scapo & calice *Opium.* papaueris, quasi è plaga, fluit. Sed aliter adulterant. *Probatio opij.* Synceritas probatur odore graui, gustu amaro, leni corpore, denso, graui, candido, neque aspero, neque grumoso, quòdque statim aqua diluitur, & nebulâ facit: in sole statim resudat & se diluit: difficiliùs acceditur, & in lucernis pura nec atra elucet flamma: crebrò extinguitur, & extinctum odorem seruat. Vfus eius vacuato corpore, desperatis leuiorib. *Vsus opij.* auxiliis in ardore graui, intolerabili dolore, acriore sensu, firmis viribus, vel nō ita fractis. Deinde si quidem tenuior & acrior humor est aut spiritus: nam in crassis lentisque humoribus periculosa narcotica,

minùs vbi crassus flatuosusque spiritus dolorem acerbiorē excitat. Interdicuntur pueris, senibus, grauidis mulieribus, & quibus ætate vel morbo calor languidior est. Postremò vbi iam valetudo impatiibilis odium ægro, desperationem medico vitæ attulit. Eoque maximè, vt inde obstupescat sensus, ac solatium ægro, & remedium morbo procuremus.

*Noxa ab opio.*

Quæ vt præster, nouum tamen vitium corpori contrahit, quod postea calidis medicamentis obliterandum est. Nam vel potentius, vel sæpius admotum caliginem oculis & rugas facit, surdastros reddit: deuoratum mortiferum est. Hinc aliæ partes ad motum sensumque torpent, & viribus defectæ excrementis corporis opprimuntur: vt nō omnino absurdè à Diagora, Erasistrato & aliis aliquot veteribus medicis in totum damnatum sit. Sed postea vsus eius non improbatus, & adhibita ratio vt ne noceret, atque aliis pharmacis eius violētia retusa esset. Quidam cremabant olla, dum ruffum & molle euaderet: sed vstrinā vim eius exolescere scribit Galenus. Alij cauo cydonio, & quā pateret, pasta præcluso incoquant. Hæc obiter ne in re lubrica & plena periculi chirurgus cadat, nève quidpiam, nisi maturè & optimis medicis authoribus, moliatur. Diluitur sapa è multo, vino dulci, muliebri lacte, liquore oui: permiscetur rosaceo, amygdalino, oleo è castoreo, dum sit mellis crassitudo: ita plures menses macerari melius est, sed multò magis cum dādum est in corpus. Medicamentis quæ opium caperent, semestribus & annotinis veteres utebantur, ad sextum annum, & aliquādo decimū, asseruabant. Specilli nucleus puro linteolo, lana molli, linoxylo denique circumuo-

*Qui omnino damnari at opium.*

*Quibus diluitur opium, & vtendi modus.*

*Quibus permiscetur.*

luitur, imbuatur pharmaco, tum quàm molliſſimè fieri poteſt, dolori illinitur. Clementiuſeſt miſto caſtoreo, pipere, cardamomo, myrrha, cinamomo, ſinapi, croco, pyrethro, & aliis quæ multum caleſciant, coquant, leniant, incîdât, diſcutiant, quantum videlicet caſus in præſens exigit. Atq; vbi crudelior *Modus miſtura.* dolor eſt, æqualis omniû modus eſt & opij: alioqui dupla, quadrupla, ſextupla, decupla quoque reliqua opio inuenias. Quæ omnia, vt ſæuit dolor, & ſunt corpora, ſumma ratione diſtinguere oportet. Quod vocatur Meconium, languidiuſ eſt opio. Succuſ eſt *Meconium.* contortis prælo, vel cõtuſis in mortario foliis & capitibus papaueris: cui ſi ſemē tritum immiſceas, coquas ad ſpiſſitudinem, & in ſole ſicces, opium habebis. Iiſdem aqua coctis interdum extinguitur quod imbecilliſſimum eſt. Siccatur vmbra, & vt opiū vſurpatur. Alij pollinem ex aridis calicibus papaueris ad ſtuporem miſcetur. Cortex radicis mādregoræ magis narcoticuſ eſt ſua radice. Cicuta ſimiliter & al- *Cortex rad. cic. mandragoræ.* terco vtendum eſt. Torpedo piſcis inde nomen habet, & Græcè *ναύκη*, quæ etiam procul, & è longinquo, vel ſi haſta, virga, remo, harpagine, fune attingatur, inſpirata vi, odore vel aura leui ſui corporis, quamuiſ præualidoſ lacertoſ torpore retinet, & celeres ad curſum pedes alligat. Piſceſ alioſ ſepultoſ *Remedia è torpedine.* limo primū cõſopit, deinde ad eſcā rapit. Exemplum verò ſpōte oblatum, vt alia plurima ad ſalutē hominiſ & remedia medici tranſtulerunt. Viuam *Oleum è torpedine.* torpedinem oleo extingunt, vt ſit narcoticon. Eū hoc quoque mirum quod inuenio. Si capiatur, cū luna in libra fuerit, triduūque aſſeruetur ſub dio, fa- *Ad faciendam partem.* cileſ partuſ facere: poſteà quotieſ inferatur adiuvā-



re: non alia vi fortasse, quàm quòd velut induciis dolorum datis, natura ad excludendum fœtum cõfirmatur: felle quod suo pisce calidius esse oportebat, genitales partes illitæ ad venerem torpent. Viua torpedo subiecta plantis arthriticos in præsentia & in reliquã vitam dolore liberat. Inueteratas pœnas capitis cõsopit. Nigra præfertur: tandiu insistat, donec permeante aura dolor obdormiscat. Noui podagricos, qui sæuiente malo dolẽtem pedem frigidissima perfundant. Alij hybernas reponunt niues eidem remedio. Sed vbi frigore dolor obtorpuir, petrelæo fouent, & paroxysmis liberantur. Arcanum hoc est Albucasis. Bina capita aut plura alliorum cum  $\mathfrak{z}$ .i. opij trita permiscẽtur, & vocato alembico, quod vitreum sit, capta resoluuntur igni, destillat aqua singularis, quæ per se datur de mēso cochleari, aut cum vino internis doloribus. Aliter quoque excolatur sacco subquadruplo iosacchare addito & exiguo cinamomo. Alij opio quadruplã theriacam permiscant, & dant alembico. Cruciatis dentibus aquæ id genus instillantur, infunduntur auribus capte auriscalpio: hinc topica auxilia imbuuntur, insuccantur lintea, quæ oculis & aliis partibus applicant. Alia aqua. Theriacæ vnciæ duæ conditæ enulæ & ireos ana  $\mathfrak{z}$ .i. succi baccarũ lauri & iuniperi, succi betonicæ, centaurij minoris, verbasçi, marrubij ana vnc. 3. florũ nymphææ & violarum, corticis radicis mādregoræ ana  $\mathfrak{z}$ .i. seminis alterci albi  $\mathfrak{z}$ .i. opij vnciæ duæ, excepta alembico artificio resoluuntur: sed meliùs in diplomatis. Veneno lęsis quæ vrant corpus, internis doloribus qui cum febre cruciant, vt prior exhibetur. Diarhodon Nili ad fluxiones acres

*Remediũ podagricorum.*

*Arcanum Albucasis.*

*Alia aqua contra maleficia.*

*Diarhodon Nili.*

& cruciatus intolerabiles oculorum. Rosarum re-  
 sectis vnguibus 3.4. croci 3.2. gūmi arabici 3.1. spi-  
 cæ, opij ana scrupuli dimidiū, vniuntur aqua. Qui-  
 dam è Græcis aucta spica & opio conficiunt, quod  
 in vocato Siefrosato posteritas secuta est. Ac cōsta-  
 re arbitror, vt asperior dolor est, ita conuenire opiū  
 augeri. Initiis inflammationū conuenit hoc colly-  
 rium album. Gummi arabici, tragacanthæ ana se-  
 mūcia, cerusæ lotæ 3.6. opij soluti sapa vel vino dul-  
 ci 3.1. iunguntur liquore oui. Incremētis vtile quod  
 sequitur. Sarcocollæ (vt dicunt) nutritæ drach. dimi-  
 dium, amyli, tragacanthæ ana semuncia, cerusæ lotæ  
 drach. 6. thuris sesquidrachma, opij 3.1. cōficiuntur  
 aqua. Rectè quidem initio, quæ reprimant: incre-  
 mentis etiam quæ leniant, author cōmiscuit. In vi-  
 gore lenientium modus vngendus est. Sarcocolla  
 verò nutrienda, vel si lubet, maceranda hoc modo,  
 vt sit suauissima, siccet, incarnet & cicatrice claudat.  
 Trita igitur dies aliquot maceretur rosacea, cōsum-  
 pta aqua, rubi canini succus affunditur, quem vbi  
 cōbibit, subiicitur lac mulieris vel asinæ: postremò  
 resiccatur illa: puluis vsui est. Mirabile collyrium  
 Alexandri in ophthalmia graui & dolore. Cadmiæ  
 vstæ & elotæ drach. 10. cerusæ lotæ 3.1. scorix ferri  
 vstæ, lotæ, gummi arabici, tragacanthæ ana semun-  
 cia, opij 3. 2. compinguntur è pluuia diluto prius  
 opio è sapa, quod reliquis collyriis cōmune fit. Sūt  
 qui thure addito & momento croci conficiant, vn-  
 de leniēdis doloribus magis cōueniat. Cadmia ve-  
 rò & scoria hac arte comparandæ sunt. Ex his frag-  
 menta parua crudis fictilibus cremātur, donec per-  
 coquantur vasa: hīc metalla extinguuntur lacte, se-

*Siefrosatū.*

*Collyriū al-  
 bum initio.  
 Aliud incre-  
 mento.*

*Sarcocolla  
 nutrita.*

*Collyrium  
 Alexandri.*

*Cadmie &  
 scorix pre-  
 paratio ad  
 multa.*

mel atque iterum crematur, vstaque extinguuntur: transferuntur in mortarium, vbi ex aqua fontis diu versantur, & omninò perpurgantur, arida in pilam repetuntur, volutantur manibus affusa pluuia, postremò sicca teruntur in puluerem, planè diuino auxilio, vbi lippitudo grauis & fluxio acris est, vbi siccanda suppuratio, lachrymatio, & alia. Suaue epuloticon est, & implet carne. In pruritu, vstione & ardore mirificè iuuat captum liquore oui. Asclepiades cadmiâ fractam excipiebat melle, fictile cremabat, quod multis rimis vel breui foramine pateret in vertice, donec è nigro fumus albidior exhalaret.

*Asclepiades  
cadmiâ.*

*Decoctum  
meliloti oculare.*

Atque hæc mistura detergendo & incarnando magis idonea est. In vsu collytia liquidissimè diluuntur liquore oui, muliebri lacte vel asinæ, decocto meliloti ex huius ℥.i. & aquæ ℥.9. vel decem coctis ad tertias. Palpebra molliter attollitur: medicamentum tepidum è corniculo instillatur, vel eodè reuersæ palpebræ sublinuntur, linteolum molle inculcatū lacte & oui albumine superdatur, laxiore fascia, molli, leni, simplici, & iisdem liquoribus insuccata omnia cōtinentur.

*Utendi  
modus.*

*Ad aurium  
dolores.*

Ad aurium dolores opium sapa diluitur, pari castoreo seorsum trito coniungitur, vel certè duplo. In vsu, lacte, sapa, rosaceo vel amygdalino dissoluuntur. Infunditur autem vt reliqua, oriculariis clysteribus, vel auriscalpiis, ὠτεγχίται vocant, ὠτοσλυχίδα. Aliud. Opij soluti sapa, castorei triti ana ℥.i. myrrhæ scrupuli duo, croci scrupulus vnus: diluuntur vt priùs. Alioqui cōiunguntur lacte, sapa, oui cādido, vt sit mellis crassitudo Linamētum molle vel auriscalpium auersa parte obuolutum lana, mistura intingitur, & quàm blādissimè inferitur

inferitur auri. In cruciatu dentium aquæ instillan-  
tur, catapotia induntur cauis. Opij, myrrhæ, styracis  
ana ʒ. 2. piperis albi tusi & cribrati, galbani ana ʒ. 1.  
è vino Cretico vel simili catapotia formantur. Eo-  
dem modo multa cōfinges è pipere, cardamomo,  
pyrethro & aliis triplis vel quadruplis opio. Styrax,  
cera, mastiche, galbanū, terebinthina opio ita per-  
miscantur, vt ex aliis prius coalescat catapotiu, quod  
sexta parte opij diluti sapa imbuatur. Edulca sint &  
odora, bene etiā sapiant, quæcūque mista opio in-  
sinuantur denti, vel corpori inferuntur per os. Po-  
dagricis. Styracis liquidi drach. 2. opij drachm. 1. Al.  
Cerati rosacei sesquuncia, opij semūcia, croci drac.  
1. Al. quod statim dolore liberat. Succi absynthij,  
croci, opij ana ʒ. 1. ceræ semuncia, vnguenti irini ʒ.  
6. vini Cretici vel similis quantū sufficit: cera & vn-  
guentum vnà colliquātur in diplomate, intingun-  
tur croco, opium dilutum sapa coniungitur, omnia  
succo absynthij & vino perluuntur: irini loco ali-  
quo ex descriptis myracopis vtendum erit. Al. Se-  
minis cicutæ desquammatæ drach. 6. croci, opij ana  
ʒ. 1. passi Cretici vel vocati maluatici quod sit satis:  
trita reliqua excipiūtur cērato rosaceo, & passo im-  
bibuntur. Al. Dialthææ ʒ. 1. styracis ʒ. 2. opij scupu-  
li duo, croci scrupulus 1. Ita diluto tetrapharmaco,  
parygro & allis paregoricis, opio subtriplo, subqua-  
druplo, subdecuplo etiam plus minúsue vnguenta  
finges. Conueniunt internis doloribus Asteriacæ  
diacodyon. Philonis antidotus, Requies, Trochisci  
ex electro, trochisci Stellæ, pilulæ de cynoglossō,  
Panacea, Harmonia, & alia de quibus ad medicos  
omninò referendum est. Ac breuiter non nisi sum-

*Ad podagrica  
cos.**Internis do-  
loribus.*

# INSTIT. CHIRVURGIC.

ma ratione narcotica imperanda sunt, vbi intolerabilis dolor est, vbi conficiuntur vires, grauiam animi deliquia incidūt, & à reliquis auxiliis desperatio est. Ac quanquam suus cuique dolor atrocissimus est, sed ei præcipuè, qui natura molli & pusillo animo natus sit, nō protinus tamen subscribendum ægro. Sed ea prius animaduertēda sunt, quàm ad narcotica temerè decurramus. Atque hæc de refrigerantibus & narcoticis. Siccitas aqua tepida, hydrelæo, dulci oleo, tepore balnearū temperatur. Humiditas phlebotomo, cathartico, sinapismis, dropacibus & cauteriis vacuanda est. Atque in hoc etiam genere ponendum esse argentum viuum, quo iam veluti extremo præsidio in lue venerea vti solenne est, satis indicat diffluens illa saluatio & alui profluvia.

*Hydrargy-  
ron, & eius  
differentia.* Hydrargyron vocant, quia liquidum: quatuor olim generibus distinctū, naturali quidē duplici: altero, vt ait ille, vomica liquoris æterni, quodque è venis metallicis sponte diffluit: altero quod exudans in argentariis fodinis cameris hæret, & guttatim coit. Fuit & factitium duplex: alterū è minio, alterum è marmoris ramentis. Iam verò è plumbo quoque eliquatur. Eligatur purū, splendidum, albicās, bene depuratum plumbo: quod iterum repurgandum, excolandum, macerādum, & vt loquuntur, sedulò extinguendum est. Ac dū extinguitur, & aliis intermiscetur, diu vesari, tundiq; necesse est. Extinguitur salua sani hominis, qui neque ore, neque naribus olidū quid spiret, qui nū oleat hircū, qui denique omninò inculpata valetudine perfruatur. Ad hæc terebinthina & inde oleo, vel amygdalino, amaris, detergentibus, tenuantibus pharmacis, quæ

consolentur neruos, maleficis iniuriis corporis, & medicamentis aduersentur. Postremò sedulò miscetur acriter volutando circumagendòque, donec effusum omninòque resolutū in axungiiis, vnguentis, oleis, & mistura quæ lubeat, atque ita periisse videatur, nusquàmque integritas eius appareat. Modus autem ad pingua vt ad circiter quadrupla sint, sextupla, noncupla, euariante ratione, vt est vitiū & corporis natura. Sed misturæ vsusque ratio ex aliorum cōmentariis, qui de lue venerea scripserunt, repetenda est. Contra interna vitia quæ relinquat gydrargyron, lac caprinum multū subinde potum, & subinde reuomitum auxilio est. Vinum quoque, in quo absynthium, hyssopus, oryanū, apij & ormini semen, cacumina centaurij minoris, gētianæ radix, & alia id genus inferbuerint. Mirabile hoc cōtra ea vitia hydrargyri. Scobs ex auro subtilissimè delimatur, & in superiore vino propinatur. Balneis quoque vtendum est, & aqua illa theriacali. Illinēdum corpus oleo, quod è sulphure comparatur. Alia quoque iniuria corpori accedit frictionibus illis, vsūque hydrargyri. Nam dum fricantur ægri, atque inedia, æstuariis, sudoribus, saliuā, profluuiis, graui animi cura, fastidio, vigiliis & doloribus tenuantur, sanies quædam necessariò eliquescit, quæ nisi vel sudoribus, vel aliter vacuetur, suppressa parte aliqua defidet: hîcque mora lentescit mucco similis, tandēque in tophū coit: quod quum sit, acerbissimi dolores interdum commouentur. Eadem rursus aliquādo in perioſtion sese dispergit, intus cruciat, ossa atterit, cariem, nigredinem, syderationem denique comminatur. Constat autē experimento impa-

*Cōtra vitia  
hydrargyri.*

*Tophi gene-  
ratio.*

tibiles cruciatus, qui inde generantur, frustra adhibitis aliis auxiliis impressio cauterio sæpenumerò percurari. At summa vi imprimendum ferrum est, quod omninò igne excandeat: quia videlicet in rebellis vitio quum semel ad crudele auxilium decurrendum est, agere clemēter, & quasi blandiri malo, sœuire est. Sæpè fit etiam quum neque tophus, neque aliud quicquam foras emineat, vt virulēta illa sanies intus delitescat, quæ membranis ossium & nervis insidet, eaque discruciat: vbi cultello faciēda via est, vacuanda materia, & si quid vitij os cōtraxit, candente ferro mali vestigium omninò obliterandum est. Atque hæc sunt cōmunia iis, qui cinabrio vocato, alijsque generis eiusdem infirmantur.

*De Hæmorrhagia.*

CAP. 4.

**N**on è recenti solum, sed & inueterato vlcere sanguis effluit, apertis, ruptis, exesis vasis. Ex arteriis hæmorrhagia periculosior est, deinde è maioribus venis, quas inde αἱμορροῦς vocauit Hippocrates. Apertis adstringentia, ruptis glutinātia, exesis sarcotica & boni succi alimenta remedio sunt. Atque vniuersa hæc materia aliis locis explicata est: verum & hoc loco, quæ veteribus medicis ac posteris ad hæmorrhagias probata sunt, aliqua ex parte referentur. Aperta sunt tum quæ clausulis dehiscant, tum quæ poris atque spiraculis rarefacta sint: eaque iuuant plantago, balauſtia, hypocistis, rhus, omphacium, galla, & hæc magis, si deflagrans igne, austero vino vel aceto extincta sit & intrita, acacia, malicorium, & capitula punicorum, symphyti radix, porrum contusum, polygonum, peruinca, terra sigillata, argilacea, figlina, bolus armena, tha-

*Sanies insi-  
dēs periosio.*

*Remedia  
in genere.*

*Ad aperta.*

*Galla.*

barbari magma, rubigo ferri, lapis hæmatites passæ  
 vuæ nucleus, flos gallij, mentha oxycrato tincta, lan-  
 nugo quæ contoneis, quæq; quibusdā salicibus in-  
 fidet, & quæ ex his paniculæ dependent: fragorum  
 herba, cynosbatus, aqua frigida, vinū astringens, a-  
 cetum, oxycratū & alia quæ in epuloticis, glutinan-  
 tibus & repellentibus prius descripta sunt. Eadem  
 quoque ruptis, & hæc peculiariter cōueniunt, thus,  
 manna, aloë, mastiche, tragacátha, gummi, amydon,  
 gluten, larigna terebinthina, pix sicca, Colophonia,  
 gypsum, farina pistrinalis, cochlea cum domo trita.  
 Horum alia in puluerem trita insperguntur, alia im-  
 pinguntur. Ac ferè meliora sunt quæ emplastica: *Vtēdi ratio.*  
 ex quo in oui cādido, resina liquida, tragacáthæ suc- *Linamento-*  
 co, conueniente mucagine rectè imponuntur. *rum differen-*  
 eadem quoque materia linamenta madent: lina- *tia.*  
 menta verò, vt res exigit, figura cōmutantur, ac ferè  
 omni genere linamentorū vsos veteres in hæmor-  
 rhagiis inuenias. Aliud ergò linamentum in longi-  
 tudinem implicatur, μακρὸν μοτὸν alij λημνίσκον  
 vocāt, quo in profundis vlcerū vasis vti necesse est.  
 Eadem crassiora fingi possunt & tenuiora: quæ si  
 penem referant, illi πριαπισκωτὸς μοτὸς, nos  
 fortasse penicillos appellabimus: quib⁹ in vteri hæ- *Penicilli.*  
 morrhagiis & angustioris sinus vlceribus opus est.  
 His exilia quidē, sed oblonga linamenta in propin-  
 quo sunt, quos vermiculos vocāt: hi vasis hiantibus  
 inferuntur. Est & σφηνισκὸς cuneolus cōtortum li- *Vermiculi.*  
 namentum & implexum angustiore cono, & basi  
 ampliore: hoc naribus inditur, & iis vlceribus, quæ *Cuneolus.*  
 ore quidem latiore patent, sed in sinū paulatim cō-  
 trahuntur. Qui verò μοτὸς ἐλλυχνιωτὸς appella-



tur, non à figura, sed materia nomen habet, fungi genere vel spongiæ, vnde & vulnerarij penicilli & funiculi lucernarij fingebântur. Nunc è mollioribus spongiis, fungorum pediculis, iunci genere quem scirpum vocât, quòdque pro ellychniis lucernariis vtuntur, medulla sambuci, aliisq; id genus loco ellychnij vti licebit. Quæ dum intruduntur cauis, si quidem replicâtur, specillo impelli possunt. Eo modo Heraclides spongia modo sicca, modò in acetû acre merfa vti præcipit in nariû hæmorrhagiis, sed extrema parte alligâda filo, vt tempore reuelli possit: quæ si tenaciùs inhæsit, madefacienda aqua, vt faciliùs redeat. Rursus linamentum aliud  $\sigma\tau\epsilon\pi\tau\omicron\nu$  cõtortum, è materia ita cõtorta & implexa, quales ferè turundæ vulnerariæ cõfinguntur. Aliud genus est  $\xi\upsilon\tau\omicron\nu$  derafa quædam lanugo linteorum,  $\pi\lambda\tau\alpha$  vocant &  $\xi\upsilon\sigma\mu\alpha\lambda\lambda\alpha$  quasi volluras & rasuras quasdam, quæ concerptis ac depexis linteis colliguntur. Atque hæc variè formari possunt, ac sæpe in flocos,  $\kappa\phi\omicron\kappa\iota\delta\alpha\varsigma$  vocant, & tomenta cõseruntur, vnde implent vulnera, sordes extergent, siccât, offarciunt vasa & vicina loca, ex quibus hæmorthagia cõmouetur. Vt ergò figuræ sunt partium & vulnerum, ita linamenta variè commutentur. Iam verò è pilis leporis penicilli, vermiculi, flocci cuneoli cõuenienter fiunt. Et rursus è lanugine illa salicis atque cotoneorum. Asclepiades lanugine utebantur, quæ Platani foliis inhæret: quidam panniculis salignis: alij molliter euellunt quod velut muscus candidus populi foliis adnascitur. Hæc autem liquoribus & medicamentis quæ retineant, insuccantur.

*Spongia*

*E pilis leporis*  
715.

Vermiculus hianti vasi inferitur, floccus eadem materia saturatus superdatur, & alia similiter, vt postulat casus. Tum ligantur omnia iniectis vasi tribus *Deligatio.* ¶ aut quatuor fasciarum orbibus, vel etiam pluribus ad eam partem, vnde profluit sanguis: ex quo fascia ad radicem vasis paulatim adduci debet, vt sursum versus magis magisque adstringatur, & illabentem sanguinē retineat. Tertia die resoluenda lintea sunt, neque commutanda linamenta, si quidem firmiter inhærent, tantūque irriganda pharmaco, & vt prius religanda sunt. Quæ si vacillant, digitus vasi imprimendus, reuellenda turunda, noua omnia de integro repetenda sunt: idque tandiu reuocandum, donec renata carne ac benè stipato vase extra periculum omnia videantur. Aliquādo fit, vbi in superficiem vasa exponūtur, vt digitus impressus sanguinem sistat coacto grumo. Atque is medicamento inungi potest, quod & lentum sit & glutinet. Quod si vas longiùs recessit, specilli extremo lana, linamentum, aut aliquid tale obuoluetur, quod conueniente pharmaco madeat, atque ita inducetur. At si patitur locus, nudatur vena, hamo prehenditur, leniter intorquetur, intercipitur laqueo: aliquādo etiam volsella capta duobus locis deligatur, atque media interciditur, vt extrema in se coeant, & nihilominus ora præcludantur. Id verò in maioribus vasis non caret periculo. Vt nec id quidem res patitur, candenti ferro inuri possunt. Funiculi verò quibus *Cauterium.* religantur, sunt è molli lycio vel serico, sed qui firmiter præstingant, teneant, nec faciliè dissoluantur, aut putreant. Itaque chordis aliquando vtendum erit, sed tenuioribus, quales testudinibus musicis in-

*Vbi magis  
metuitur hæ-  
morrhagia.*

tenduntur: fetas alij vsurpant. In magnis vulneribus, & ea sede, quæ venas insignes habet, profusio magis metuenda est: id ferè intelligi potest ex impetu ruentis sanguinis. Hic ergo maiore cauendum cura: siccis linamentis vulnus implendum est, supràque imponenda spongia ex aqua frigida expressa: aut potius lintea complicata, quæ vocant διπλώματα, & ea manu comprimenda. Quòd si nec hoc modo sanguis acquiescit, & multo sanguine lintea inquinantur, ea sæpiùs commutabis. Et si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehementius ad sanguinem supprimendum est, ideòque quidam id vulnere infundunt. Probanda quoque hæc ratio, cauum concepto linamento impletur, platysma superdatur & diplomata. Hæc verò pulicula potiùs inculcatur, quæ retineat, qualis ex ovo farina gyri vel triticea, & bolo armena parari solet.

*Acetum.*

*Alia ratio in  
metu hæmor-  
rhagiæ.*

Atque omnia fasciis alligantur, quæ madeant oxycrato. In somno & interuallis, in excubiis esse oportet, qui subinde recognoscat, num quid sanguinis per lintea exudet. Sic enim noua consilia capienda sunt, aut solutis linteis noua imponenda. Sed alius rursus metus subest, ne vi maiore & ante tempus retenta materia magnam inflammationem postea moueat. Ideòque scriptum ab Hippocrate, vtile esse crebrò sanguinem fluere ex omni vulnere, nisi sit in ventre. Recognoscendum tamen est, num qua ante vulnus profusio præcesserit. Sic enim profluens sanguis celerius retinendus est. At si ante tempus suppressa materia est, & inde metuitur inflammatio, quod putes superesse, vel phlebotomo, vel aduersa parte fixa cucurbitula detrahes: vnde abeat

*Non temere  
supprimendus  
sanguis.*

metus, & sanguinis cursus reuocetur. Adhibenda quoque partium ratio est: nam quæ natura frigida, exarigues, neruaceæ, quale cerebrum, qualis uterus est, multo effuso sanguine grauius læduntur. Adhuc quæ plurimo spiritu indigent, ut oculus, eo deterius suo munere perfunguntur. Prætereà quibus plurimus calor opus est, ut ventri, quo concoquat, thoraci, quo vitam foueat, larga profusione peius laborant. Itaque tempestiuè claudatur sanguis, iusta ratione leuato corpore, ut phlegmonem prohibeas, resicces vulnus, unde possit celerius coalescere. Atque omni adhibita cura desperatis aliis auxiliis ad ignem & cauteria decurrendum; multo magis si quid putre, rodens, serpens, aut vermiculosum: si eiusmodi locus est, qui faciliè cōputrescat, qualis est sedes, os, genitalia, quique vim ignis sine periculo sustineat, ut qui in carne & sine neruis est. Sed ad hæc non prius decurritur inflammationis metu, quam satis multa materia profluxerit, quam bene purgatum corpus & vacuum excrementis extiterit. Escharotica hoc loco vehemētius adstringere oportet, ut firmam neque deciduam crustam efficiant: alioqui remedia profluuio vincuntur, & excussa crusta maior vis sanguinis erumpit. In remediis laudantur phlebotomia, cucurbitula, sanguisuga, vincula aduersa parte, & *χρὶ εὐθυωρίαν* reuellendo adhibita. Cucurbitulæ ratio ex libello nostro reperenda: de phlebotomia & sanguisugis alio, quod paramus, opere differemus. Purgatio sæpè necessaria, sed tardiùs opitulatur, nisi interuallis & quasi datis induciis hæmorrhagia moueatur. Id ferè fit quum statis periodis humor acris ad partem unde profusio est.

*Ratio partium in sup-primendo sanguine.*

*Ignis & cauteria.*

*Escharotica.*

*Phlebotomia, &c.*

*Purgatio.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

verti consuevit. Atque his ferè remediis adstringentibus, emplasticis, deligationib', funiculis, vinculis, auersionibus, præcisionibus, igne & cauteriis hæmorrhagiæ retinendę sunt. In remediis videndum prius, qualia esse oporteat, quæ singulis partib. medeantur. In hæmoptoicis, qui sanguinem è thora-  
ce reiiciunt, atque omnino vbi longa & anfractuosa via est, quæ medicamentum inuehat, qualis est ad renes & pulmones, adstringens quidē & viscida materia necessaria est. Verùm ne quod adstringit, restitet in via, & quod viscidum est, lentore suo hæreat cursu, aliquid medicamentorum quæ tenuitate partium prædita sint, necessariò miscendū erit. Vbi verò recta via est, aut non adeò inflexa, vt ad gulam, ventriculum, intestinum rectum, vterum & vesicam, eo genere medicamētorum quæ tenuia sint, nihil est opus. In exteriori corpore satius fuerit, vlcus emplasticis obstipari in concerptis linamentis aut turundis: deinde vias intercipere repellentibus auxiliis, quæ scilicet sanguis decurrit. Frigidū enim & adstringens, quale repellentium genus est, vlceribus mordax. Et in iis frigido vtendum, vnde fluit sanguis aut fluxurus est, nō vt partibus quidem adhibeatur, quæ sanguinem reddunt, sed superioribus locis vbi venæ sunt communes, quæ ad vlcus materiæ cursus est. Aliæ quoque partes, vt thorax, & quæ diaphragmati vicinæ sunt, quæ exangues, natura frigide & neruaceæ, frigido læduntur magis. Itaque iam auersa materia, neque id quidem locis omnibus, frigida conuenient. Columbæ sanguis & eo magis pharmacum è thure, aloë, oui candido, & pilis leporis hæmorrhagias è membranis cerebri

*Ratio reme-  
diorum ex  
uatione par-  
tium.*

*Quomodo  
frigida vte-  
dum.*

*Locus Hip-  
pocratis 5.  
apho.*

*Ad hæmor-  
rhagias me-  
ningum.*

*Medicamen-  
tum è thure,*

reprimunt. Thuris partes duæ aloës pars vna, vel *alœ, ono &*  
 eo plus in duriore natura: trita excipiuntur liquore *pili leporis.*  
 oui. E mollissimis pilis leporis vermiculi finguntur,  
 illinuntur pharmaco, & apertis vasis inferuntur.  
 Ex iisdem pilis formatur floccus, qui eodem medi-  
 camento imbuitur, & ita superdatur, vt incumbat  
 vermiculo. In eunucho summam manum vlcus *Historia.*  
 malignum occupabat, secuta profusio: adhibitum  
 hoc remedium, nec eo quidem acquieuit sanguis.  
 Postea verò in totum restitit linamentis ex dilutis-  
 simo oxycrato pressis, subinde irrigatis, ne exares-  
 cerent: id in corporibus sensus actoris fieri con-  
 uenit. Cuidam è vulneratis cerebri membranis lar-  
 giùs profluentem sanguinē acetum cohibuit, quum  
 iam varia genera remediorum frustra tentata es-  
 sent. Loco thuris vsurpatur manna, vt quæ adstrin- *Thur, Man-*  
 gat magis, sed thus *ἐμπλαστικώτερον* pharmacum *na.*  
 reddit. Loco pilorum leporis linoxylo, quod lin-  
 gua Syriaca vocatur Cotton, & memorata lanu-  
 gine cydoniorum bene depexa atque carminata,  
 postremò commodè intorta vti licebit. Spongia *Spongia.*  
 rum hac parte multus vsus est: nam & inde cuneo-  
 los modò siccis, modò aceto tinctos, tum naribus  
 tum vlceribus, quæ sanguinem fundunt, effingi-  
 mus. Spongas forti aceto immergimus, & magna  
 volfella captas in candente lapide volutamus, vt  
 inde fumus sanguinem supprimat. Sic vsus Hera-  
 clides. Easdem alij, sed molles, ex oxycrato pres-  
 sas imponunt. Verùm in eo quod sequitur om-  
 nium veterum medicorum consensus est. Spongia  
 noua, alioqui vetus, sed marina, vel lixiui quer-  
 no repurgata, acerrimo aceto inebriatur: ex quo

inquinatur liquata pice, deinde trito bitumine, galla, vel re simili cōspergitur, atque ita crematur testa figulari clausa,, dum cinerescat. Alij aceti loco taurino sanguine imbuunt : ex odoro vino propinant singulari ope dysenteriiis, menstruis & internis hæmorrhagiis. Datur pulvis in ovo sorbili hæmoptoicis, & iis qui sanguinem vomunt : aridus inspergitur expositis locis, vnde prorumpit sanguis, & emplastificis auxiliis cōmiscetur. Eandē vim attribunt crematis lanis sordidis : vtrūque cinerem in clysteribus dysentericorum iniiciunt. Olla recenti, quæ lato dehiscat ore, copiosa lana includitur, operculum superdatur vasi, quod vel glutino vel figlina terra, alioqui gypso subactis aqua fideliter compingitur: in clibanis & fornacibus largo igni comburitur, dum olla percocta sit : sic enim Damocrates. Ea prius immergi aceto potest, aut contaminari liquefacta pice, atque omninò ita cōparari vt spongia, deinde cremari. Hippocrates absumendis carnis putridis & excrementibus inspergit. Alij eodem auxilio impetigines exterunt. Emplastra sunt gypsum crudum, gyris farinæ, si oui candido excipias. Cochleæ cum suis volutis & saliva cremantur novis fictilibus, cinis sectæ arteriæ inspergitur, & sanguinem sistit. Muccus saliuosus, qui compunctis cochleis & limacibus redditur, emplasticus est, in quo cineres & pulvisculos, qui sanguinem claudat, conuenienter adhibebis. Vitellus oui exassatur, vt in puluerem possit resolui, & hæmorrhagiis meningum cerebri inspergitur. Barbarum quod mirificè sanguinem compescit, vulnera magna, præcipuè capitis, præ cæteris glutinat, fistulis, lacunis, fra-

*Lana sordida adstringens, &c.*

*Cochleæ.  
In hæmorrhag. arteriarum.*

*Vitellus oui.  
Barbarum.*

Ossibus medetur. Bene facit hepaticis & lienosis: citra inflammationem glutinat, nervis, cartilaginibus, & ossibus præcisus remedio est. Cuniculos ulcerum & purgatos sinus coniungit: valet ad canum hominumque morsus. Præstantissimum verò ad sanguinem suppressendum, præsertim in iis qui sanguinem reiiciunt. Nam in aluta pectori, dorso & lateribus affigitur, ac veluti miraculo compescit. Cera, picis, resinę pini, bituminis ana lb. i. manna ʒ. 6. cerusæ ʒ. 4. calchanthi ʒ. 4. opopanaxis vnciæ duæ, olei semuncia, vel, ut aliis melius selibra, aceti sextarius. Ceram, bitumen, oleum, & maiorem aceti partem in olla colliquato, deinde picem & resinam adiecito, quas in minima frustra prius concidito: vbi semicoctum fuerit medicamentum, ollam subducito, utcunque refrigeratis attramentum sutorium purgatum, & ex aceti sextario laeuigatum, siccatumque paulatim inspergito, commoueto ne quid efferuescat. Quum non inquinat pharmacum, ollam deponito, opopanax in reliqua aceti parte (nam maior pars statim initio cum aliis in ollam data est) maceratum immittito: vbi dissolutus fuerit, cernisam & mannam tritas inspergito, & paulatim tepesciendi, curato ut coeant, & nec opopanax, nec manna aduratur. Hic in mortarium transfusa omnia circumagito, misceto, ac tandem reponito. In usu medicamentum æstate quidem tertia die solui potest, si quidem res ipsa atque necessitas postulet: at ferè non nisi quinto detrahitur, ut hyeme septimo. Vitriolum crudum chalcitidis loco miscere licet, & si bitumen defit, pix liquida supponitur, aut mummia *Mumia.* appellata, quam alij humiã vocant, cui in claudendo



# INSTIT. CHIRVURGIC.

sanguine mira vis ab Arabibus medicis tributa est. Concorporatur oui albumine, succo polygoni, plantaginis & similibus. Finguntur inde catapotia hoc modo. Muccaginis, gummi arabici & tragacanthæ collectæ in aqua rhois aut cornorû ana ʒ.2. mummiæ, mastiches ana ʒ.1. sacchari rosacei quantum sufficit: tenentur sub lingua hæmoptoicis: vomentibus sanguinem in sorbili ouo diluuntur. In cruentis dysenteriiis cum decocto oryzæ tostæ aut auenæ, succo plantaginis, rosarum, virgæ pastoris, hordei cremore, in quo tragacantha maduerit, aliisq; eiusmodi clystere iniiciuntur. Commiscentur emplastris, cataplasmatis, & aliis quæ sanguinē cohibent. Dissoluuntur liquore oui, & inde cuneoli apertis vasis & naribus imponuntur, aut floccus inde madidus profusioni obstipatur. Alia catapotia eiusdē vsus. Lapidis hæmatitis, boli armenæ coralli rubri, mummiæ, & in pulmonariis, pulmonis vulpis rescicati ana ʒ.1. seminis vrticæ & cinamomi (vbi medicamenti vim altius penetrare conuenit) ana drach. dimidium: sacchari rosacei semuncia. Iungantur in catapotia ex muccagine tragacanthæ, vel syrupo myrtino. In medicamentis quæ sanguinem sistant, adhiberi possunt trochisci ex electro aut carabe, è terra sigillata; nonnunquam etiam narcotica, quæ soporem faciant, & frigore sanguinem compescant.

*Pilule quæ sanguinem claudunt.*

*Alia pilula.*

*In erosione.*

*Pastilli.*

Hæc, vt alia, diluere & vsurpare oportebit. In erosione vbi vniuerso corpori consulueris, nec aliter mederi datum est, veniendum ad pastillos Andronis, Pasionis, Polyidæ & similes ex quinto de compositione pharmacorum  $\chi\tau\iota$  γένν:  $\theta\pi\alpha\chi\epsilon\lambda\iota\sigma\tau\omicron\upsilon\varsigma$  à retinendo Græci vocant. Sed variè describuntur ab

antiquis. Aliter enim ex Heraclide, Critone, Asclepiade, Andromacho, apud Galenum, Paulum, Aëtium & Celsum, scriptum Andronium inuenias: sed hîc satis sit Asclepiadis formulâ ascripisse, quâquam & hæc variè à posterioribus describatur. Vt Galenus. ℥. cytinorum 3. 10. aluminis scissilis 3. 4. calchanthi 3. 12. myrrhæ 3. 4. thuris, aristolochiæ, gallæ ana 3. 8. in quibusdam adduntur salis ammoniaci 3. 4. Pulvis fit ex omnibus, qui excipiat austeri vino. Polyidæ, qui & ab iisdem posterioribus medicis aliter atque aliter conficitur. Hoc modo ex Asclepiad. Gal. Malicorij 3. 6. myrrhæ 3. 8. aluminis 3. 5. thuris 3. 4. calchanthi 3. 3. fellis taurini 3. 6. vino dulci aut passo excipit: ad hæmorrhagias austeri vino excipi potest. Pasionis. Squamæ 3. 12. æris vsti, salis ammoniaci, aluminis, æruginis, thuris ana 3. 8. reliquis in sole tritis ex vino vel aceto thus additur: pastilli forma in usu aceto diluuntur. Atque hi pastilli eò lubentiùs additi sunt, quia in plurimos usus chirurgi conuertantur. Recetibus vulneribus, putredini, cariei ossium, fistulis, auribus purulentis, ozænis, ossibus corruptis, vulneribus nervorû, nomis, phagedænis, callosis anirimis, pterygiis, excrescenti carni, inueteratis vlceribus, dysenteriiis, aliisq; plurimis vitiis medentur, in quibus validè siccare necesse est. Soluuntur vino dulci, sapa, ænomelite, vino albo, fuluo, aceto, aqua, oxymelite, oxycrato, melicrato, succis myrti, solani, cichorij, polygoni, austeri vino, oui candido & aliis id genus. Eligendum autem quod diluas, ut res in præsentia & corporis natura postulabit. Dulcibus, si temperanda astrictio: austeris & acidis: si prohibenda putredo & siccada

*Polyidæ.**Pasionis.**Ufus pastillorum.*

fluxio est: iis quæ detergeat, vbi & sordes est, quam detergeas, & sanies, quam exhaurias. In hæmorrhagia autem aceto, oxycrato, austero vino, succis quoque memoratis dissolui debent. Ac primùm quidē vbi vehemens hæmorrhagia est, validè astringentibus materiæ impetus retundi debet, quibus paulatim pastilli commiscantur: postremò solis pastillis vtēdum erit. Sunt & quæ sequuntur, celebrata veteribus medicamenta, quæ quia sanguinem supprimerent, ἰχθυαῖα appellarunt. Chalcitidis ʒ. 16. alij 8. mannæ ʒ. 12. terebinth. frictæ & aceto extinctæ ʒ. 12. trita omnia insperguntur locis vnde profluit sanguis: quāquā & succis, & liquoribus, & gummi compingi possunt. Datum Ario à Dioscoride Tharsæo mirificè sanguinem sistit. Chalcitidis ʒ. 8. mannæ ʒ. 16. contunduntur, cribrantur, & mista in pyxide ærea reponuntur. Vbi vsus postulat, gypsi crudi triti par modus commiscetur. Heraclydæ. ʒ. malicorij acidi ʒ. 3. aluminis ʒ. 4. chalcitidis ʒ. 1. teruntur omnia in linamento tortili, naribus induntur & locis aliis vnde emanat sanguis. Aliud. Chalcitidis ʒ. 6. mannæ ʒ. 2. terebinth. Colophonix ana ʒ. 4. Adduntur his ad crustas calchantum, misy, auripigmentum, sandaracha, calx viua. Debilior crusta à calce viua & auripigmento, nisi astringenti materia cōiungantur. Ferrum candens igni, æs, aurum & argentum cauteria sunt. Sed ab auro & argento mollior eschara relinquitur. Celerius auxiliū à ferro cauterio est. E subere vel spongia orbiculustenuis feruida pice immergitur, & ita calens hæmorrhagiæ appingitur, Alij malicorio, galla, radicibus astrictoriis prius ignitis crustas efficiunt. Recentiorum

*Escharotica.*

*Cauteria.*

rum escharotica sunt vitrioli Romani semuncia, balauustiorū vncia 3. aluminis 3. i. fiat puluis. Aliud. Colophonie 3. 3. boli armenæ sesquūcia, mastiches, olibani, sanguinis draconis ana semuncia, symphyti rosarum ana drach. i. sed hoc *ἱχθυμῶν* potius quàm *ἐξαπολιμῶν* dicatur. Utuntur supprimendo sanguini puluere rubro, sanguine draconis, & aliis de quibus antea. Plura verò escharotica ex proximo capite repetenda. Vitriolis autem crudis vtendum est, si crusta fiat: vltis & acerbo succo tinctis, si aliter sistendus sanguis est: vltura enim astringendi virtus exoluitur. Adhibitis remediis membrum ita collocari debet, vt altior sit locus, vnde hæmorrhagia; reliqua parte quæ radici venæ propior est, & veluti resupino vase & decliui quasi deorsum refluat sanguis. Si vulnus est in extremo femore, qua parte genu est, hoc quidem superius esse oportet, vt femur totum, quæ inguem spectat, paulatim summittatur. Sit membrum in quiete & ea figura situm, in qua plurimùm conquiescat, nec doceat, ac mitella cōfirmare manus & puluino crura melius est: æger quoque aduersa parte decumbat. Instituatur vita vnde sanguis acquiescat: aquæ potus & similia: interdicitur iis vnde efferuescat, qualia vina quædani sunt, fortia & calida alimenta. Ac tum præcipuè hæmorrhagiæ cauendum erit in vlceribus, quum hæc intus exultant, natura, quæ in arteriis est commota foras, vt vitium quo premitur à se repellat. A forti in vlceribus pulsu, inquit Hippocrates, profluuium sanguinis. Sunt qui in hæmorrhagiis na- superst. liosm.  
rium, quod in commentariis veterum scriptum inuenias, profluente sanguine nomen ægri hominis

& alia quædam plena superstitione in fronte scribant. Alij granum salis aduersæ auri inferunt, manumque frigida immergunt, atque ita sisti sanguinem multa experientia profitentur. Nec desunt qui idem promittant admota vrtica, quam Græcam vocant, cum sale ex aceto trita. Nonnulli vtuntur mille folio. Quidam porrum præcisissimis summis foliis naribus admovent, & inspirato habitu sanguinem cohibent: linamenta porri succo imbibita naribus immittunt.

*De Pyroticis*

CAP. 5.

**S**atis factum arbitrabor institutæ rei argumento post adscripta remedia, quæ parantur igne, & eo genere pharmacorum, quæ inde πυρωτικά nominant. Quorum vt memoria superiore oratione sæpenumerò facta est, ita & plurimus vsus incidit: ac de iis oratio deinceps connectatur.

*Duplex vsus pyroticorum.* Itaque duplici ferè ratione iuuant: nam vel eo adhibentur, vt vitam parti restituant: vel euincant vitia, quæ nullis aliis auxiliis expugnentur. Ac prius veteri sententia decretum est, quæ non sanant pharmaca, sanat ferrum: quæ nec ferrum, sanat ignis. Atque commune hoc consilium est in omnibus quæ nulla alia ratione possint sanescere, vt vel vastentur igne, vel ferro peramputentur. Ac primùm quidem medicamento curæ periculum facimus quod clementissimum est, deinde ferro exscalpimus, lacramus, compungimus, idque paulò durius: postremò acie refecamus, vel delemus igne. In quo austera quidem & aspera curatio est, & veteri sermone, **MALA MEDICINA** est, in qua aliquid naturæ perit. Sed crudelem medicum necessitas facit: verùm

*Sententia  
veterum.*

crudelitas blanda oratione quasi veneno leniri debet, & fabulis occupato egro, stupefactoque sensu exercenda est. Eadem quoque seueritate vtimur in quibusdam notis & tuberculis, quæ pudenda corpori excrescunt, & partibus nudis adnascuntur. Medicamenta ergo quæ aliquid corpori detrahunt, ea *Medicamenta pyrotica.* vel extergent atque discutiunt, vel latente igne depascunt. Quæ verò languentem vitam partim calore, partim spiritu recreent, blandiora sunt, quàm vt exurant. In quo tamen genere reperias quæ ruborem moueant, quæ bullas excitent, quæ denique (si quidem diutiùs immorentur) tandem exulcerent. Atque hæc omnia, vt res & casus postulat, accommodanda sunt. Sunt igitur pyrotica *Pyroticorum genera.* *δρώπαξ, σινηπισμός, φοινησμός, καθαρετικά, σηπτικά, ἐχαραωτικά,* ignis denique, & inde cauteria. Dropaces picationes vertunt, non è verbo quidem, sed *πιττωτὰ πίτωνα,* & *πιτλώσας* veteres appellarunt, vnde Latina vox conuersa est. Alij etià *δροπακισμός*: è pice & quarta vel quinta parte olei, quibus subduplum, plus minùsve piperis, & pyrethri, euphorbij & similium misceri possit, vnde meliùs calefacit, vt accepto sulphure, cinere sarmentorum, & sale siccando magis conuenit. Sic enim permisceri solent: quia tum dropax, tum sinapis, adhuc *Vfus dropacum.* phænigmus eò sunt, vt refrigerata calfaciant, cõfirmantque partes, quæ partim frigore, partim assidua fluxione elanguescunt. Atque hîc siccandum magis: in frigore qualitas ignis augeri debet. Alia quidem possunt plurima, hîc tamen præcipuus eorum vsus est. Et hæc in genere *μετασυκριτικά* veteres appellarunt, quæ videlicet exuccas, aridas & propè ex-

# INSTIT. CHIRVRGIC.

tinctas partes pristinae naturae reddant, & ut ita dicam, recorporetur. Alutæ dropax impingitur, vel linteis complicatis, quæ πλύσματα & διπλώματα Græci vocant. Deglabratur cutis eraso pilo: dropacismus calens inducitur: idem subinde reuellit, priusquam refrigescat. Reuocatur pharmacum, dum inde efflorescat locus, & leniter extumeat. Nimum est, cum immoderato usu pharmaci qui tumor prius extitit, idem subsidet, & qui erubuerat locus exalbescit. Hoc enim volumus, ut dropacis ope reuocata anima, pars quasi mortua reuiuifcat, calorem suum ac spiritum recipiat, & iam proprio alimento perfruatur: postremo etiam corporetur, quæ confecta macie intabuit. Verum alia tardius, alia celerius vitam recipit. Quæ breui rubet & ignem concipit, ea celeriter instauratur: tardius autem, quæ ægrè recalescit. Desperatio est, quum neque frictione, neque perfusione & fotu tepidæ, neque dropace melius coloratur. Aliis satis fuerit, si tribus aut quatuor diebus adhibeatur dropax, nec id assidue quidem, sed vno die: bis hyeme, semel æstate. Aliis bis terve singulis diebus, nonnunquam rarius, tertio scilicet vel quarto quoque die affigitur, ut videlicet vel facile cedit, vel contumax languor est. Ac tepida prius fouisse confert, vel sinegmate affricasse, quod aliquid thapsiæ, emphorbij, piperis, pyrethri, radices capparis exceperit. Alij perfricant sabano, hoc est asperiore linteo, panno cilicio, vel simili, qui asperioribus fetis contextus fuerit. Accommodata quoque folia ficulnea, pumex, os sæpiæ, squatinæ corium, aliaque plurima, quæ asperitate ruborem trahant. Hæc autem iis qui ægrè reficiantur, & pluscu-

*Modus utilis dropacis.*

*Signa utilia dropacis.*

*Frictio.*

lùm refrixerint. Ac tum quidem dropax affigitur: qui si pertinaciùs hæret, quo iam tempore detrahitur, tepida foueri debet: quem cùm detraxeris, furfurum decocto, eaque materia, quæ partim leniat, partim extergeat, locû fouebis. Non absimile dropapicipinum oleum, quod *πασέλαρον* quidam appellant, è pice liquida mistum & oleo. Contra glabreta & caniciem veteres vsi sunt. Sinapismus paralyticos, coxarios, podagricos, inueterata rheumata, hemicranias, quæque caloris inopia laborant, adiuuat. Caricæ vno die macerantur aqua, nonnunquam cappares, si grauius malum est: in leuiore casu & sensu acriore panis triticeus, multoq; magis, si in solam superficiem agere oportet. Iam verò macerata materia contundi debet. In leni sinapismo, subduplum sinapi: in mediocri, æquale permiscetur. Acrior est, qui duplum recipit. At sinapi subtilissimè læuigandum, & quo tempore vnà cùm reliqua materia pinsitur, affundenda aqua, in qua caricæ illæ vel alia maduerint. Sūt in veteribus qui acetum prætulerint: alij aquam, quòd experimento didicerint sinapi vim aceto exolescere, cuius rei authores sunt Galenus & Oribasius. Eodem modo quo dropax vsurpatur. Si quis dolor aut feruor à medicamentis extiterit, tepida rosacei fotu, illitu cerati rosacei, cerusa ex aqua rosacea pista, & aliis generis eiusdem extinguitur. Phænigmus rubore facto etiam vesicas mouet & exulcerat, vt ad eorum genus referri possit, quæ quia illita exulcerant, vocantur *ἀμυκλικὰ*. Ex nasturtio, sinapi, radice enulæ, bryoniæ, lepidio, columbino fimo, caprillo stercore, vnde *Ἀγκοσπαργίας*, aceto pistis. Adhæc

*Sinapismus.**Vsus.**Materia sinapismi.**Confectio.**Vt in aceto, an aqua vsendum.**Phænigmus**Materia phænigmi.*



# INSTIT. CHIRVURGIC.

scylla trita, tunicis alij & nucleis, cātharide, vrtica, pulegio, ranunculis, tapfia, euphorbio, tithymalis, fæce vsta, metallis acribus, lacte ficulneo. Lac ficulneum ante maturitatem pomi excipitur, siccatur vmbra: vulnera aperit, & cum axungia exerit verrucas. Quædam concepto igne eadem præstant, qualis est lana sordida bene carminata: admouetur igne dum vehementer incaleat. Assæ carnes, & diuisa oua similiter assata vtrâque calida imponuntur. Reliqua verò, quum vsus est, visco, melle, axungia vetere, terebinthina, cerato, acrioribus gummi & resinis, sapone, vt res exigit, & corpora vel mollia, vel dura sunt, excipere oportet. Alia quæ friabilia sunt, affricantur: emplastra verò imponuntur loco, qui priùs palpatur manibus, exercetur ferulis, aut asserculis euerberatur: affricatur etiam, vt laxatis spiraculis medicamenti virtus celerius penetret. Anacardia trita septem diebus macerant aceto, in eodem coquunt: dum tertia pars aceti euanescat: refrigerari sinūt, excipiūt cōcha quod enatat oleosum. Id mel anacardinum est. Quidam eadem ratione macerant coquuntq; ad dimidias, per linteolum excolant, traiecto succo mel adiiciunt atq; ita coquunt ad crassitiem: anacardia verò cocta in vmbra siccant, & ad smegmata reseruant. Alij anacardos cōquassant, sepeliunt melle, dum hoc vim anacardij satis conceperit. Licebit etiā anacardia & hermodactylos in puluisculum terere & affricare, excipere sapone & aliis. Fermentum aceto tinctum anacardino melle & causticis concorporatur. Puluisculus è sinapi, piperis, euphorbij ana drach. i. infricatur, vel exceptus anacardino melle illinitur:

*Lac ficulneū.*

*Viēdi ratio.*

*Mel anacardinum.*

& in sapone imponi potest. Sapo in causticis iure numeratur ab eo qui libellū scripsit de materia simplicium, quem falso attribuunt Galeno. E seuo bubulo, caprillo, veruecino, hircino, & lixiuio è calce, quod postea describemus: acriter relaxat, sordes corporis extergit, exiccat similiter nitro, mittitur in caustica. Aliis quoque rebus additis modò clementior, modò acrior parari potest, ut magis minùsve siccet, calfaciat, extergeat. Nam quod capitellū vocant, unde saponem cōficiunt, tum mollius tum vehementius licet effingere. E ficus, ranunculorum, tithymalorū cinere fortius est: mitius autem è vulgari & v̄sitata materia. Adduntur sales, pyretri radix & capparis: adduntur acria unde vis saponis intendatur. E sebo vetustiore efficacior est. Quòd si recēs vsurpatur, & eluitur, & acria detrahuntur, moderatior sapo cōfici potest. Cantharidum pars ferè vna, *Cātharides.* & ad circiter quatuor partes axungiae vnà contemuntur, post septimum diem molli pruna concoquuntur, colantur, & ad phœnigum reponuntur. Ab horum plurimis breui tēpore rubor fit, deinde bullæ excitantur, vlcus etiam, si diutiùs institerint. Vesicæ configuntur, humor exprimitur, relinquitur vlcus per quod vitium omninò repurgetur: hac arte coxarij, podagrici, hemicranici, cephalalgici sæ- *V̄sus phœnig-  
morum, qui  
exulcerant.* penumerò releuantur, repurgantur viscera, atque omninò corpus sordibus & excrementis liberatur: sexcenta denique vitia vetusta, cōtumaciâque percurantur. Verùm maturius detrahendum pharmacum quàm existant bullæ, si tantū vita calorque re- *In tabidis &  
refrigeratis  
partibus.* fouetur: quia sic exhauriant, quod ad redintegratio-

# INSTIT. CHIRURGIC.

*Do genera calfaciētium à substantia perfrigeratae partes quomodò resouende.* pus calfaciāt, duorum sunt generum: tenuiora alia, alia verò crassiore natura. Tenuioribus vtendum, vbi celerrius excalefaciēdum corpus, quod recens inalsit. Crassioribus locus est in iis partibus, quibus paulatim calor elanguit, quia videlicet hinc tardius quidem calor corpori infertur: exceptus autē longiùs persistit. Tenuiora celerius permeant, sed inde fugax caliditas, & quæ paulò pòst dissoluitur. Tenuia sunt piper nigrum, albū, sinapi, & quæcunque tusa in pollinē faciliè resoluuntur. Crassum est zynziber, & huic proximū piper longum, quæ non ita faciliè infriantur. In perfrictionibus vñtatum Gale-  
*Ceratum.* no ceratum *ἔνϕορβίον* ex oleo tenui & calido, recenti euphorbio adiecta cera: de quo iam antè libro primo capite de neruis, & dolore abundè disc-  
*Catharetica.* pratum est. Catharetica sunt æs vñtum, ærugo, squama æris, alumen crematum, puluis mercurialis, testa & terra furnaria, testarum, concharum, ranarum, panniculorum, rerum causticarū cinis, alia quoque in epuloticis descripta. *Νεμόμενα* vocat Hippocrates quæ excrecentem, putrem, callosam carnem exedunt. Sunt qui horum loco suctu longo, dentibus, pinna detrahant. Alij vinculis iniectis tabefaciunt, *ἀναβρογχισμὸν* veteres appellant. Quidam nouacula excindunt, vel absument igne. Vbi verò profundius malum est catharetica, *Ægyptiacum* & alia, aqua siccate & tergente, eiusdémque potestatis liquoribus dissolui cōuenit. Oleum quod è vitriolo exprimitur siccando & exterendo efficacissimū est. Tubuli plumbei illiti medicamento conueniente: aristolochiæ gentianæque radix, sponsia similiter illita immittuntur. Candelæ cereæ mista materia ca

thæreica confinguntur atque introducuntur. Fistulæ argenteæ aut plumbeæ locis aliquot quasi fenestris peruiæ conformantur, quâ medicamenta iniicias: vt qua parte peruiæ sunt, medicatus liquor diffluat, & vitium attingat. At hæc nō nisi cum periculo perferat nudatus neruus aut spiramēta vasis quæ in partem læsam definant. Pforicon in melle, Ægyptiacum, vitriolum, arrhenicum, sandaracha, arrhenicum in axungia. Atq; hæc subiigecupla ferè sunt ad mel & axungiam: nasturtij & veratri albi par modus in pollinem resolutus. Quod sequitur ozænas, ægylopas, polypos & corrupta ossa sum mouet: sordidis, putridis & serpentibus vlceribus exceptū linamento & cum melle imponitur. Lamponis est veteris medici. Ex ære rubro nec sæpiùs conflato scobem colligimus, eiusque vnciam capimus, salis ammoniaci vel vulgaris torrefacti ℥.2. & tantundē ammoniaci, aluminis ℥.3. aceti accerrimi libr.4. & semiss. Arida teruntur, aceto perfunduntur in vase ex ære rubro. Excoquuntur omnia, & pistillo ex eodem ære circumagūtur. Alioqui in ardore solis sub canicula continentur, versantur sæpiùs donec pharmacum exarescat: hīc in mortario iterum conquassantur, & in puluerem minuuntur. Hęc in melle adhibentur, insperguntur cauis, & naribus inspirantur, vel per fistulas insufflantur. Hęc ferè in superficiem agunt, excrescentē carnem complanāt, inutilem adimunt, leniter arroduct, atterūt, verrucas, polypos tabefaciunt, absumunt putria, pudenda denique faciei tubercula resiccāt ac detrahunt. Ære vsto

*Lamponis ad  
polypos ser-  
pentia vlcera  
remedium.*

*Cathartici  
vrsus.*

*Æs vstum.*

attritum colorem minij referat vel cinabaris Cum

# INSTIT. CHIRVURGIC.

pari modo sulphuris & salis fictili crudo inuritur, donec vas ipsum percoquatur. Spiramēta vasis circunlinenda sunt & obstipanda creta figulari vel argilla, ex quo fornaci omnia committi debent. Quidam pro sulphure alumen indunt: alij aceto solo sine aliis respergunt. Vstum cōterunt, ac ferè lauant, sed minori effectu quàm vt cathæreticon habeatur.

*Æs vstum  
seplasiarū.*

Vstum verò & elotū præstantissimum ad cicatrices remediū est. Quod seplasiæ ostendunt durū, nigrū, solidum, crustaceum, longè recedit ab ære vsto veterum.

*Lana sordida.*

Conuenienter cremandum est: nam & supra modum vstum nigrū euadit. Lanæ sordidæ obstipantur olla, quæ & cruda sit, & ore ampliore. Ea impleta lanis, figulari terra, gypso, glutine sedulò obfignanda est, vt nihil hiet, nullis expiret rimis: ita fornaci data percoquitur. Succida lana ita cremata flacidis carnibus respergitur, eāsque liquat. Ex antimonio cremato, cathæreticus cinis est, qui etiā absumit cancos.

*Antimonij  
cremati pulvis  
cathæreticus.*

Quod ex eo & sublimato oleum elicitur, quódque è calce viua, vitreolis, alijsq; generis eiusdem, feruentissimum esse cōsuevit. Hippocrates siccatum salem subduplo melli mistum vrit olla noua, puluerem excrefcenti carni aut putridæ inspergit, fasciam arctiùs adalligat, vt vis medicamēti altius impellatur: id aliquoties repetit, perfanato vitio locum aceto calido eluit. Admodum acris est pulvis qui sequitur. Sandarachæ, arrhenici, chrysocolle ana: humidiora vlcera resiccat, maligna curat, excrefcentem carnem detrahit: exceptus melle cremari potest, vt tenuior euadat & minùs affligat: etenim tenuitas partiū efficit, vt vis ignis minùs mordeat.

*Olea calidissima.*

*Pulvis acris  
Galenij.*

Septica cathæreticis acriora sunt, exedētia ver-

*Septica.*

tunt, aliùs penetrant, tenellam carnem tabefaciunt calore multo, non ita crasso corpore. Arrhenicum, *Materia septicorum.* sandaracha, dryopteris chrysocolla, pityocápe, acornitum, sanguis equi admissarij: sed hæc ferè cum catharteticis permiscuntur. Nam hæc acriora septica *Escharotica.* sunt. Escharotica vt nihilo plus calcât, rodunt tamè acrius crassiore materia: eâque duris & callosis corporibus cõueniunt, vt septica mollioribus. In escharoticis calx viua, hoc est recens, nec cõsperfa aquis: vini fax cremata & aceti, quæ secundũ mensẽ nõ superat. Atq; omnino septicis iuncta adstrictio, quæ *Vsus septicorum & escharoticorum.* acrimoniã non eluat, crustam faciet. Vtriusque generis septicorũ & escharoticorum vsus est in solutis vlcerib. quæq; nimio humore fluât, putrilaginosi, depascentibus, & vbi ex intẽperie partis ad cicatricẽ non veniunt. Escharoticis peculiariter vtimur in *Escharoticorum proprius vsus.* cãcris, carbunculis, hæmorrhagiis: sed paulò antè q̃ hæc adhibentur, frugalis vita, frigida liberaliter pota, vini abstinẽtia, alimẽta refrigerãtia, multò magis vbi febris vel iã subest, vel in metu est, instituuntur. Neq; priùs ea ratio vitæ cõmutada, quàm vis ignis *Cautio.* omnino acquiescat. Frigida quoque cõtinetur ore, si naribus genus hoc remediorũ immitti debet. Contingit aliquãdo vim causticã dilui, quia ea parte, cui inferitur, multus humor, isq; frigidus & aqueus, colligitur: hîc ergo remedij potentia augenda est. Est quũ vim ignis aliùs penetrare oporteat, quæ tamè obiter retũdatur, quia nõ ita aperta via est, atque ita restitãs medela sensim elanguescat. Hîc ergo si nihil prohibet, via ferro facienda est, & inrò cõpellenda remedia in eũ locũ, qui igne affligẽdus est. In expositis partib. regio quædã circũscribitur nucali testa,

# INSTIT. CHIRVRGIC.

umbilico è cera factò vel re simili, quæ suis marginibus constans pateat in medio, qua scilicet ignis summittatur. Aliquando etiã vbi latiùs explicanda medela est & amplianda crusta, escharoticon nucis alueolo includitur, vt totum vëtre[m] eius compleat, atque ita imprimitur. Eadem ratio in aliis machinis, quæ vel angustiore ambitu, vel ampliore ventre confingi possunt è cera, lignis & radicibus. Alioqui emplastrum paregoricon in platysmate extenditur, platysma meditullio decussatur, qua escharoticon pharmacum inferas. Rursus aliud platysma escharotico superdatur, plagulæ quoque & fasciæ adalligantur quæ contineant. Atque hæc oui candido & rosaceo mistis inculcantur, totâque vicinia linteis constipatur, quæ in eodem liquore oui & oleo inquinaueris. Septon. ℥. sandarachia, auripigmenti ana ʒ. 2. calcis viuæ, manne, thuris, aristolochia ana ʒ. 6. pumicis, resinæ, ana ʒ. 4. iridis ʒ. 2. teruntur omnia. Al. Arrhenici lb. 1. calcis viuæ ʒ. 2. diebus triginta in aqua merfa tundere oportet, idque in sole, aut certè igne: bis quotidie aqua mutanda est: ficcatur pharmacum, & vsui reponitur. Aliud. Sandaracæ, auripigmenti, calcis viuæ, pumicis ana denar. 4. eadem macerantur arte. Al. Squamæ æris denar. 4. sandar. denar. 2. elleb. nigri, aluminis, al. auripig. ana denar. 1. læuigatis vtitor. Aliud. Squamæ, sandaracæ, auripigmenti, ellebori nigri, seminis vrticæ torrefacti ana denar. 1. cum rosaceo tritis vtitor. In serpente & humidiorẽ vlcere vtẽdum arido: in cancro & struma cum rosaceo subactum adhibetur. Atque hæc ferè materia septorum est, quam exuras, eluas: cerato & aliis temperare possis. Excipiuntur

*De ratione  
applicandi.  
escharotica.*

*Septa com-  
posita.*

æsypo, butyro, axungia, saliuā, aliisq̃ue generis eius-  
 dem, vnde acrimonia retundatur. Elleboro magna *Elleborus.*  
 vis inest contra callos: iniectus fistulæ ad tertium  
 diem callum adimit. Iniiciendus è lixiuio acri, aut ea  
 aqua in qua acria metallica elueris. Interitur prius,  
 & in sextuplo liquore iniicitur. Puluis eiusdē excre-  
 centem carnem atterit. Iam verò callus est dura & *Callus.*  
 compacta caro, vnde pars stupet, albicat, pallet, &  
 ita stringitur, vt non expiret. Εκπλατίζεται sunt quæ  
 callos detrahunt. Oppugnantur calli primūm qui-  
 dem malacticis, deinde causticis, postremò ad ignē  
 ferrūmq̃ue decurritur. Eradūtur vngnibus, laceran-  
 tur scalpris, excinduntur cultris ad viuū, quòdque  
 reliquum sit caustico remedio absumitur, vel can-  
 denti ferro affligitur: at fluxio reprimenda prius  
 quàm execetur callus. Exciso callo tepida fouetur  
 locus, repurgatur melle & ærugine, si qua sordes ex-  
 titerit, & ad cicatricē abluitur aqua, in qua alumen  
 diffluxerit. Ectilotica sunt scilla cocta & cum calce  
 trita, nitrum, sal, torrefacta, fæx cremata veteris a- *Materia e-*  
 crisque vini, fæx aceti, cortex salicis vstus & aceto *Ectiloticon.*  
 pistus, calx cremata cum pueri impubis vrina, æru-  
 go melli, sali, thuri æqualiter mista. Calx irino vel  
 ligustrino cerato capta: testa terræque furnaria, pu-  
 mex crematus, ex aceto trita omnia: nasturtij fari-  
 na aqua subacta, bdellium pingue cum melle, am-  
 moniacum aceto fufum cum pari ærugine: radicis  
 lilij cinis, ærugo cocta leuigata, amygdala è melle  
 trita. Squamæ ℥. i. æruginis denarij 2. cerati lentisci-  
 ni vel mastichini ℥. 8. plus minúsue. Harpax cum *Harpax.*  
 modica ærugine. Est autem Harpax mistura è viuīs *Olea que*  
 calce & sulphure. In callis laudatum est Galeno o- *calli conue-*  
 niant.



# INSTIT. CHIRVRGIC.

leum lentiscinum, quia mollit, digerit, astringit & reprimat: quæ omnia difficili vlceri opus sunt & oris induratis. Terebinthinum similiter & mastichinum. Διὰ χαλκίτεως aucto modo chalciteos fluxionem reprimat, quæ callum fouet & hūc exterit: accommodatum est duris naturis. Itaque in fistulis quæ fluxione & duritie laborant, duæ partes medicamenti duabus partibus olei diluuntur, atque oleum mediæ ætatis esse conuenit. Constat remediū multis experimentis Galeni, quod ita in rem præsentem parandum est. Lithargyri, olei veteris ana  $\bar{z}$ .3. αχὺγιε veteris  $\bar{z}$ .2. chalciteos  $\bar{z}$ .4. quinque, sex, (vt sunt corpora dura vel mollia, paretur) cetera vt prius: ita diluatur oleo, vt liquidum infundi possit. Atque oleum lentiscinū, mastichinum ad eam rem idoneum est. In exposito callo solidius esse oportet. E lithargyro, chalcitide, æruginē, squama, oleo veteri & aceto ἐκίλαπιδι ferè compegit Ἀσκληπιάδες. Megetis singulare remediū. Ammoniacum aceto dissoluitur, & pari ærugini permiscetur, quæ si difficilius vnientur, oleum quod conueniat addi potest: alioqui loco æruginis Ægyptiaca ammoniaco misceantur. Atque hæc vt nihil initio effecisse videantur, perseverandum tamen: semel enim, & nec opinante medico perficient quod velit: id quod in emplastro Διὰ χαλκίτεως Galenus testatus est. Ec̃tiloticon Ἀσκληπιάδης. Lithargyr.  $\bar{z}$ .1. olei veteris  $\bar{z}$ .2. & semis, æruginis. chalcitidis, squamæ scrupuli 2. aceti denarij 6. Aliud. Lithargyri selibra, olei veteris lb.1. chalcitidos  $\bar{z}$ .2. squamæ æris vncia vna, aceti vnciæ duæ & semis. Aliud. Lithargyri selibra, squamæ, chalciteos, æruginis ana semuncia, aut vt

*Materia cō-  
tra callos ex  
Asclepiade.*

*Ec̃tiloticon  
Asclepiadis.  
• Alia ec̃tilo-  
tica.*

fit fortius  $\mathfrak{z}.$ 1. aceti  $\mathfrak{z}.$ 3. &  $\mathfrak{z}.$ 6. olei veteris lb. 1. &  $\mathfrak{z}.$ 4. Lithargyrus oleo coquitur ad crassitudinem, deinde squama leuissimè trita inspergitur, assiduè mouentur: hîc vas foco subducitur, ac refrigerenti pharmaco ærugo & chalcitis ex aceto trita paulatim immittitur, & circumducta spatha permiscetur: coquantur iterum dum non contaminent: postremò traducta in mortarium circumaguntur, subiunguntur, vniuntur probè & ad vsum reponuntur. Durorum corporum medicamentum est, quæ cal- lum contraxerint, nec facilè cicatricem trahant: ex- crescentem carnem reprimat, crudis vlceribus con- uenienter adhibetur: postremò fluida & diuturna iuuat. Sed initio quidem malaëtico temperare præ- stat æsypo, & eo cerato quod inde comparatur, bu- tyro, medulla cerui & aliis id genus. In summa hæc obseruata medicis in curando callo, vt in is paula- tim molliretur, incideretur. Atque hoc nomine re- primens auxilium ferè miscuerunt, quia in callos hu- mor aliquis, veluti mali fomes, illabitur. Adde quòd quæ malaëtico & laxante pharmaco soluta sunt, confirmare oportet, & hinc quoque reprimentia commiscetur. De callo, qui ossibus adnascitur, su- periùs abundè scriptum est. Tophi verò qui à lue ve- nerea relinquuntur, iisdem quoque remediis curari debent, nisi contumaciùs repugnent. In his enim & breuissima & tutissima curandi via igne perfici- tur, multò magis si suspicaberis tunicam adnatam ossi, & inde os aliquid vitij contraxisse. Quòd si fit, blandiorem illam curandi artem, quæ tophum mol- lit, secut, discutit, & frustra & cum periculo adhi- beas. Hoc loco igitur malum malo medicari opor-

*Ecchilotica  
quibus gene-  
ribus phar-  
macorū mi-  
sceantur.*

*Tophi à lue  
venerea.*

tet. Cauterium toptho accommodatum condatur  
 prunis dum vehemēter micet atque excandeat: ne-  
 que enim rubere satis est, vt neque leniter transcur-  
 rere topthum & molliter attingere. Etenim miseri-  
 corditer premendus ignis est, inurendus topthus, vt  
 iam os subiectum oculis exponi possit. Malo nodo  
 malus cuneus quærendus est, vt est in prouerbio,  
 raróque crudele malum nisi crudeli malo depelli  
 potest. Exusto toptho cura quædam ossis ineunda  
 est, sed tum maximè cū inducta crusta exciderit:  
 videndūque nunquid arrosū, putre & cario-  
 sum extiterit. Hinc ergò ad ossium medelas recurrē-  
 dum: si qua ramenta decesserint, cura sit vt partim  
 frugali vita, partim siccantibus remediis intabescant:  
 sic enim sponte sua excident. Ac remedia illa  
 quæ siccant, iam antè commemorata sunt, & post-  
 eà describentur aquæ fortes, & alia generis eius-  
 dem. Verū naturæ corporum partiumque habeatur  
 ratio. Etenim cum cruris articulo quàm cum  
 media tibia clementius agendum est: neque enim  
 vim ignis thorax sustinet, quam femur medium to-  
 lerare possit. Sed de his antè capite de aperienda  
 vomica disputatum est. Fit aliquando vt excrescant  
 ossa atque supra modum emineant, ἐξοσσεῖς no-  
 minant voce ambigua: vbi plerāque frustra insti-  
 tuas, quæ topthis adhiberi solent. Escharotica è ma-  
 teria septica conficies mistis metallis acribus, quæ  
 crassa & astringenti potētia prædita sint, vt firmior  
 trahatur crusta: qualis est cadmia, calchanthum,  
 chalcitis, vitrioli genera cruda omnia: quia scilicet  
 vstura tenuiora sunt & adstringendi vim depo-  
 nūt. Cruda igitur & intrita salua hominis vel aceto  
 subigenda:

*Crudele ma-  
 lum crudeli-  
 ter depellen-  
 dum.*

subigenda: cocta verò crusta infirmius contrahunt. Septa permiscenda aut cremata crudis, quum alius imprimenda crusta. Verum celerrime operatur ignis, siquidem æger perferat: atque is variis modis adhiberi potest. In quem usum tubuli lignei, canales ænei, ferrei, argentei varie confinguntur, aptantur cannæ & pennæ scriptoriæ, ut extrema parte in æquabilem circulum circumscribantur. Ea pars imprimenda loco, quem vrere necesse est: aqua feruida per tubulum infunditur contra clauos & verrucas. In ea aqua althææ radix, tragacantha, chamæmelum, hyssopus, pulegium, quæque molliant, incidant, discutiant, cōcoqui possunt, ut nō solo igne, sed alio quoque genere curandi vitium pertentes: aquæ loco, oxycrato, oxymelite, vino & aliis uti datum est. Archigenes in Ægilopas liquatum plumbum & feruens per infundibulū instillabat: alij vutuntur vitro. Sed machinas quibus hæc omnia infundantur, corniculorum more patere magis necesse est eo extremo quod dehiscit foras, quæque medicamenta cauo immittuntur, ne si quid diffuat, in nudas partes elabatur. Aliter quoque lana sordida specilli nucleo adalligatur, feruente oleo vel butyro intingitur, atque ita imprimitur loco. Fortius est, si è vitriolo, calce, antimonio & vocato sublimate, aliisque id genus extortū igne & chemicorū arte oleum fuerit, aut minore impendio hæc eadem materia oleo inferbuerit. Sunt qui nucali testa, voluta cochleæ, crusta panis, oui cortice inurāt. Alij è radice aristolochiæ, gentianæ, struthij, ramento mirti, buxi & aliis id genus cauteria effingunt. Continentur omnia in prunis, dum carbunculēt. In ore,

*Ignis.**Archigenes  
ad Ægy-  
lopos.*

# INSTIT, CHIRVRGIC.

*In cauis  
partibus.*

*Vstio Ara-  
bica.*

nare & aliis partibus eiusmodi ne quid obiter vi-  
les, enodi canna vel calamo scriptorio vtédum est:  
atque hæc primùm inferuntur cauis, dum extrema  
parte laboranti loco insideant: tum per eadem te-  
nue ferramentum candens inferendum, atque ita  
inurendum malum est. Vstione Arabica exemplo  
veterum vsa est posteritas: vaccinum cauteriũ qui-  
dam appellant. Dioscorides in eo interstitio vbi  
pollex brachiali cõmittitur, caua veluti lacuna sub-  
fidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde  
caprillum sterus feruidum sæpius imprimitur vol-  
fella captum vel forcipe, donec vapor per brachiũ  
ad coxam sentiat peruenire. Melius Antylus, Pli-  
nius & Arabes cauum illud, quod paulò infra vn-  
guem sub pollice pedis est, eo stercore inurant, do-  
nec vis ignis halitu per tibiam & femur grassante  
in coxam penetret: hoc enim vsturæ genus coxariis  
inuentum est. Alij steroris loco hermodactylos &  
ranunculorũ folia adalligant. Quod videntur imi-  
tari leuiore quidẽ remedio, qui lenticulã aqua fer-  
uente plenam pedibus adiungunt, vt plantæ calo-  
rem ignis concipiant, atque hinc vapor per totum  
membrum ad coxam trãsmittatur. In ea aqua plu-  
rima concoquunt chamæmelum, melilotum, ane-  
thum, ebulum, maioranam, chamæpytim, maluam,  
althæam, & alia id genus, quæ leniant, incidant, di-  
scutiant. Ouillo fimo, caprino & aliis generis eius-  
dem ad vstiones similiter vti licebit. Commutan-  
dum subinde fimum est, priusquàm deferbuerit.  
Auro & argento leniùs, ære & ferro acriùs inuri-  
mus. Ferro vtitur Hippocrates in carne: fungo in  
neruo & osse, si quidem legitimus opus est Hip-

pócratis quod *ἡ ἐν τῶν εἰρὸς παθῶν* inscribitur: vbi buxeis fufis oleo feruente tinctis & fungis hepar inurit. Omnino autem magnitudo vitij & natura partis cum vi remedij conferenda est. Cæsim, punctim cauteria imprimuntur, adiguntur longiùs, latiùs & in circulum circumferuntur vno loco vel pluribus, semel ac sæpiùs transcurrunt tantùm & leniter attingunt, vel diutiùs insidenti vi maiore imprimuntur, vt natura morbi, corporum & partium sustinet, ex quo variæ cauteriorum formæ inuentæ sunt. Muniuntur vicinæ partes, vt ne vis iusto latius proserpat, oui candido & rosaceo, mucagine psyllij, cerusa è rhodostagmate lota, & iis omnibus quæ quia phlegmonē prohibent, *ἀφλεγμονόνα* Græci nominant: eaque in spleniis & linteis adhibentur. Crustas autem nutare priùs *De crusta* quàm detrahantur, & veluti maturitate quadam *detrahenda.* cedere oportet. Alioqui vis afferri solet, ex quo profundum vlcus relinquitur, hæmorrhagiæ commouentur, dolor, fluxio, inflammatio denique irritantur. Tempestinè deduci possunt butyro, iostagmate vel rhodostagmate loto, adipe anserino *Que crustas* & gallinaceo, farina tritici in porri vel rutæ succo, lenticula cocta & cum melle mista, oleastri foliis cum melle litis, sulphure trito ex oleo, contusis nucum intraneis, porri foliis salina pistis, lacte cum melle cocto, albo stercore canino, cinere vstarum hirundinum, aut cochlearum terrestrium, crematis minore centauro, dracontio, stercore humano, chalcite trita & subtriplo melle: vel chalciteos vncia vna, ircos semuncia, adhibentur per se & cum melle. Nutrita lithargyro & vsto

butyro, radice ononidis, columbæ fimo cum melle, quod & carbunculos scarificat. In summa, detergente simul atque incidente materia, aliquando etiam molliente & paregorica: ac breuiter quæ valdè sordida & contumacia vlcera repurgant, eadem crustas detrahunt. Abstinendum hac parte iis quæ adstringat. Quòd si pertinacior crusta est & astrictior, inusta caro sordem includit, atque hæc inclusa periculum aliquod denunciet: quicquid est iustum scarificare couenit, sic enim sordes aperta via defluet. Recentiores chirurgi in septis numerat stuppas canabinas in cinerem versas, hermodactylos, anacardia, bryoniæ radices, alumen, vnguentum apostolorum, vitrioli genera, cuprosam, quæ pro calchantho, chalcitide, misy & fori vsurpârunt. Ad crustas crudis: ad exedendum & vim septicam vltis vtendum magis. Addunt æruginem, vnguentum viride, ægyptiacum, trochiscos è calce. Calcis vnc. 4. terantur cum melle non tam multo quidem quàm in purgantibus dictum est. Satis fuerit modò trochisci inde coëant, qui capsula figlina ordine collocati, & clibano dati eò cumentur, vt in cinerem abeant. Al. Succi radice asphodeli vnc. 6. calcis viuæ vnc. 2. auripigmenti vnc. 1. arida succo immersa sub canicula persolentur, dum squaleant. Alij trochisci cancos absument, & polypos narium. Calcis viuæ, arthenici citrini ana drachm. 2. vitrioli, æruginis, aluminis ana drach. 1. gallarum, acaciæ, balaustiorum ana dimidium drachmæ: teruntur omnia in mortario æneo, quod sit expositum igni vel ardori solis: respergitur aceto, eoque acerrimo: idque subinde repetitur, & acetum nouum refundi-

*Recentiorum  
remedia.*

*Trochisci  
è calce.*

*Æ succo a-  
sphodeli.*

*Alkadicon.*

tur: quinto die trochisci fiunt, siccantur umbra, loco  
 sicco & frigido reponuntur, qualis est patens Aquil-  
 lonibus. In usu, vino diluuntur, & in linamentis ad-  
 hibentur. Cantharidum ventres fermento cogunt  
 vel sepo. Sed à cantharidibus vrine ardor metuitur: *Cantharides.*  
 nam & hæc illitæ capiti genus hoc mali inferre pos-  
 sunt, cui gargarismus è lacte, & ex eodẽ infessio re-  
 medio est. Sublimati (quod vocant) plurimus usus  
 est, sed paucum ut antè dictum est, plurimo butyro,  
 adipe, æsypo temperandum est duodecuplo, & ali-  
 quando vigecuplo. In adipibus septicus est è ranis *Ranarum  
adeps.*  
 viridibus, quæ sint familiares sepibus & arboribus.  
 E natatricibus non ita calet. Quæ sequuntur ex quin-  
 to de compositione medicam. *χρὴ γένῃ* transtule- *Pastillus ni-  
ger Andromachi.*  
 runt. Niger pastillus Andromachi Malicorij denar.  
 10. aristolochiæ rotundæ, gallæ ana denar. 8. alumi- *Sandaracha*  
 nis, aloës, ana denar. 4. myrrhæ, calchanthi ana de- *Materia pa-  
stillorum.*  
 nar. 2. thuris denar. 4. colliguntur vino, & ex eodem  
 dulci in usu dissoluti debent. Al. Sandarachæ, auri-  
 pigmenti ana denar. 2. mannæ thuris denar. 4. tritis  
 vitior. Sandaracha rara est nisi venas illas colligas,  
 quæ veluti linea quedam rubra arrhenicum trans-  
 currunt. Plurimos verò finges pastillos hac ratione  
 ferè dupla calce, subduplo arrhenico, mista parte  
 aliqua gallarum, thuris & aluminis. Trochisci de *Trochisci de  
arrhenico.*  
 arrhenico recentiorum. Calcis viuæ lib. i. auripigmẽ-  
 ti rubri & citrini, alkali, acaciæ ana sēlibra: trita  
 miscentur cum capitello. Est autem sal alkali, quan- *Sal alkali.*  
 tum coniicio, genus quoddam salis, quale veteres  
 fingeant è quercu, corylo, trunco harundinis  
 carbunculatæ & aqua dulci vel marina coctis, sa-  
 lem nigrum appellabant: aut quod posteritas è



# INSTIT. CHIRURGIC.

brassica marina facit, quanquam & è beta & nitro-  
sis plantis comparari potest. Alioqui torrefactum  
salem cum hydrargyro tandiu pistillo volutabis,  
dum sal nigrescat : alij aliter alkali interpretantur.

*Capitellum.*

Capitellum ita fit. Calcis viuæ, salis ammoniaci  
ana lib. i. trita subigantur lixiuio è fabaceis scapis:  
deponuntur olla quæ è fundo hiet angusta rima:  
aliud figlinum subiicitur, in quod lixiuium paula-  
tim diffuat. Vas utrûnque in diem septimum initio  
defodi debet. Ex eo lixiuio & sebo vt antè dictum  
est, fit sapo : cathæreticon, septicon & lene escha-  
roticon capitellum est. Alij tres partes cineris faba-  
ceorum, vnam viuæ calcis subinde perfodiunt aqua,  
diu conuoluunt, & per quasillum rarum transco-  
lant. E ficulneo lixiuio, tithymalino, & omninò è  
materia caustica capitellum acrius esse potest. Est

*Lixiua sa-  
ponaria.  
Capitellum  
fistulare.*

apud Paulum simile quid capitello, κοινὴ σαπώ-  
ναριχὴν appellat, lixiuium saponarium interpretari  
licet. Aliud quoque capitellum quod fistulare vo-  
cant, arrhenico, sublimato, vitriolo additis, vt vnà  
cum aliis in lixiuio extillent. Sexcenta id genus è  
materia quæ fistulis conueniat, effingi possunt. Sed

*Pastillorum  
vſus.*

vt redeamus ad pastillos, horum vſus est in nomis,  
phagedænis, fistulis, rheumaticis & malignis vlceri-  
bus, reduuiis vnguium, putredine narium & alia-  
rum partium, polypis, ozænis, condylomatibus, pu-  
trefcētibus gingiuis, excreſcente carne, gangrænis &  
aliis generis eiusdem. Sed omninò partium corpo-  
ris & vitiorum habeatur ratio. Vis acrior obtundi  
potest tritis pistillis, & triginta vel quadraginta die-  
bus insolatis, perfuſiſq; frequente aqua, eaq; sæpiùs  
commutata : aut ſi non datur vti ſole, ſubinde per-

*Vis paſtil-  
lorum quo-  
modo obti-  
nèdatur.*

fundantur aqua, eaque vel simplici, vel rosacea, aceto, vino & aliis vt res exigit: siccentur, atque iterum proluantur, eaque tandiu reuocentur, dum dilutam satis exoleuisse acrimoniam perceperis. Aliquando miscentur melli, & vnà comburuntur, aliàs cerato diluuntur. In fluidis & humentibus vitiiis galla, mallicorium, alumen & alia quæ siccent & reprimant, commodè temperantur. Atque omnino tutius est à leuioribus ad acriora sensim progredi. In humido & sordido vlcere pinguibus abstinentum: arida insperguntur. In calloso & squalente vitio sicca pinguibus excipi debent. Septica faciunt Arabes, quæ à Græcis descripta sunt, & alterum genus relinquunt, quod humido calore cū fœtore partes corrumpit. Quæ ex hydrargyro fiunt, præcipitatum, sublimatum, cinabrium, solani succo, brassicæ, limonium & aliis attemperant. Licet etiam quod veteres factitârunt, non tribus, sed (quod proximè dicebatur) triginta & quadraginta diebus terere in sole sub canicula, vel loco calente bis aut sæpiùs, quotidie mutata aqua, vt vitiiis, partibus & corporibus accommodentur. Minium è micis metallicis, è sterrili gleba plumbi, è cerusa vsta, quod alij Syricon, alij Sandicem vocant, ad epulotica potiùs referendum. Quod verò è sulphure & hydrargyro factitium est, in causticis censeri debet. Sed de his antea: vsurpant præter hæc aquas fortes &, vt dicunt, Alchymistarum, ex rebus acribus: stercore gallinaceo, columbino, arrhenico, aliisque id genus, vt quibus aurum ab argento, metalla à metallis separant. Salis ammoniaci, auripigmenti rubri & citrini, cuprosæ, æruginis ana: trita in alembicum vitreum bene sti-

*Minium.**Aque fortes.*



## INSTIT. CHIRVRGIC.

patum luto & vndequaque clausum deponuntur: quæ vbi lento igne concaluerunt, liquorem reddunt: sed qui primùm defluit, vel abiicitur, vel in alembicum repetitur: hîc ignis augetur duplo: qui secundò fluit, fideliter reponitur. Alij ex aluminis rotundi, vitrioli Romani ana lib. i. salis, nitri, vel crematæ fæcis aceti sesquilibra, aquam eadem arte eliciunt. Hæc callosis corporibus idonea sunt, & ossibus. Suspecta in naso, labris, palpebris, digitis, & pudendis, mollibus atque exiguis partibus, vbi vena, arteria, neruus insignis est: ac primùm quidem minimum sit quod imponitur, deinde vt res exigit, & ferunt corpora, augeatur. Ac iam constare arbitror, pyrotica omnia modò mistura, modò vstrina & lotura retûdi posse. In mistura oui liquor, psyllij mucago, ceratum rosaceum, vnguentum album, dialthæas, emplastrum è muscillaginibus, & alia propè infinita, quæ ad mediam naturam veniunt, quæ refrigerant, molliunt, vsurpari debent. In vstura ignis est figlina cruda, pasta & alia, de quibus antea. Eluuntur aqua, aceto, vino & aliis generis eiusdem. Neque hoc in dubio est, vacuatis ac iam repurgatis corporibus pyrotica adhiberi, quo iam tempore à lenioribus auxiliis desperatio est. Postremò leniendæ partes, quas vis ignis exasperauit.

*Vbi suspecta  
aqua fortes,  
& alia id ge-  
nus.*

*Quibus tem-  
peres pyro-  
tica.*

FINIS.















